



19255/B



42950  
SYNOPSIS  
NOSOLOGIÆ METHODICÆ,  
EXHIBENS  
CLARISS. VIRO RUM  
SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, SAGARI,  
ET MACBRIDII  
SYSTEMATA NOSOLOGICA.

EDIDIT  
SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM  
ADJECIT  
GULIELMUS CULLEN,

*Med. D. & in Acad. Edinburgensi Med. Praef. Prof. Medic.  
Reg. apud Scotos Primarius, & Coll. Reg.  
Med. Edinb. Socius;*

N E C N O N

*Societatum Reg. Londin. Reg. Edinb. Philosoph. Philadelph.  
Med. Reg. Paris. Med. Hauniens. & Reg. Med.  
Edinb. Sodalis.*

EDITIO SECUNDA VENETA  
JUXTA QUARTAM EMENDATAM  
ET PLURIMUM AUCTAM EDINBURGI 1785.  
TOMUS SECUNDUS.



V E N E T I I S,

M D C C X C V.

\*\*\*\*\*

Sumptibus JOANNIS ANTONII PEZZANA.  
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.





PARS SEXTA.  
GENERA  
MORBORUM  
PRÆCIPUA DEFINITA,  
ADDITIS SPECIEBUS  
CUM HARUM  
EX SAUVAGESIO SYNONIMIS,  
A  
GULIELMO CULLEN.

Edinburgi 1785.

PARTE SESTA

GENERA

MORBORA

PRINCIPIA DEFINITA

ADITIS SPECIBUS

CON RATIONE

EX ANALYSE ET SYNTHESE

GUILLI MO CULLEN

Edinburgh

# MEDICINÆ STUDIO<sup>5</sup>SIS

EDITOR VENETUS.

**C**um primum ad nos pervenit novissima editio egregii hujus Operis, quod Synopsim universæ Nosologiæ methodicæ a Virō scriptis ut & longo Artis usu undequaque celeberrimo concinnatam exhibet, statim de ea hic recudenda cogitare cœpimus. Non parvæ enim utilitatis ut & commodiforæ discantibus ducebamus, si quæ potiora in hanc usque diem summi Viri ad Nosologiam condendam novisque accessionibus locupletandam tentamina protulerunt, ea omnia hic in unum congesta & sub uno veluti aspectu posita iis offerremus pensitanda & ad invicem conferenda.

At vix manus incepto admoveamus, cum nuntiatum est Ticini reculam fuisse CULLENII Nosologiam cura Ill. JO: PETR. FRANK Med. Pract. Prof. celeberrimi. Vehementer profecto gavisi sumus Culleniani operis præstantiæ atque utilitati ulterius, si opus esset, firmandæ tam illustre testimonium accessisse: Tantum vero absuit ut hæc apud Ticinenses peracta editio, nos a nostra perficienda deteruerit, ut potius calcar addiderit. Magis enim per hanc nostram, ad unguem nuperrimæ Edinburgensis exactam, Medicorum Itatorum commodis consultum iri existimamus, propterea quod præter CULLENII solertissimos sane labores, cæterorum etiam Auditorum, qui illum in hac sparta enodanda anteiverunt, lucubrationes in compendium redactas hæc ob oculos ponit. Quam sane Nosologici operis partem in Ticinensi editione omnino prætermittam ii omnes dolent, quibus præstantissimorum LINNÆI, VOGELII, SAGARI, MACBRIDII, tractatus nosologicos in nostris bibliopoliis raro venales videre adhuc non contigit.

Nequid vero huic nostræ editioni deesset, quod ad majorem ejusdem commendationem conferre quoquo modo posset, prætermittere noluimus doctissimam præfationem ab Ill. FRANKIO Ticinensi edit. præfixam, ut quæ non pauca contineat in ipso statim operis limine a Studiosis probe tenenda, si meliores uberioresque ex operis ipsius attentalectione atque meditatione fructus percipere velint.

Valete interim, nostrisque curis favete.

AU.



AUDITORIBUS SUIS

IOANNES PETRUS FRANK

S. P. D.

CUM quartam hanc *Nosologiæ methodicæ* editionem curaret celeberrimus CULLEN, eidem, tum SAUVAGESII, LINNÆI, tum VOGELLI, SAGARI & MACBRIDII systemata, qualia in plurimorum manibus jam erant, præmittere voluit, atque hæc singula, prima hujus operis parte circumscripta, recudi curavit: proprium vero laborem, in secundum Volumen congeffit & in multis locis ita mutavit & auxit, ut priori longe perfectior redderetur & discipulorum usui multo accommodatior.

Sed difficultas ab hinc nata est, ut, qui lectores hanc ipsam laboris partem sibi propriam reddere cupiebant; his & primum Volumen, quamvis novi nihil contineret & jamjam a pluribus possideretur, esset comparandum.

Hanc igitur correctiorem denuo CULLENI *Nosologiam*, cujus novissima editio apud nos adhucdum ignota, vel saltem rarissima esset, non absque magna utilitate communiorum reddi posse cogitavi, si sola ejusdem pars secunda, ut Auctori nostro propria, præfixa tamen cæterorum systematum generali tabella, uti fere a TISSOTO factum est (\*), tum *Italiæ* Medicis quibuscunque, tum præcipue Vobis AUDITORIBUS optimis, pro minori longe pretio & maturius offerretur.

Novistis cæterum, o boni! quæ mihi de laboribus ejusmodi *Nosologicis* sit opinio. Quamvis scilicet eo nos pervenisse necdum credam, ut, deficiente materialium copia, in erigendo morborum systemate versari queamus feliciter, multum tamen lucri pro recta morborum distinctione ex ejusmodi, incompletis licet, lucubrationibus expectandum esse puto, quibus morborum tum alienis, tum propriis oculis conspекtorum, fideles imagines

---

(\*) Ad Cl. VOGELII opus de cognosc. & cur. corp. hum. aff.

7

gines pinguntur, atque singula tali disponuntur ordine ut quivis, si novum morbum a se visum opinetur, mox ejusdem, quasi in speculo, faciem cum illis comparare, atque si similem hujus ambitum detexerit, mox locum invenire queat, ubi plenius descriptum notatumque posteris hostem attentius possit studere.

Scientiam quidem immediate vix augent systemata *Nosologica*, sed longe faciliorem reddunt; indicem morborum adcuratiorem & practicis Medicis pernecessarium sistunt; in præcipua aut characteristica symptomata attentiores hos reddunt; paucissimis paginis sæculorum labores certo ordine collocatos complectuntur; nomina certa rebus certis impertiuntur; linguam medicam a polo ad polum diversissimis gentibus intelligibilem constituunt: a cujus tam longo neglectu & confusione vere *babylonica*, magna inter laborantes exorta est discordia, & vocum magna obscuritas.

Doleo vero, me, in ipso operis limine, CULLENIO vix posse consentire & in eo injustum fere antiquitatis Censorem invenire. Est certe in rebus medicis, quod in humanis aliis quotidie evenire videmus: panem cultro dividimus, comedimus bene tostum; nec primo cerealium satori, nec illi qui primus ferrum audaci manu e matris terræ visceribus, nostros in usus durissimo partu extraxit, elaboravit, benedicimus! felicior sit apud posteros, uti spero, CULLENI memoria! sed sermonem tanti Viri aliqua ingratitude nota carere non credam. Quod si locus hic esset, veterum medicorum recentiorumque in artem merita ponderare & æqua bilance inter se comparare: facilis labor esse videretur demonstrare, *infantem adhuc medicinam*, pro prima corporis sui nascentis constitutione, longe majora promississe incrementa, quam in *adulto* nunc scientia conspicimus. Verum est, in definitione morborum scholastica, parum sudaverunt primi artis nostræ parentes; sed qui *pictores* fuisse negat quamplurimis hodiernis meliores, fideiores, vereor ne hic fallacissimam tueatur opinionem. Certe SYDENHAMUS, non aliter medicinæ hodiernæ *Restaurator* audit, quam quod *Hippocraticam* tum observandi, tum describendi methodum, per plurium sæculorum intervalla derelictam denuo introduxerit: & tantum abest, ut in his *Nosologorum*, quot



quot sunt, tentamina, primorum Medicinæ parentum laboribus palmam præripuerint, ut sæpius fateri debeant consummati in arte Viri, subtiliorem nimis morborum anatomen, artis nostræ incremento non parum obfuisse & pro magna felicitate habendum esse, quod ipsa *natura*, veteribus fidelior, & in ipsum genus humanum viris doctissimis longe benignior, magnam systematum recentiorum partem, morborumque innumeras species, *pro suis necdum agnoverit*.

Sunt certe morbi, quidefinitiones exactiores non admittunt; sed longiori sermone describi volunt, & ut rectius dignoscantur, quoad singula sua symptomata in collectione & ab aliis non divulsa, veniunt considerandi. Solo hic *febris in genere* utar exemplo, cujus nullus adhuc *Nosologus* naturam rite & exacte satis definire potuit: forte quod hæc ipsa morborum sæpius symptoma, quam morbum sistat; cum interim descriptiones veterum, minus anxie verbis quam rebus inhærentes, de præsentia febris, quam sibi delineandam adsumpserunt, dubium vix unquam relinquunt.

Quidquid autem tum in his, tum in ipsis morborum generibus ordinandis peccatum fuerit vel ab aliis, vel ab ipso forte CULLENIO (viro tamen, ob quadraginta annos ad ægrotantium lectos gloriose impenso, & in totius scientiæ medicæ ambitu adaugendo feliciter transactos, ad hos labores præ aliis omnino disposito) certum nihilominus est, ad morborum sinceram promptamque diagnosin nihil magis conferre, quam Characterum, cuius inter illos essentialium, & affinitatum, quibus ad eandem familiam pertinere docentur, succinctam expositionem; a qua, si aliquanto nimis adhuc distemus, fatendum tamen est, perfectionem in eundo non sine vacillatione gressuum posse attingi.

Filium igitur hunc ariadneum ambabus manibus arripere Auditores! non quod ipsam sic scientiam pugnare tenere confidatis; sed ut in morborum vastissimo labyrintho conductorem sequamini; faciem cognitatum ægritudinum & vobis perspectam reddatis; ad lectulos ægrotorum, si penicillus alienus morbum infelicius expressisse videatur, propria demum manu circuitus ambitumque imaginis corrigatis; colorem hinc, illincque umbras



bras vobis visas, collocetis, & ordinem tandem magis naturalem in morborum dispositione inveniatis. Quod si & nobis datum non fuerit invenire *quid sit*; -- saltem *quid non sit*, quod certe in rebus medicis quamplurimum est, detegemus. Voluissem utique & ex meis aliquid hinc inde huic operi adjicere, quæ mihi vel non ubique cum CULLENIO consentienti, vel de rebus ipsi dubiis per proprias experientias convicto, necessaria satis poterant videri: ast vero otium ad hos labores necessarium mihi deest: ut in propriis potius præelectiobus practicis, & ad ægrotorum lectulos, hæc mihi assumam supplenda. Vos interim, Commilitones, CULLENIi opere egregio utamini feliciter.

Dabam Ticini Reg. die 1. Julii 1786.

PRO.

## PROLEGOMENA.

**R**es est inter medicos satis nota, morbos quosdam natura sive causa proxima diversos, externa tamen facie, sive symptomatis, adeo similes esse, ut alii ab aliis difficillime internoscantur. Cum autem morbi natura diversi remedia diversa, quandoque etiam contraria, postulent, summi est momenti ut medicinam facientes morbum quemque a quovis alio certe dignoscant.

Dum medici vero, in ipso artis usu versati, de morbis distinguendis sæpe incerti sint, merito queruntur, in scriptis de re medica non semper invenire quæ hanc ambiguitatem solvere valeant. Sæpe quidem observatum est, descriptiones, sive historias, quas vocant, morborum, in scriptis medicorum reperiundas, plerumque mancas & imperfectas esse; & nemo est, ut opinor, qui non facile agnoscat, historias morborum pleniores, magis exactas, & characteribus melius distinctas, quam quas adhuc habuimus, desideratas esse.

PUTARUNT quidem multi, medicos veteres Græcos & Romanos, in observandis & notandis morborum phænomenis, diligentes & solertes fuisse, atque in horum scriptis historias morborum complures, quæ nobis utiles esse possint, existare. Mihi vero videtur vel ineptam & supersticiosam antiquitatis venerationem, vel quandam eruditionis ostentationem, scriptis medicorum veterum in hac re æstimationem nimiam conciliasse. Minime quidem dissimulandum, in scriptis illis quædam quæ morborum characteres vere delineant subinde reperiri. Quæ autem ejusmodi ibi occurrunt, quantumcunque a recentioribus æstimata, parum profecto nos docuissent, & attentionem nostram penitus fortassis effugissent, nisi res eædem nobis ex propria observatione prius innotuissent. Revera neoterici libros veterum raro ad primam rerum notitiam comparandam evolvunt, sed plerumque, ut propria tantum inventa & observationes horum auctoritate suf-  
ful-

fulciant, perscrutantur. Mihi quidem persuasum est, vel historias morborum plerasque, quæ in scriptis veterum jam inveniuntur, ad morbos regionis a nostra plurimum diversæ pertinere, ideoque nobis parum utiles esse; vel scripta eorum adeo mutilata & corrupta ad nos pervenisse, ut ad usus nostros parum conferre queant. Fatendum saltem, notitiam morborum ex scriptis veterum hauriendam multo minorem esse, quam qua opus est ad illam, de qua diximus, ambiguitatem eximendam.

Nec nisi sero admodum & lente ad hanc rem expediendam progressi sunt recentiores. Seculo enim decimo sexto Galeni sequaces, in instauranda veterum doctrina cum tanta laude versati, in horum scriptis explicandis & illustrandis fere solum occupati, parum omnino ad emendandam vel amplificandam morborum historiam contulerunt.

Nec ejusdem ævi medici chemici, Galenicorum adversarii acerrimi, in illa re plus fecerunt. Medicamentis enim inveniendis, & promiscue adhibendis, solum intenti, a morborum studio hominum animos prorsus avertabant.

Hinc quidem factum est, quod ab instauratis literis seculo decimo quinto, usque ad tempora Sydenhami, nullæ fere morborum historiæ plenæ vel accuratæ conscriptæ sint. SYDENHAMUS vero, sagacitate & judicio quibus maxime pollebat, majorem in notandis & describendis morborum phænomenis diligentiam adhibendam esse protinus sensit, & in hunc finem ad sedulam observationem se accinxit, qua plures tandem & meliores, quam antea quicquam, morborum descriptiones protulit.

Ab hujus exemplum, & ad normam methodi, per observationes & experimenta philosophandi, tunc temporis invalescentis, evenit, ut ab eo tempore plures medici in historiis morborum augendis & accuratius reddendis operam collocaverint.

A tem-



A tempore igitur Sydenhami in hac re multum laboris nec frustra impensum est: rem tamen minime adhuc absolutam esse censeo. Multa parum accurata, multa erronea, multa denique prorsus falsa, historiis morborum, quas jam habemus, inesse, novit quisque in his aliquantulum versatus, & novit etiam ex variis causis hæc vitia subrexisse. Scriptores enim, alii ad theorias sibi placentes stabiliendas, alii ad fidem remediis ab ipsis sive inventis, sive multum laudatis conciliandam; vel veritatem, præconceptis occæcati, non percipiebant. Plures, re omni quovis modo mirabili capti, quod ipsi facile crediderunt, alios credere cupientes, rem omnem præter modum amplificaverunt. Plures denique, ut observationibus hodie adeo expeditis famam sibi compararent, historias in museo fictas, pro veris tradiderunt. Hæc omnia si specialius indigiterem, de imperfecta hæcenus morborum historia satis clare constaret; sed hæc omnia impræsentiarum prætermitto, & unum solummodo in historiis morborum conscribendis vitium, ad rem nostram maxime pertinens, indicatum volo.

MULTI optimæ etiam fidei medici, in morbis observandis diligenter versati, in historiis eorum conscribendis sæpe nimium fecerunt. Non solum enim symptomata morbi cujusvis semper præsentia & inseparabilia, sed plura etiam, & cuncta quidem quovis tempore morbum comitantia, recensuerunt. Ita symptomata rarius, nec necessario cum morbo conjuncta, & plura omnino adventitia & fortuita, notarunt; dum simul illa inusitata & fortuita ab usitatioribus & inseparabilibus distinguere penitus neglexerunt. Hinc, historiam morborum plenissimam reddere conantes, quæ ad distinctionem cujusque ab alio quovis conferre possent, omiserunt, immo difficiliorem reddiderunt.

DE hacce in historiis morborum redundantia sæpe conqueSSI medicinam facientes, pathognomonica quæ dicuntur desiderarunt: hoc est, ut notentur symptomata illa pauca, quæ cuique morbo adeo propria sunt, ut ab illis solis quisque morbus ab alio quovis illico

&

13  
& certo dignoscatur. Hujusmodi autem pathognomoni-  
ca in scriptis medicis nondum data, neque unicuique  
morbo assignata sunt; nec quantum video nisi per No-  
sologiam methodicam, rite institutam, assignari que-  
unt.

DUDUM quidem SYDENHAMUS & solers BAGLIVIVS, quo  
facilius & certius morbi distinguerentur, morbus o-  
mnes, per normam methodi botanicæ, ad genera & spe-  
cies, appositis characteribus idoneis, referi voluerunt:  
id est, ut institueretur Nosologia methodica. Hoc  
etiam consilium alii summæ famæ medici comprobarunt;  
& quisque, ni fallor, in artis usu occupatus factum  
fuisse vehementer optaret. Nihil tamen hujusmodi pro-  
tinus tentatum fuit; an quidem ex fructu inde capien-  
do parum perspecto, an vero ex difficultate operis præ-  
visa, non constat; sed revera nihil omnino tentatum  
fuit, donec celeberrimus FRANCISCUS BOISSIER DE SAU-  
VAGES circa annum 1732. rem aggressus sit.

QUÆ quidem, exeunte seculo decimo sexto, FELIX  
PLATERUS in morbis secundum symptomata ordinandis  
conatus est quodammodo huc referri possunt; conatus  
autem isti inconditi adeo & imperfecti erant, ut quen-  
quam eisdem profecturum esse vix expectandum fuit;  
& revera ante SAUVAGESIUM nemo, quantum novimus,  
ulla ex parte prolecutus est. Haud dissimulandum qui-  
dem, PLATERUM SAUVAGESIO quædam suggessisse; pau-  
ca tamen, nec fausta admodum, & quæ nemini usui  
fuissent, nisi SAUVAGESIUS cum meliore spe opus mul-  
to longius provexisset.

IPSE quidem SAUVAGESIUS primum lente & titubanter  
progrediebatur; &, re iterum atque iterum tentata,  
non nisi post multam lectionem, & assiduam per tri-  
ginta annos meditationem, Nosologiam methodicam  
suam, anno 1762. editam, protulit.

INTEREA duo alia in Nosologia methodica ten-  
tamina facta sunt; alterum a celeberrimo viro, & in  
distributione rerum methodica plurimum exercitato,  
CAROLO A LINNE; alterum ab erudito Professore Got-  
ting.

tingensi, RUDOLPHO, AUGUSTO VOGEL. A neutro tamen, utpote vestigiis SAUVAGESII presse nimis insistente, opus multum promotum fuisse videtur.

CUM de utilitate hujusmodi tentaminum jamdum mihi persuasum sit, simulac ad medicinæ praxin docendam in hac alma Academia admotus fui, mei officii esse putavi alumnos nostros ad Nosologię methodicæ studium allicere; & quo facilius hoc efficere, libellos quotquot ad id conferre possent, hic edendos, & in discipulorum manus tradendos, curavi.

Ex opere SAUVAGESII, aliis rebus non admodum utilibus referto, ea tantum quæ ad genera & species morborum distinguendas pertinerent excerpti, & cum his LINNÆI & VOGELII libellos integros conjunctos edidi.

AUCTORES hi aliquid laudis sine dubio merentur: quam enim eorum opera rem ex toto confecisse minime videantur, nec multum utilitatis tironibus inexpertis asferre queant, in arte tamen versatis, & in dignoscendis morbis aliquatenus exercitatis, nonnihil commodi exinde oriri possit.

DIFFICILE quidem erit, hanc rem protinus perfectam reddere, nec, ut opinor, nisi tentaminibus repetitis fieri potest. Non solum igitur mihi licitum, sed mei muneris esse, opus hoc Nosologicum, quantum possem, promoverè arbitratus sum; eoque consilio methodum quodammodo novam tentavi, & una cum supra dictis edidi. Hanc, etsi nequaquam omnibus numeris absolutam, prioribus tamen in quibusdam magis accuratam inventam fore spero.

QUI ante nos huic studio operam dederunt, minus consulto, ut mihi videtur, rem aggressi sunt; morborum enim species parum perspectas habentes, ad suprema classium & ordinum genera constituenda illico se accinxerunt. A natura vero species solum datæ sunt, & generum constitutio est mentis humanæ excogi-



15

cogitatio, quæ, donec species omnes bene notæ & perspectæ fuerint, fallax & incerta erit; & in generibus quidem constituendis, nisi ad species semper respiciamus, labor noster vanus & inutilis evadet.

CONSTITUTIO generum supremorum, in quovis rerum systemate, neutiquam adhuc absoluta est. Classes enim vel etiam ordines, omnino naturales, vel in systemate vegetabili, vel in animali, nondum ubique constitutæ sunt. De fossilibus methodus etiam difficilior, & de morbis fortassis omnium difficillima erit. Videamus igitur quomodo hanc rem quam optime tractare possimus.

CUM res distinguendæ, numero quam plurimæ sint, tum ad investigationem, tum ad reminiscentiam, utilissimum & necessarium esse videtur, ut ad genera quædam suprema referantur; cum vero species rerum non admodum numerosæ sint, & quarum sigillatim recensitarum reminisci, memoriæ in plerisque hominibus vires non excedat, eas summa sollicitudine ad classes & ordines referre vix opus esse videtur.

ITA Illustris DE BUFFON quadrupedia, quorum species numero paucæ sunt, ad classes & ordines referre haud necessarium esse censuit, & quæ in hunc finem alii tentarunt, frivola esse, & ad denominationem studiosos plurimum turbantem duxisse, putavit.

ILLUSTRI tamen & egregio viro prorsus assentire nequeo. Etiam si enim institutio classium & ordinum morborum, neque pro investigatione eorum satis perfecta reddi queat, neque pro numero valde necessaria sit; quo ammodo tamen tentandam, & ad majorem accuratorem diligenter perducendam esse, puto.

ENIMVERO, si ab illusione quæ ex characteribus classium & ordinum oriri queat, cavemus &, ni fallor, cavere plerumque licet, etiam classium & ordinum institutionem, in multis ad plenioram & magis exactam specierum distinctionem conferre posse contendo. Et si enim ejusmodi institutionem, ubique certam & accuratam semper assequi haud liceat, ipsos tamen conatus ad illam assequendam magnopere ex re fore putarem

rem, quippe qui ad disquisitiones utiles, tum in pathologia, tum in morborum historia, sæpe obvenientes, subinde ducant. Certe, cum de natura morborum disquirere velimus, distinguendi sunt tum per symptomata cuique propria, tum per illa cum aliis quibusdam communia: quod nihil aliud est, quam morbos, uti alia quæcumque in rerum natura distingui debent, per genera & species distinguere, & huiusmodi distinctio generum, tum supremorum, tum proximorum, notationem necessario exigit.

QUANTACUNQUE tamen ex instituendis morborum classibus & ordinibus utilitas provenire possit, certe fatendum est, Nosologos, huic rei præcipue intentos, successus optatos nondum obtinuisse; & ex huius studii adeo imperfecti conspectu, ni fallor, accidit, quod totam rem Nosologicam alii despexerint, alii vero impossibilem iudicaverint.

Qui impossibilem putant, certe falluntur. Distinctionem morborum aliquando difficilem esse, fatentur omnes, possibilem autem in plerisque esse, fateri etiam oportet; nam, si quis hoc negaverit, idem fecerit, ac si nullam esse artem medicam dixisset. Si revera tamen medici morbos a se invicem dignoscere possint, certè quibus indiciis id faciant, etiam discere queunt. Hæc autem indicia nulla alia esse possunt, quam quæ morbum quemque per genus & speciem definiant, quæ rursus per methodum Nosologicam, rite institutam, solummodo exponi queant.

DISTINCTIONEM itaque morborum, hætenus sæpe dubiam, per Nosologiam methodicam magis certam fieri posse, affirmare nullus dubito. Porro observandum, quoties huiusmodi distinctionem morborum exponere conati fuerimus, id commodi oriturum, quod huius distinctionis vel defectus, vel errores, facillime percipientur, & cum percepti, vel ad observationes jam factas accuratius considerandas, vel ad observationes postea diligentius faciendas, ducent; quin & plurimum valebunt tum ad Nosologiam methodicam, tum ad  
di-

distinctionem morborum, tandem perfectiorem reddendam.

QUAMVIS morborum characteres hactenus propositi sæpe erronei, sæpe deficientes sunt; tentamina tamen omnia jam facta exhibere cupiens, in tertia Synopsi editione ex systemate symptomatico CL. MICHAELIS SAGAR, quæ ad genera morborum definienda pertineant, excerpti, & in hac quarta editione, ingeniosi Davidis Macbride, Tabulas Nosologicas addidi, & cæteris supra memoratis subjunxi. Hæc autem tentamina omnia simul edita sunt, ut juxta posita facilius conferri possint, & ut collata vel optimos & maxime idoneos characteres indicent, vel ad erroneos corrigendos, & ad distinctiones magis exactas obtinendas, lectores ducant.

Hujusmodi studium plurimis medicis necessarium fore facile credo: nam morborum titulis inhærentes, notiones parum accuratas & determinatas habent; & quantum video, ad magis exactas, nisi nosologiæ methodicæ studio, duci vix possunt.

Ex iis quæ jam diximus, tum utilitatem, tum necessitatem Nosologiæ Methodicæ manifestam fore spero; & simul patebit, quare antehac, & nunc etiam, eandem colere allaboravi. Proximum est, ut in hisce prolegomenis, quas in hoc studio regulas ipse observavi, & ab aliis observandas vellem, nunc exponam.

PRIMA & præcipua nostra cura fuit, ut morborum species in ipsis ægris præsentibus detegerentur & dignoscerentur. Cum vero species, nisi simul genus indicaretur, vix recte definiiri possint; & cum genera plurima a Nosologis indicata unius tantum speciei sint, inde factum est, quod nostri etiam labores in generibus præsertim distinguendis impensi videantur. Ad species tamen semper respeximus; & ad eas dignoscendas, characteres generum a nobis datos ubique utiles fore speramus.



IN generibus morborum recensendis pauciora, quam in aliis systematibus dicta sunt, recensui, quod si recte feci, id studiosis multitudine rerum contemplanda facile turbatis imprimis commodum esse puto. Etiam si enim numerum generum minuens aliquando erraverim, id tamen tuto tentatum fuisse censeo: cum enim discipuli nostri genera facile satis certo distinguenda recte perspexerint, illos genera forte omissa facile postea agnituros esse credo.

GENERA morborum vero apud nos, quam apud alios Nosologos, necessario pauciora sunt: quia plura, pro diversis ab aliis habita & recensita, a nobis, utpote nulla, quantum nobis videtur, re diversa, sub uno titulo comprehensa sunt; & hujus rationes postea locis idoneis tradendæ venient. Interea notandum, plura genera, quæ primo intuitu omissa videantur, nequaquam ex oculis studiosorum sublata esse, cum generis illius, ad quod pertinere nobis videntur, uti synonyma recenseantur, & locum suum in indice adhuc retineant.

DEINDE genera morborum a nobis, quam ab aliis enumerata & definita, pauciora sunt; quia nulla, nisi idiopathica & primaria notanda esse duximus, dum plura ab aliis memorata, sympathica tantum sunt, sive symptomata nusquam per se existentia; & neutiquam igitur pro morbis primariis agnoscenda. Ita *Carphologia*, *Pandiculatio*, *Rigor*, *Sternutatio*, *Oscedo*, *Singultus*, *Stertor*, *Anxietas*, *Lassitudo*, *Stupor*, *Pruritus*, *Algor*, & *Ardor*, a SAUVAGESIO, & alia ab aliis, pro generibus recensita, a nobis penitus omittuntur; & recte, ni fallor, nisi quot symptomata, totidem genera morborum ponere velimus.

DENIQUE genera morborum apud nos pauciora sunt, quia ex classibus VITIORUM & DEFORMITATUM plura a nobis omittuntur; vel quod morbi adeo leves sint, ut medicorum attentionem & curam non mereantur; vel quod congeniti & immutabiles medicorum artem penitus eludant. Ita *Lentigo*, *Leuce*, *Cyasma*, *Seline*, & *Cicatrix*, ex classe VITIORUM; & *Pho-*  
nos,

*xos, Gibber, Rhyssmata, Canities, Coloboma, Nervus, Monstrositas, Rhinosis, Varus, Valgus, Leiopodes, Saniodes, Cripsorchis. Hermaphroditus, Dionysiscus, Galiancon, Galbulus, & alia ex classe DEFORMITATUM* apud VOGELIUM recensita, recte a nobis omissa putamus. Ejusmodi vitia & deformitates, fortassis in pathologia, sive historia generali mutationum, quas quavis occasione subit corpus humanum, notari possent; Nosologiam autem methodicam iis adeo frivolis onerata, veleandem tam multis novis & inutilibus appellationibus turbare, minime idoneum videtur. Judicet itaque lector, quam merito gloriatur CL. SAGAR, se genera auxisse.

Quod modo memorata omiserim, venia forsitan mihi facile dabitur. Sunt autem alii morbi, memoratu quidem digni, quos omissos non adeo facile condonabit studiosus. Hujusmodi omissiones agnosco, & quidem doleo; sed variæ rationes, ut quidam morbi hic omitterentur, effecerunt. Primo fieri potest, ut quidam observationem nostram penitus effugerint; dein sunt alii satis noti, quibus in nostro systemate locus idoneus nusquam inventus est; denique sunt alii, quorum historia apud medicos adeo sit imperfecta, ut nec locus nec character idoneus iis assignari queat. Ne tamen ejusmodi genera penitus omitterentur, ad calcem operis, omissorum, quotquot noverim, catalogum subjunxi, ut posterius perspicaciores, ea diligentius perpendentes, characteres & locum iis assignent.

Eodem consilio, ne scilicet tyronibus contemplanda præter necessitatem multiplicarentur, non genera solum, sed species morborum etiam ad minorem numerum redegi. Hoc magis periculosum videri potest, cum nullam speciem, quæ revera existat, recte omittere liceat. Ne quidem ad recensionem specierum ipse accederem, difficultas operis me dubium & timidum antehac diu cohibuit; & id tantum tentare ausus sum, ut species a SAUVAGESIO recensitas, serie paullo luculentiore & emendatiore traderem: Re autem amplius, & accuratius perpenſa, species jam recensurus, numerum earum, apud SAUVAGESIUM recensitarum, multum minuendum esse arbitratus sum.

20  
SOLUS quidem SAUVAGESIUS, nam SAGARUM nihil mor-  
ror, in recensione specierum quicquid præstitit; & li-  
cet egregius vir plurimis observationibus undique col-  
lectis multum de re medica meritis sit, haud tamen  
disimulandum, illum in multis graviter errasse, dum  
species revera easdem, sub diversa appellatione repeti-  
tas, pro diversis ponebat; & præsertim dum species  
sympathicas, tam sæpe idiopathicas immiscebat, qua  
ratione earum numerum totum præter modum auxit.  
Hos ut tollerem errores, quod potui feci, numerosis  
nempe apud SAUVAGESIUM speciebus; recte quantum  
ego judico, ad pauciores redactis.

Quod ut efficerem, primo species plures, ut diversas  
a SAUVAGESIO recensitas, pro una eademque habui, &  
sub uno titulo posui; atque hujus rei rationes locis  
suis idoneis posthac tradendæ sunt.

DEINDE, cum species idiopathicas solum pro ve-  
ris & genuinis enumerare velim, quotquot pro sym-  
ptomaticis habere potui, totidem ex numero specie-  
rum apud SAUVAGESIUM sustuli. Cum autem in re-  
censione specierum symptomaticarum aliquis usus  
sit, earum recensitionem, seorsum tamen, denuo appo-  
sui.

DENIQUE alia & præcipua ratio, qua specierum a  
SAUVAGESIO recensitarum numerum minuendum esse  
centui, ea est, qua plures ab eo pro diversis positas,  
pro specierum varietatibus, tantum habui & enume-  
ravi.

Hoc autem est, quod in Nosologia Methodica ma-  
xime difficile videtur, dicere nimirum, quid pro ipsa  
specie morbi, quid pro ejusdem speciei varietate, tan-  
tum habendum sit. Cum autem criteria illa, quæ in  
Zoologia & Phytologia, ad species a varietatibus cer-  
tius distinguendas adhiberi possint, in Nosologia Me-  
thodica nequaquam invenienda sint, varietates morbo-  
rum a speciebus distinguere ubique difficilior erit. Quan-  
obrem varietates plures recensere, tutissimum & te-  
re necessarium esse duxi. Ejusmodi vero distinctionem,



21

in artis usu utilissimam fore ratus, illam adhiberi ubique annisum sum; quod si non in omnibus, cum æque certa cognitione, cum aliqua saltem verisimilitudine diligenter quæ sequuntur pensatis, sæpe fecisse videor.

Cum morbus aliquis, quo plures homines laborant, symptomata cujusdam speciei characteristica omnia & sola, in unoquoque ostendit; quantumvis hæc in alio minus, in alio magis vehementia sint, hoc speciem diversam exhibere non putamus; & in universum, morbos gradu solum differentes, non nisi ejusdem speciei varietates præbere censemus.

Tunc igitur de varietate à specie distinguenda quæstioni tantum locus est, cum in diversorum hominum morbis, vel ex solitis cujusvis speciei symptomatibus, quædam absint, vel iisdem quædam addita sint.

Cum ex symptomatibus solitis quædam absint, quoties inter symptomata, quæ magis, & ea quæ minus essentialia sunt, distinguere liceat, ex horum absentia non nisi varietatem adesse concludimus.

Cum vero symptomatibus characteristicis alia quædam addita sint, si addita pro symptomatibus symptomatum, potius quam pro symptomatibus causæ haberi queant, varietatem tantum constituunt.

Denuo, cum symptomata addita, in specie data, prorsus insolita sint, & simul conditiones morbi præcipuas parum vel nihil mutari videantur, hæc quoque varietatem tantum præbere censenda.

Cum morbi genus quoddam ex principiis diversis oriiri queat, idem, ex diversitate principii, specie diversum evadere potest, nec semper tamen; nam, quotiescunque diversitas illa parva fuerit, & simul symptomata parum ab ea fuerint mutata, hoc etiam non nisi varietatem exhibere putamus.

22  
MORBI genus itidem, pro diversa ejus sede, *diversæ* speciei fieri potest; quotiescumque vero sedes diversa, neque partis structuræ, neque functionis ratione differat, hujusmodi sedis diversitas etiam pro varietate tantum habenda est,

PORRO, cum de morbis invicem distinguendis hic agatur, observari vellem, res duas esse, quæ ad similitudinem & affinitatem morborum, in diversis hominibus indicandam, plurimum facere possint,

ALTERA est, quod principii quædam similitudo, morborum inde in diversis hominibus genitorum similitudinem arguit: ita, quando morbi diversorum hominum, ex uno eodemque principio oriuntur; quando, etiam principium illud, ad morbum gignendum, in unoquoque necessarium sit; denique, quando idem principium ubique fere ejusdem qualitatis & vis esse videatur, tum demum morbos, ex ejusmodi principio genitos, ejusdem vel simillimæ naturæ esse judicare licet,

Hoc de morbis contagiosis, plerisque valere mihi videtur. Ex his enim sunt, qui in pluribus hominibus ab eadem specifica contagione oriuntur; nec, in eorum aliquo morbus, nisi ab illa contagione applicata, oriri unquam observatur; & simul illius contagionis vires & qualitates, ubique fere, eadem esse videntur. Quod ad proxime dictum spectat, id quibusdam dubium videri potest; sed, cum ejusdem contagionis effectus, per secula plura jam observati, semper & ubique admodum similes sint, eam qualitate & viribus eandem esse merito concludimus; &, ob hoc præsertim, quod effectus isti, quatenus diversi videantur, plerumque hominis infecti conditioni cuidam, potius quam contagioni, qualitate vel viribus diversæ, tribui possunt,

MORBOS itaque eadem contagione specifica ortos, simillimæ naturæ esse credendum; ejusmodi morbos etiam vix, nisi unicam ejusdem generis speciem, præbere; immo, earum diversitatem quandam aliquando observatam, non nisi ejusdem speciei varietatem indicare, suspicandum est.

Huc

Huc omnia, non solum de exanthematis contagiosis, sed etiam de plerisque febribus epidemicis, dicta velim. Hanc autem opinionem, de similitudine febrium epidemicarum proferens, a gravis auctoritatis viro SYDENHAMO, hujusmodi febres specierum plurimum esse statuente, dissentire cogor. Recte quidem, an secus multum dubito; & posteris litem dirimendam relinquo, hoc simul præmonito, plurimum medicinam facientibus inter futurum, de alterutrius sententiæ veritate sibi satisfacere, vel potius qui limites utrique sint ponendi, statuere.

ALTERA res, quæ similitudinem morborum in diversis hominibus ostendere possit, est similitudo remediorum quibus sanantur. Similitudo quidem morborum in similitudine causæ eorum proximæ, qualiscunque sit, revera consistit; cum remedia vero morbis medeantur, tantum quatenus causas eorum proximas tollant, morbos, qui iisdem omnino remediis sanantur, ejusdem naturæ esse oportet.

Hujusmodi ratiocinatio, tum ad phlegmasiarum missione sanguinis, tum ad febrium intermittentium cortice Peruviano sanatarum, similem naturam indicandam, plurimum certe facere potest. Hanc autem doctrinam, utcunque in praxi medica, aliquando utilem, fallacem tamen, neque in praxi, neque in Nosologia methodica, nisi caute admodum, adhibendam esse censeo. Apud vulgus medentium quidem, remedia eadem quibusque fere ejusdem generis speciebus, & harum varietatibus adhiberi, & hinc genera plura nullo modo specie differre, videntur. Sed peritiores norunt, morbos aliquo modo diversos, rarius quam putatur, ab iisdem prorsus remediis sanari. Bene etiam norunt, ex promiscua remediorum adhibitione fieri, quod eadem remedia adeo sæpe frustranea, sanationes saltem minus perfectæ sint. Porro norunt expertissimi, ad recte medendum omnino opus esse, ut remedia, non solum generi sed speciei cuique, & sæpe etiam varietatibus quibusdam, apprime sint accommodata.

AD artem medicam breviorē, & exinde faciliorem



reddendam, species morborum quascunque a varietatibus suis distinguendas esse arbitratus sum. Hanc tamen distinctionem in pluribus quodammodo incertam esse fateor, & in Nosologia methodica tutissimum fore puto varietates morborum plerasque notare & recensere. Hoc itaque præstare ubique annisus sum, aliis sapientioribus, qui posthac huic operi se immiscere velint, relinquens, discriminationem magis certam statuere.

EXPOSITA jamqua ratione morborum, tum generum, tum specierum, numerum minuere laboravi; superest, ut quo modo eorum, quæ admissi, characteres constituendi sunt, nunc exponam.

IMPRIMIS igitur notas externas sensibus nostris facile obvias ubique selegi, neglectis, vel potius rejectis, de statu corporis interno conjecturis quibuscunque. Porro ex notis quæ sensibus sunt obviæ, illas medici potius quam ægri sensibus percipiendas, semper prætuli: quum tamen has, utcunque fallaces, penitus negligere vel omittere non liceat.

SECUNDO, ea symptomata pro notis characteristicis præcipuæ feligenda putavi, quæ perpetuo cum morbo præsentia sunt, & hoc quidem semper annitendum esse puto. Cum vero plurimi morbi sub eorum decursu, aliam atque aliam omnino formam capiant, in his, ex serie rerum, & symptomatum sibi invicem succedentium, character sæpe necessario petendus est.

IN hac re autem tractanda, duplex quæstio exoritur. Prima est, an ex morbi principio characteris partem desumere liceat.

AD hanc responderi posset, quod, etiamsi de principiis morborum apud medicos judicium sæpe fallax, & prorsus falsum sit, nec temere idcirco ad morbos distinguendos adhibendum; cum eadem tamen aliquando satis certe nota sint, & facile observanda, hujusmodi prin-

29

principia in Nosologia, pro notis characteristicis recte adhiberi posse censeo.

ALTERA quæstio hic exoriens est, quatenus ex serie symptomatum, sub decursu morbi occurrentium, characterem ejus petere liceat? Ad hanc etiam posset responderi, quod cum plures morbi, uti exanthemata & febres intermittentes, nisi post decursum aliquot dierum, ex serie symptomatum sibi invicem succedentium nullo modo dignosci queant, ut hujusmodi morbi distinguantur, ex serie illa character necessario sumendus est. Characteres autem, non nisi post longum morbi decursum, fortassis non nisi post morbum finitum, statuendi, nequaquam in Nosologia usurpari debent. Ita apud Ill. LINÆUM *Februm continentium*, quas vocat, characteres a diuturnitate totius morbi desumpti profus inepti sunt.

In constituendis morborum characteribus regula tertia est, quod, cum quisque fere morbus ex plurium symptomatum concursu solum dignoscatur, ex iis pro notis characteristicis quot sufficiant, nec plura tamen adhibenda sunt. Priorēs Nosologi mihi videntur, in characteribus quos dederunt, plerumque nimis breves & deficientes fuisse; & forsan mihi vitio verti potest, quod aliquando sum in iisdem nimis longus & redundans. Nusquam quidem volens fui redundans; ut vero essem copiosus ubique me conatum fateor, prudentissimum fore ratus etiam ad redundantiam appropinquare: quippe posteris multo facilius erit, quod nimium est tollere, quam quod deficiat supplere.

In characteribus denique morborum constituendis, quæritur etiam, an ex defectu functionis cujuslibet, quæ in sano unoquoque exercetur, vel ex absentia symptomatum in aliis generibus vel speciebus apparentium, notas quasdam desumere liceat? SAUVAGESIUS quidem defectus functionum, utpote nihil positivum indicantes, pro morbis noluit admittere; plures igitur, qui a LINÆO sub ordine *constrictoriorum*, & a VOGELIO sub classe *episcæsum*, recensentur, penitus omisit.

SED pace tanti viri dixerim, quanquam defectus, si strictius loqui velimus, nihil positivum indicet; defectum tamen functionis, quam exercet quisque sanus, statum corporis humani exhibere, quem ut distingua-  
mus utilissimum est, atque necessarium, & ejusmodi status pro morbo recte haberi potest. Porro, etiam si in quibusdam defectus isti aliquando sine molestia vel morbi symptomate observentur; in plerisque tamen magnam molestiam, & symptomata plurima pariunt. In his igitur defectum functionum, sæpe symptomatum causam manifestam, pro morbo haberi licet, & ex ejusmodi defectu in plurimis morbis horum notas characteristicas petere licet & oportet. SAUVAGESIUS ipse in hac re parum sibi constare videtur, *Debilitatum* classem instituens, & *Amnesiam*, *Agripniam*, *Ischuriam*, & alia etiam tanquam genera recensens.

Quod notas ex absentia symptomatum, in aliis congeneribus apparentium, spectat; eas nequaquam bonas, & ubique fieri potest, evitandas censeo. In pluribus vero vitari, quantum video, non possunt; nec a quovis Nosologo adhuc fuerunt vitatæ.

Cum secundum has regulas characteres morborum constituendi sint, plurimum refert eosdem sermone accurato & luculento exprimere; nec minus, morbum quemque apto nomine insignire.

NORUNT eruditi, III. LINNÆUM methodum plantarum perfectiorem reddidisse, eo quod botanices linguam, usurpatis ubique vocibus maxime idoneis & definitis, magis accuratam effecit; nec quidem dubito quin delineatio morbi, ad instar delineationis plantæ, a LINNÆO exhibitæ, in Nosologia multum profutura sit. In Nosologia autem, ac in botanice, non æque necessarium esse videtur; tum quod tam multæ rerum circumstantiæ, in Nosologia, ac in botanice, notandæ non veniunt; tum quod symptomatologia, in quibuscumque fere Pathologiæ generalis systematibus exhibita, plurimum in hac re jam præstitit. Fatendum quidem, symptomatologias vulgo prolatas, nec adeo ple-



27  
plenas esse, nec adeo exactas, ac optandum esset; & si pleniores fierent, atque ubique voces magis idoneæ & accurate definitæ usurpatæ essent, ad Nosologiam perficiendam certe plurimum conferre posset. In hujusmodi vero tentamine cavendum est, ne distinctiones nimium subtiles & dubiæ adhibeantur, uti ab auctore *Observationum Clinicarum*, quæ Warlaviæ annis 1767, & 1768. prodierunt, factum fuisse opinor. Ipse quidem hujusmodi nihil tentavi, tum quod plus exegisset, quam per longum, tum quod mihi minus necessarium videtur, qui voces apud medicos usitatissimas, & in sensu vulgo recepto, ubique fere usurpandas curaverim.

Quod ad denominationem morborum attinet, in Classium, Ordinum, & Generum nominatione, eas, quantum potui, regulas observavi, quæ in LINNÆI *Criticis Botanicis*, & in ejusdem *Philosophia Botanica*, ab Ill. auctore traduntur.

QUANDO notiones novæ sunt proferendæ, etiam nova nomina imponenda sunt; & ejusmodi aliquando, parcius licet, adhibuimus. Tum vero nomenclaturam medicam diuturno usu confirmatam sine gravi causa mutare non liceat, ne factum esset ubique curavimus; quod tamen Ill. LINNÆUM sæpe nulla urgente necessitate fecisse & VOGELIUM appellationibus novis, frivolis, ineptisque, Nosologiam deturpasse, observavimus.

Ut clarior & certior habeatur morborum notitia, appellationibus selectis, synonyma, tum aliorum Nosologorum, tum auctorum maxime celebrium, ubique apposuimus. Hoc diligentius feci, ut inde norint studiosi, ex quibus præcipue scriptis morborum scientia optime obtineri possit.

IN recensendis specierum synonymis, appellationes, quibus SAGARUS usus sit, omisi, tum quod ipse aliorum auctorum synonyma ubique omittens, nos de specie-

ciebus, quas indicare voluit, incertos sæpe reliquit, tum quod in recensione specierum illum profecto minus peritum fuisse, & regulas Nosologiæ methodicæ optimas quasque neglexisse, nobis videtur.

SYNONYMA veterum medicorum adhuc omisi, non quod eorum scripta prorsus negligenda esse putaverim, sed quod ego neque satis certo, neque cum fructu, synonyma eorum indicare potuerim.

## CLASSIUM &amp; ORDINUM \*

## CLASSIS I. PYREXIÆ.

- ORDO I. FEBRES.  
 II. PHLEGMASIÆ.  
 III. EXANTHEMATA.  
 IV. HÆMORRHAGIÆ.  
 V. PROFLUVIA.

## CL. II. NEUROSES.

- ORDO I. COMATA.  
 II. ADYNAMIÆ.  
 III. SPASMI.  
 IV. VESANIÆ.

## CL. III. CACHEXIÆ.

- ORDO I. MARCORES.  
 II. INTUMESCENTIÆ.  
 III. IMPETIGINES.

## CL. IV. LOCALES.

- ORDO I. DYSÆSTHESIÆ.  
 II. DYSOREXIÆ.  
 III. DYSCINESIÆ.

IV.

---

\* Classium institutionem primo a SAUVAGESIO datam, LINNÆUS, VOGELIUS, & SAGARUS, in omnibus fere, secuti sunt. Cum vero ex eorum classibus plures sint, uti VITIORUM, ANHELATIONUM, DOLORUM, & FLUXUUM, neque naturales, nec quovis modo idoneæ, ejusmodi institutionem sequi non potui. Aliam itaque simpliciore, & in universum, ut mihi videtur, aptiorem, hic protuli. Hæc fortasse etiam minus absoluta videri posset, quod inter morbos totius systematis, in primis tribus classibus recensitos, & illos partis singularis, sive LOCALES, in classe quarta col-  
 loca-



# GENERA MORBORUM

IV. APOCENOSES.

V. EPISCHESES.

VI. TUMORES.

VII. ECTOPIÆ.

VIII. DIALYSES.

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones læsæ, viribus præsertim artuum imminutis. \*

SYNONYMA. Morbi febriles, *Auctorum*.

ORDO I. FEBRES.

Prægressis languore, lassitudine, & aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres *Auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. Sig. Cl. XII.

Morbi febriles critici L. Cl. II.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, miasmate paludum ortæ, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabili, & plerumque cum horrore redeuntibus

locatos, distinctio non ubique facilis erit. Hoc quidem, rarius licet, aliquando fieri posse concedimus. Sed nihil præstantius nobis nunc suppetit; &, ob rationes in Prolegomenis allatas, de perfecta classum institutione non admodum solliciti sumus.

\* Quod hic, & pluribus quæ sequuntur locis, nobis forsitan vitio verti possit, quodammodo hic obiter excusare liceat. Ita dici potest, pyrexias aliquando videri, quas nullus præcefferat horror, & pyrexias in quibus neque pulsus frequentior, neque calor major, quam in sanis esse solet; characterem ideo datum neque verum, neque ubique adhibendum. Istiusmodi pyrexias, rarissime licet,

bus, constantes: Paroxysmo quovis die unico tantum \*.

Intermittentes *Auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II. O. II. V. Cl. I. O. I. *Sag.* Cl. XII. O. III.

Remittentes *Auctorum* S. Cl. II. O. II. *Sag.* Cl. XII. O. II. †.

Exacerbantes L. Cl. II. O. III.

Con-

licet, aliquando videri negare nolo; sed in characteribus classium, ad species dignoscendas adhibendis, ut singulæ classis notæ in unaquaque specie conspiciantur, haud necessarium videtur, & sufficit, si earum pleræque in specie quavis adsint.

Character idoneus quisque, plurium notarum sive symptomatum concursum notare debet, & male quidem cum veteribus VOGELIUS calorem auctum solum, & recentiores SYLVIUS, & Cel. BOERHAAVIUS pulsuum velocitatem solam, pro characterē pyrexiae, sive febris, ut vocant, posuerunt. Certe, qui dicunt febrem adesse, etsi pulsus nihilo naturali frequentior sit, ex aliis quam velocitate pulsuum signis febrem adesse judicant: quod etiam plurium symptomatum notationem, in quovis characterē necessariam esse, ostendit.

Porro, hic obiter observari velim, pulsuum velocitatem solam, pyrexiam vel febrem adesse nequaquam semper indicare; cum a causis externis plurimis pulsus sit naturali velocior, sine morbo, sive quavis functionum læsione. Hisce de pyrexiae characterē quæstionibus, in characterē a nobis hic dato, quantum potuimus, prospectum est. Sed, in aliis classium & ordinum characteribus plerisque, si ad species plerasque character recte adhiberi possit, paucas exceptiones non moror. Utilem plerumque fuisse mihi sufficit, ubique perfectam fore non spero.

\* Qui perpenderit quæ de febribus *remittentibus*, quæ videntur continuæ, a *continuis* strictius dictis distinguendis, mox dicenda sunt, facile videbit quamobrem, tum intermittantium tum continuarum characterem antea datum, hic mutare necessarium habui.

† *Februm remittentium*, quasi a febribus *intermittentibus* exquisitis prorsus differentium, ordinem separatum instituerunt Nosologi SAUVAGESIUS, LINNÆUS, & SAGARUS; minus recte tamen, si mihi judicare fas sit. *Remittentes* enim, quæ dicuntur, ex eodem principio,

Continuæ V. Cl. I. O. II. \*

Continue periodicæ *Sennert.* de febr. Lib. II. cap.

13.

Continuæ remittentes, *Boerb.* Aph. 727.

Compositæ ex acuta periodo, *Junk.* Tab. 82.

Continuæ remittentes, proportionate, *Terti.* Therap. Spec. L. V. cap. I.

Continentes *Mortoni.* Exerc. II.

## GENUS I. TERTIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo quadraginta octo circiter horarum: Accessionibus meridiani.

*Tertiana Auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2. *Sag.* pag. 704. *Hoff.* Tom. II. pag. 11. *Stabl.* de tertiana febris genium universum manifestante Halæ 1706. *Ejusd.* Casual. magn. Caf. 21. Casual. min. Caf. 96. *Cleghorn's* diseases of Minorca, cap. III. *Senac*, de recond. febr. natura. *Edinb. Med. Ess.* vol. IV. art. 24.

TERTIANA est vel

I. Interposita apyrexia quæ

I. Variat paroxyfmi duratione.

A. Tertiana paroxyfmi haud ultra horas duodecim extensis.

Ter-

pio, miasmate nempe plaudum, ac *intermittentes*, oriuntur, iisdem in locis, & eodem anni tempore, utraque simul epidemice grassatur; utraque iisdem prorsus remediis sanatur; & sæpissime in eodem homine idem, quæ videtur, morbus, nunc intermittens, nunc remittens typum exhibet. Morbi idcirco causis, sanatione, & typo simillimi, nec ad ordinem, nec ad sectionem diversam distrahendi erant.

\* Magis inconsulto adhuc *VOGELIUS remittentes* omnes cum *continuis* sociavit. *Continuæ*, quas vocamus, omnes quidem remissiones & exacerbationes ostendunt; sed a *remittentibus* ad *intermittentes* merito referendis, plurimum aliis multis differunt, ut mox dicetur.



Tertiana legitima, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 18. *Hoffm.* Tom. II. pag. 12.

Tertiana vera, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis,

Tertiana notha sive spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18, *Clegh.* Min. p. 140, *Hoffm.* Tom. II. pag. 12.

2. Variat paroxysmorum recurso,

C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inæqualibus, alternis similibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V, G. 12. *Clegh.* Min. 141.

Duplicana L. 18:

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones*, de febr. interm. P. II. cap. 6, *River.* Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex. S. sp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Semitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galen.* *Spig.* de semitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertiana quotidie revertens, interposita remissione inter diem imparem & parem magis, inter parem & imparem minus, notabili.

Hemitritæus, *Celsi* L. III cap. 3.

Semitertiana, *Clegh.* Min. p. 143. \*

Tom. II.

C

Se-

\* Fortassis hemitritæa quævis ad remittentes relegari possit, & licet a finis separare nolui, limites non satis certe ponendos esse fateor.

Semiterteriana secundi ordinis, *Galen*, *Spig.* L. II. c. 5.

Amphimerina hemitritæus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo hemitritæus, S. sp. 9.

### 3. Variat symptomatibus.

#### G. Tertianæ affectibus soporosis stipata.

Tertianæ carotica, S. sp. 10. *Welhof.* de febribus, & auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertianæ hemiplegica, S. sp. 20. *Welhof.* ibid.

Quotidiana soporosa, S. sp. 8. *Car. Pis.* observat. 175. 176.

Febris caput impetens, *Sydenh.* Ep. ad R. Brady.

#### H. Tertianæ spasmi & motibus convulsivis stipata.

Tertianæ asthmatica, S. sp. 6. *Bonet.* Polyalth. Vol. I. p. 250.

Tertianæ hysterica, S. sp. 8. *Wedelli* A. N. C. Dec. I. A. II. obs. 193.

Hysteria febricosa, S. G. 135. sp. 8. A. N. C. Dec. I. Ann. II. obs. 193.

Tertianæ epileptica, S. sp. 16. *Calderæ* Trib. med. p. 225. *Lautter*, Hist. med. bienn. Cap. II. cas. 2.

Quotid. epileptica, S. sp. 3. *Edinb. Essays*, Vol. V. P. II. art. 49.

Ecclampsia febricosa, S. G. 133. sp. 17.

Epilepsia febricosa, S. G. 134. sp. 9.

Tertianæ tetanodes *Medici* Beobacht. I. Band. p. 24.

Tetanus febricosus, S. G. 122. sp. 10. *Stork*, Ann. Med. II. p. 163.

#### I. Tertianæ efflorescentia cutis stipata.

Tertianæ petechialis, S. sp. 3. *M. Donati*, L. III. cap. 14. *Lautter*. Hist. Med. cap. II. cas. 10.

Tertianæ scorbutica, *Wedel.* A. N. C. Dec. I. A. II. Obs. 193.

Tertianæ urticata, S. sp. 22. *Planchon.* Journ. de med. 1765. *Clegb.* Minorc. p. 157.

Tertianæ miliaris, S. sp. 21. *Walthieri* de med. German. apud *Koncalli* Europ. med. p. 151.

**K. Tertianæ phlegmasia stipata.**

Tertianæ pleuritica, S. sp. 4. *Valesii* in epid. L. I. Sect. 3. *Laut.* hist. med. cap. II. cas. 5. 9.

Pleuritis periodica, S. G. 103. sp. 14.

Tertianæ arthritica, S. sp. 5. *Morton* Exerc. I. cap. IX. hist. 22. *Laut.* loc. cit. cas. 19.

**4. Variat aliis morbis complicata.**

Tertianæ scorbutica, S. sp. 9. *Etmuller*, prax. L. I. Sect. XVI. cap. 2. *Timæi* L. VIII. cas. 15.

Tertianæ syphilitica, S. sp. 17. *Deidier* de morb. vener. Sect. IV.

Tertianæ verminosa, S. sp. 18. *Stiffer*. in Act. Helms-  
stad. *Laut.* de noxis palud. L. II. cap. 5. & 6. III.  
*Pringle* Diseases of the army, p. 98. *Ramazzini*  
const. epidem. rural. ann. 1690. Sect. XI. *Van der*  
*Bosch*. Const. epid. verminos. ann. 1700. &c.

**5. Variat ratione principii \*.**

Tertianæ accidentalis, S. sp. *Syltambam*, cap. 5.

Tertianæ a scabiæ S. sp. 11. *Junker*, tab. 30. *Hoffm.*  
II. p. 12.

**II. Interposita remissione tantum \*\*.**

Tritæophya, S. G. 85. *Sag.* p. 695.

C 2

Tri-

\* Nullum quidem febrium intermittentium principium sufficiens præter miasina paludum agnoscimus : sed, cum miasina hoc non semper validum sit ad morbum arcessendum, nisi aliæ potestates excitantes simul agere concurrant; has potestates excitantes pro parte principii hic admittimus, licet neutiquam morbum excitassent, si miasina paludum non antea applicatum fuisset.

\*\* Tertianæ Remittentes variant adeo, tum typi, tum symptomatum ratione, & formæ earum diversæ adeo sæpe in eodem homine inter se commutantur, ut in iis de nominandis nihil fere quod perpetuum sit, effèrri possit. Tertianas autem, quas comitatas dixit TORTI, eas scilicet quæ symptomate quodam peculiari & gravi comitantur, recensui : dein, ut cætera ad hanc rem pertinentia intelligantur, auctores plures qui de tertianis remittentibus optime scripserunt, & exempla earum præcipua exhibuerunt, enumeravi.



Tritæus, L. 21.

Hemitritæa, L. 23.

Tertianæ remittentes & continuæ *Auctorum*.

Tertianæ subintrantes, proportionatæ, subcontinuæ

*Torti Therap. Special. L. III. cap. 1.*

Tertiana subcontinua, S. sp. 19.

Quotidiana deceptiva, S. sp. 2.

Amphimerina semiquintana, S. sp. 24.

Tritæophya deceptiva, S. sp. 10.

Ex Tertianis comitatis *Torti* loc. cit. præcipuæ sunt.

A. Tertiana cholERICA sive dysenterica. *Tort. ibid. Lautter, Hist. med. cas. 6. 16. 17. 20. Morton, App. ad Exerc. II.*

B. Tertiana subcruenta sive atrabilaris, *Tort. ibid. Hæc a Clegbornio nunquam visa est.*

C. Tertiana cardiaca, *Tort. ibid. Lautter, Hist. med. cas. 15. 18. 23.*

Amphimerina cardiaca, S. sp. 5. \*\*

Tritæophya affodes, S. sp. 6.

Febris continua affodes, V. 27.

D. Tertiana diaphoretica, *Tort. ibid.*

Tritæophya typhodes, S. sp. 4.

Tritæophya elodes; S. sp. 5. †

Febris continua elodes, V. 21.

E. Tertiana syncopalis *Tort. ibid. Lautter, cas. 11. 12. 13. 15. 16.*

Tritæophya syncopalis, S. sp. 1.

Amphimerina syncopalis, S. sp. 4.

Amphimerina humerosa, S. sp. 6.

Fe-

\* Amphimerinas inter & Tritæophyas, uti inter quotidianas & tertianas duplices, distinctio sæpe difficilis. Sed quotidianas tertianis multo rariores, & œconomiam animalem in febres typi tertiani maxime proclivem esse norunt experti; hinc plures amphimerinas ad tertianas remittentes retuli. Judicent autem autoptæ.

† De typo febris sudatoriae *Boyeri Med. à suivre dans les malad. epidem.* quam huc retulit Sauvagesius, ex ipsius Boyeri descriptione mihi liquet, & ad Typhum referri mallet.

Febris continua syncopalis, V. 29.

F. Tertianæ algida, *Tort. ibid. Lautter*, cas. 13.

Amphimerina epiala, S. sp. 3.

Amphimerina phricodes, S. sp. 7.

Tritæophya leipyria, S. sp. 9.

Tertianæ leipyria, S. sp. 23. *Valcarengbi Med. Ration. p. 18.*

Febris continua epiala & leipyria. V. 19. & 14.

G. Tertianæ lethargica, *Tort. ibid.*

Tritæophya carotica, S. sp. 7. *Lautter*, i. 7. 14.

Tertianæ apopletica *Morton. Exerc. i. cap. IX. Hist. 25.*

Tertianæ soporosa *Welhof. de febr. p. 6.*

Febris epidemica Urbevetana *Lancis. de noxis pal. effluv. I. II. c. 3.*

Tertianarum remittentium exempla præcipua, nobis nota, sunt sequentia.

Causos *Hippocratis. De Morb. Vulg. L. III. sect. 3.*

Tritæophya causus, S. sp. 2.

Febris ardens *Boerhaavii, Aph. 738.*

Remittens ardens sive causus, *Macbride*, p. 360.

Tertianæ perniciofa, quæ simulata tertiani circuitus effigie lethalis, & mille accidentibus periculosissimis implicata, existit. *Lud. Mercatus de febribus, Lib. VI.*

Tertianæ pestilens, *P. Sal. Diversus de febre pestilent. cap. X.*

Tertianæ maligna pestilens *Riverii, L. XVII. Sect. II. c. i. & Sect. III. c. 3.*

Morbus Hungaricus *Lang. Lemb. L. I. Ep. 4. Sennert. de febr. L. IV. cap. 14. Jordan. de pestis phaen. cap.*

Languor Pannonicus *Cober. obs. castr. Hung. i. obs. 6. &c.*

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Vide postea notas ad Typhum.

Hemitritæus pestilens, *Schenck obs. L. VI. ex Corn. Gemma.*

Febres pestilentes Ægyptiorum, *Alpin. de med. Ægypti. L. I. cap. 14.*

Febris tertiana epidemica, *Bartholin. Hist. anat. cent. II. 56.*

Febres epidemicæ Autumni ann. 1657. & 1658. *Willis* de febr. cap. 16.

Febris synoches epidemica ab ann. 1658. ad 1664. & postea ab ann. 1673. ad 1691. *Morton*. App. ad Exerc. II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morb. acut. ad ann. 1661—1664. & in epist. ad *H. Paman.* ad 1678. & seq.

Affectus epidemicus Leidensis, *Fr. Sylvii* Prax. med. app. tract. X. & oratio de affectus epidem. causis.

Morbus epidemicus Leidensis 1669. *Fanois*, Diss. apud *Haller.* Disp. tom. V.

Tertianæ perniciosæ & pestilentes & febres castrenses epidemicæ *Lancisi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalæ & mali moris, *Hoffm.* II. p. 38.

Febris cholericæ minus acuta. *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidens. ann. 1719. *Koker* apud *Haller*, Disp. tom. V.

*Amphimerina* paludosa, S. sp. 19.

Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army, Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

Bononiensis constitutio hiemalis 1729. *Beccari* in A. N. C. Vol. III. Obs. 48.

*Amphimerina* biliosa, S. sp. 22.

Remittens biliosa *Macbride*, p. 360.

Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, *Huxham* de aere ad ann. 1729.

Febris biliosa Lausanensis, *Cl. Tissot.* de febr. bilios.

*Tritæophya* Wratislaviensis, S. sp. 3. *Hahn.* Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.

*Tritæophya* Americana, S. sp. 12.

Febris anomala Batava, *Grainger* de febre anomala.

Morbus Naronianus *Pujati* de Morb. Naron.

Febris continua remittens, *Hillary's* Dis. of Barbadoes, variis annis, Lond. Med. Obs. IV. 24. V. 2.

Febris A. 1772. & seq. ad urbem novam Avenionensem, Soc. Royale de Medicine I. Histoire, pag. 213.

Febris intermittens irregularis Tolosæ 1772. Soc. Royale I. Mem. p. 14.

Febris intermittens & remittens a l'Isle Jourdain, A. 1777. Soc. Royale II. Hist. p. 145.



Febris remittens Indiæ Orientalis, *Lind.* Med. Edin.  
Diff. Inaug. 1768. Lond. Med. Obs. Vol. IV. art.

12.

Febris critica & febris biliosa æstatis, *Rouppé* de  
morb. navig.

Febris remittens regionum calidarum, *Cl. Lind.* Med.  
Haslar. Essay on the diseases of hot climates.

**Tertiana remittens symptomatica est.**

*Tritæophya lactea*, S. sp. 8.

Febris lactea, *Etmulleri* Coll. consult. cas. 57.

G. II. Q U A R T A N A.

Paroxysmi similes intervallo septuaginta dua-  
rum circiter horarum: Accessionibus po-  
meridianis.

Quartana *Auctorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Sag.* 711.  
*Hoffm.* H. p. 23. *Junk.* tab. 81.

Est vel.

I. Interposita apyrexia.

i. Variat typo.

A. Quartana paroxysmis quarto quoque die  
singulis; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. sp. 1. *Sydenham* de morb. acut.  
cap. V.

B. Quartana paroxysmis quarto quoque die  
binis; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. sp. 4. *Bonnet.*

C. Quartana paroxysmis quarto quoque die  
tribus; intermediis diebus nullis.

Quartana triplicata, S. sp. 16.

**D.** Quartana quæ ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana duplex, S. sp. 3. V. 13.

**E.** Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana triplex, S. sp. 3. V. 14. *Barthol.* II. anat. c. 1. 95.

## 2. Variat symptomatibus.

Quartana cataleptica, S. sp. 7. *Bonet.* Polyalth. vol. 1. p. 805.

Quartana comatosa, S. sp. 15. *Welhof* de febr. C. *Pissonis* Observ. de morbis a colluvie serof. obs. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.

Quartana epileptica, S. sp. 8. *Scholzii* Conf. 379. 380.

Quartana hysterica, S. sp. 10. *Morton.* Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.

Quartana nephralgica, S. sp. 9.

Quartana metastatica, S. sp. 17.

Quartana amens, S. sp. 12. *Sydenham* de morb. acut. cap. V.

Quartana splenetica, f. sp. 2. *Ermuller.* Coll. conf. cas. 25.

Quartana hepatica, *Macb.* p. 354.

## 3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana syphilitica, S. sp. 6. *Plateri* obs. L. III. p. 676. *Edinb. Ess.* art. XLVII. obs. 8.

Quartana arthritica, S. sp. 11. *Musgr.* de arthr. sympt. cap. IX. H. 4. & 5.

Arthritis febrilequa, S. sp. 10.

Arthritis febricola, S. sp. 10. *Werlhof.* de febr. *Cockburn* de morbis navigantium, obs. 19.

Quartana scorbutica, S. sp. 14. *Barthol.* de med. Dan. diss. IV. *Tim.* L. VIII. cas. 18.

## II. Interposita remissione tantum.

Tetartophia, S. G. 85. *Sag.* 323. L. 22.

Quar-

Quartana remittens *Auctorum*.

Varietates sunt.

Tetartophya simplex, S. sp. 1. \*

Amphimerina semiquartana, S. sp. 23.

Tetartophya maligna, S. sp. 5.

Tetartophya maligna, S. sp. 6. *Lautter. Hist. med. cas. 21. M. Donat. L. III. cap. 14. ex M. Gatina-  
naria. Horst. L. 1. obs. 15.*

Tetartophya carotica, S. sp. 4. *Werlhof. de febr. Eim-  
chi Hist. hep. par. III. const. ann. 1718. pag. 751.*

Tetartophya splenalgica, S. sp. 2. \*\*

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. *Car. Pis. in præf.  
pag. 33.*

Amphimerina spasmodica, S. sp. 16.

### ERRATICÆ.

Ad Tertianam vel Quartanam ERRATICAS S.  
pertinere putamus \*\*\*; & hic ideo earum va-  
rietates subjunximus.

Erratica quintana, S. sp. 1. *Tulp. L. III. 52. Forest.  
L. III.*

\* Quartanam continuam morbum rarissimum esse, te-  
stantur scriptores medici omnes; sed illius exemplum ex  
*Franc. Joelis* operum tomo 3. citat SAUV. In loco au-  
tem citato, nihil ad rem pertinens inveni; sed tomi  
quinti pag. 63. hæc verba proferuntur. Febris quartanæ  
„ Species veteres duas constituunt. *Quartanam conti-  
nuam*, ( quæ mihi septuagenario nunquam visa est, &  
ideo eam aut rarissimam, aut nullam esse judico ), &  
*Interpolatam*, quæ frequentissima est. “

\*\* Huc febrem Fernelianam *Raym. Fortis* refert  
SAUV. & vult febrem ita a *Forte* dictam fuisse; quod  
ea mortuus sit ipse Fernelius: sed quodammodo hic er-  
rasse SAUVAGESIUS mihi videtur. Nam febres quas-  
dam Fernelianas vocat Fortis, Tom. II. obs. 35. & 36.  
non quod e genere remittentium fuerint, sed quod visce-  
ris cujusdam, hepatis præsertim, labe comitatae sint; &  
mortuus quidem est Fernelius ex inflammatione lienis.  
Sed quod hic morbus quartanæ typum unquam exhibuit,  
non dicitur a *Plantio*, qui in vita Fernelii, operibus e-  
jus præfixa, de eo morbo narrat.

\*\*\* Vide Senacum de recondita febrium natura, L.I.  
Cap. I.

L. III. obs. 43. ex quartana ill. *Van Svvieten*, Comm. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. *Boerb.* apud ill. *Van Svvieten* ibid. M. Don. L. 3. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto*.

Septimana, ill. *Morgagn.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. sp. 3. *Etmuller* prax. L. I. Sect.

XV. cap. 2. *Cyrilli* in *Etmuller*, pag. 187. 188. 365.

*Valles* Controv. L. V. cap. 25. P. *Sal. Div.* in not.

ad D. A. de *Altomari*, cap. XII. *Zacut. Lus.* P. M.

L. III. obs. 34. *Schultzius* in E. N. C. D. I. ann.

IV. & V. ob. 70. *Arnold.* de febr. Stomach. epid.

§. IV. apud *Haller.* Diss. Pract. Vol. V. de *Hæn.* de divis. febr. div. iv. p. 9.

Hemicrania lunatica, S. sp. 10.

Erratica nonana, S. sp. 4. *Zac. Lus.* ibid.

Erratica decimana, S. sp. 5. *Zac. Lus.* ibid.

Ephemera dichomene, S. sp. 11. M. Don. L. III. 14. ex *Gentili*.

Erratica vaga, S. sp. 6. *River.* cent. III. obs. 32. *Etmuller.* L. I. S. XV. c. 2.

### G. III. QUOTIDIANA.

Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circiter horarum; Paroxysmis matutinis.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1.

*Hoffm.* I. 33. *Junck.* tab. 79.

I. Interposita apyrexia.

I. Variat solitaria.

A. Universalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana simplex, S. sp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert.* de febr. cap. 18.

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. sp. 10. *Cnoffel* E. N. C. D.

I. A. III. obs. 207. *Edinb. Med. Eff.* vol. I. art.

31. vol. II. art. 19.

Quo-



Quotidiana cephalalgica, S. sp. 6. *Morton*. Pyret. exerc. I. Hist. 27. *Van. Svvieten. in Boerb.* p. 534. Soc. Royale, II. Mem. p. 38.

Cephalalgia intermittens, S. sp. 7.

Cephalæa febricosa, S. sp. 4.

Quotidiana ophthalmica, *Morton*, *ibid.* hist. 17. *Van Svviet.* *ibid.*

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

## 2. Variat comitata .

Quotidiana ischiadica, S. sp. 5. *Edinb. Eff.* vol. V. art. 49.

Ischias intermittens, S. sp. 1.

Quotidiana nephralgica, S. sp. 7. *Morton.*, *ibid.* hist. 28.

Nephralgia febricosa, S. sp. 13.

Quotidiana uretico--sputatoria, *B. Scharf.* E. N. C. D. II. A. II. obs. 104.

Quotidiana epileptica, S. sp. 4. *Edinb. Eff.* loc. cit. Hysteralgia, febricosa, S. sp. 9.

## Vespertinæ vel symptomaticæ videntur sequentes .

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

## II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 29. *Sag.* G. 321.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianæ remittentes & continuæ *Auctorum.*

Amphimerina latica, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller* Coll. conf. cas. 32. *River.* obs. cent. I. obs. 57.

Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.

Febris continua Lyngodes, V. 26.

Amphimerinæ S. cæteræ vel ad tertianas pertinere, quorsum plures supra retuli, vel symptomaticæ & vespertinæ esse videntur. Hujusmodi sunt.

Amphimerina catarrhalis S. sp. 3.

Am-

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De Amphimerina mimosa Bontii & phrenitica ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

## SECT. II. CONTINUÆ. \*

Febres, sine intermissione, nec miasmate paludum ortæ, sed cum remissionibus & exacer-

cer-

---

\* *Quæ sine exacerbatione partiali, & sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem ægritudinis perseverat, Febrem Continuam esse, dixit SAUVAGESIUS; & hujusmodi febres, cum scholis medicis plerisque, Continentes vocat LINNÆUS. Hujusmodi autem febrem in quadraginta annorum praxi fatis frequenti, vix unquam certo vidi; & fere semper in febribus, maxime continuis, exacerbationes & remissiones, etiam quotidie, fatis manifestas observavi. Mecum quidem sentire videtur VOGELIUS, uti ex ejus continuarum caractere fatis patebit; nec dissentit experitissimus DE HAEN, uti videre est in libro ejus de divisione febrium; Divis. IV. Schol. 1. & apprimè sententiam nostram confirmat BRENDELIUS verbis sequentibus: „ Omnes namque febres nostræ, acutæ, & inflammatoriæ, & exanthematicæ, & malignæ, reliquæve hujus generis, sunt continuæ remittentes, & luculenta intensio-  
num remissionumque spatia integrant. “  
Brendel. Opuscul. P. II. Diss. XI. sect. 5.*

Porro, etsi in febribus quibusdam exacerbationes & remissiones parum notabiles, & perinde observatu difficiles sint; easdem tamen revera fieri censeo; & ob hoc præfertim, quod in febribus quibuscunque, ex paroxysmis pluribus manifesto constantibus, paroxysmus quisque, inter nycthemeræ spatium, cursum suum, ex exacerbatione & remissione constantem, semper absolvat, ita ut in his rebus œconomiam animalem circuitus diurni legi cui-dam subjici videatur. Huic etiam in sanitate parere so-

let,

cerbationibus, parum licet notabilibus, perstantes: Paroxysmis quovis die binis. \*

Continuæ, S. Cl. H. O. I. V. Cl. I. O. II. Sag. 666. Macb. p. 303. Boerh. 727.

Continentes, L. Cl. H. O. I. Stahl. Cas. magn. 35. Cas. min. 87. Junck. 58. Sennert. de febr. L. II. cap. 2. & 10.

#### G. IV. SYNCHIA. \*\*

Calor plurimum auctus, pulsus frequens, validus,

let, & huic in febribus hecticis quibusque ad amussim subjicitur. Verisimillimum itaque videtur, eundem circuitum, quem toties observavimus, in febribus quibuscunque locum habere; nec febrem quamcunque continenter revera in rerum natura dari.

\* Cum continuam quamque ex paroxysmis repetitis consistere ponimus, sæpe ambiguum fieri possit, utrum febris data ex continuarum sit, an ex remittentium ordine, & ut rite determinetur, tum intermittendum ad quas omnes auctorum remittentes pertinere putamus, tum continuarum, definitionem aliam quam antea nunc dedi. In plerisque casibus, ut opinor, definitiones nunc datæ satis facile & certo adhiberi possint. Sed sagacioribus quibusvis examinandum relinquo, an vel definitiones nostræ recte dentur, vel si quid rectius dari queat. Febrem quamque continuam ex paroxysmis quovis die binis constare credimus; cum autem in quibusdam, tum intermittentibus tum remittentibus, itidem paroxysmi duplicati videantur, ex illa nota sola febres continuæ dignosci non possunt. Ex illa nota sola quidem ut dignoscantur nequaquam volui; nam in casu quovis ambiguo, vel a principio, vel a typo, vel ortu ab intermittentibus, remittentem quamvis cognosci posse putò. Videant porro in his rebus versati, annon a principio, sæpe manifesto & maxime frequenti, contagione nimirum humana, febres continuæ sæpe certe cognosci possint.

\*\* Febrium continuarum divisio a GALENI temporibus in hunc usque diem eadem fere usitata est, & vel ex putredinis gradu parum accurate definito, vel ex duratione morbi, desumpta fuit; utraque tamen nota, posterior præsertim, qua præcipue usi sunt Nosologi

SAU-

lidus, & durus; urina rubra; sensorii [fun-  
ctio]nes parum turbatae.

Synocha S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.

Synocha sive febris acuta sanguinea, *Hoffm.* II.  
105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, *Boerb.* 729.

Ephemer, S. G. 79. *Boerb.* 728. *Junck.* 57.

Diaria, L. 11.

Febris inflammatoria *Auctorum.*

### Varietates sunt:

Synocha plethorica. S. sp. 1.

Synocha sanguinea, *Sennert.* de febr. L. II. c. 11.

Ephemer plethorica, S. sp. 1.

Ephemer a frigore, S. sp. 3.

Ephemer a calore, S. sp. 4.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Febris pleuritica Anno 1765. *Sydenh.* sect. V.

c. 1. 5.

Synochus reumatifans, S. sp. 7. *Sydenh.* sect. V.

cap. 2.

Synochus hiemalis, S. sp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad tract.  
de hydrop.

### Symptomaticæ sunt:

Ephemer nauseativa, Sp. sp. 2.

Ephe-

SAUVAGESIUS, LINNÆUS, & SAGARUS, manifeste inepta est. Vide *Prolegomena*. Aliam itaque divisionem a differentia symptomatum, & a natura morborum, quantum de ea judicare liceat, desumptam, institui; secutus simul illam apud Britannos nunc maxime usitatam divisionem febrium continuarum in *Inflammatorias* & *Nervosas*. Has autem appellationes, utpote quodammodo theoreticas, vitavi. Nomina, quibus usus sum, apud medicos dudum recepta sunt: & si forsitan sensu vulgo recepto, in quo medici ipsi parum constantes fuerunt, iis non usus sum, parum curo, dum definitiones subjunctæ ab errore quovis præcavere possint.



Ephemera a phlogosi, &c. Sp. 6.

Synocha dolorum, S. sp. 7. M. Tab. O. I. G. 1.

Sp. 1. Var. D.

Ephemera lactea, S. sp. 5.

Ephemera menstrua, S. sp. 8.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5. M. Tab. O. I. G. 1.

Sp. 1. V. E.

Synocha scorbutica, S. sp. 6.

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Synocha cephalalgica, S. sp. 8. M. Tab. O. I. G. 1.

Sp. 2. V. A.

## G. V. TYPHUS.

Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; urina parum mutata; sensorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82. Sag. 677.)

Species sunt:

1. Thyphus ( *petechialis* ) plerumque cum petechiis.

Variat gradu. \*

1. Thy-

\* Morbos gradu solum differentes nominibus diversis insignire nequaquam convenit: cum autem nuperis temporibus apud medicos usitatum sit, febrem quandam, quasi ab aliis quibusvis differentem, nomine Febris Nervosae appellare; huic opinioni quodammodo morem gerens, sub titulo *Typhi Mitioris*, variorum auctorum febres ad recentiorum nervosas aliquomodo referendas recensui. In hac re autem, cum limites neutiquam accurate ponendi sunt, me accuratum fuisse non dixerim.

Minus adhuc placuit, ad mentem vel veterum vel recentiorum inter febrium genera aliquod sub nomine Febris Putridae recensere. In omni *typho* humorum in putredinem proclivitatem adeste puto; sed vario tantum gradu adest, ita ut major minorve putredo speciem variare, nequaquam mutare, potest. Sufficiat sub titulo *Typhi gravioris* eas, quae praesertim putridae adpellatae sunt febres, indigitasse, uti ex apposis variorum auctorum appellationibus satis patebit.

## 1. Typhus mitior.

Febris inaligna hectica sive lues *noupwds* convulsiva  
*VWillis* de morb. convulsiv. cap. 8. \*\*

Febris pestilens *Fracaſtor.* de morb. contag. L. II.  
 cap. 4.

Febris pestilens sine caractere veneni *Forest.* L. VI.  
 obf. 26.

Febris hectica pestilens *Forest.* L. VI. obf. 32.

Febris nova ann. 1085. *Sydenham* Sched. monitor.

Febris putrida nervosa *Wintriagh.* Comm. Nosolog. ad  
 ann. 1720. 1721.

Febris lenta nervosa. *Huxham* on fevers, chap. 3. Ed.  
 Med. Ell. II. 18. IV. 23. V. 48.

*Macb.* p. 304. Soc. Royale I. Mem. p. 23.

Febris contagiola. *Lind.* on fevers ad infection: *pas-*  
*ſim.*

Typhus nervosus, S. sp. 2.

Typhus comatosis, S. sp. 3.

Tritæophya typhodes *Mangeti*; S. sp. 11. *Raym. Fort.*  
 de febribus, p. 24. M. 304.

## 2. Typhus gravior.

Febris pestilens, *P. Sal. Divers.* de febre pestilenti.

Febris pestilens Ægyptiorum, *Alpin.* de med. Ægypt.  
 L. I. cap. 14.

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Cephalitis Epidemica, ann. 1510. S. sp. 6.

Febris pestilens maligna *Sennert.* de febribus, L. IV.  
 cap. 10.

Febris maligna pestilens *River.* L. XVII. sect. III.  
 cap. 1.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. *VWillis*, de febri-  
 bus, cap. 14.

Febris

---

\*\* Hoc est exemplum, ni fallor, primum appellatio-  
 nis *noupwds*, vel nervosæ, febribus quibusvis datæ; quam  
 protinus Angli, non tamen nisi nuper admodum aliarum  
 regionum medici, usurpati sunt.

Febris Senegallensis. Lond. Med. Obs. II, 21.

Typhus carcerum, S. sp. I.

Febris nautica pestilentialis *Huxham* de aere ad ann.

1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita,

*Huxham* de aere ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum, & nosocomiorum. Ill. *Pringle*, Diseases of the army, p. 294. Ill. *Van Swieten*, Maladies des armées. p. 136. Soc. Royale II. Mem. p. 53. Ibid. III. Mem. p. 45. and. 55.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant *Henr. Maii* & *A. Ph. Koph.* Diss. apud *Hallerum*, tom. V.

Febris Hungarica sive castrensis *Juncker.* 74. & plurimum Auctorum. \*

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742. *Skrinici.* Diss. apud *Haller.* tom. V.

Febris petechialis. *Sennert.* L. IV. cap. 13. *River.* prax. L. XVII. sect. III. cap. I. *Hoffm.* II. p. 84. *Juncker.* 73. *Huxham* on fevers, chap. 8. *Ludovig.* Inst. med. clin. No. 146. *Schreiber* von erkenntniss, und cur Krankheiten. p. 126. *Monro*, Diseases of military hospitals, p. 1.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Juncker* 72. *Hoffm.* II. 75. *Eller* de cogn. & cur. morb. Sect. VI.

Tom. II.

D

Fe-

\* Morbum sive febrem Hungaricam ad tertianas remittentes, cum SAUVAGESIO & Ill. PRINGLE, supra retuli; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus sapius sub forma remittentis apparuerit; sed simul constat febrem in castris Hungaricis primo ortam, & per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse (*Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quest. 39.*); & plerumque eandem esse, quam nunc in Nosocomiis quibusvis sæpe exorientem beate novimus: Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.

Febris putrida, *Mach.* p. 305.

Febris catarrhalis putrida 1768. *De Martens* Obs. cap. 1.

Febris putrida biliosa 1769. *De Martens*, cap. 2.

Febris putrida nervosa 1770. *De Martens*, cap. 3.

### Exempla febrium petechialium sunt sequentia.

Febris quam lenticulas, puncticula, aut petiolas vocant,  
*Fracastorius* de morb. contag. L. II. cap. 6.

Febris peticularis Tridenti, ann. 1591. *Roboretus*, de febr. peticul.

Febris petechialis epidemica Coloniae ann. 1672. *Donckers*, Idea febris petechialis.

Febris petechialis epidemica, Posonii 1683. *C.F. Loeu* in Ap. ad A. N. C. Vol. II.

Febris petechialis epidemica Mutinae, 1692. *Ramazzini*. Const. Mutinensis, Oper. pag. 187.

Febris maligna petechizans, ann. 1698. *Hoffm.* II. p. 80.

Febris petechialis Wrastislaviae, ann. 1699. *Helvich*, Ephem. Germ. D. III. A. VII. & VIII. obs. 132. p. 616.

Febris epidemica Lipsiae 1718. *M. Adolph.* A. N. C. III. Ob. 131. p. 296.

Febris endemica & epidemica Corcagiensis, ann. 1708. 1718. & seq. *Rogers*, Essay on epidemic diseases.

Febris continua epidemica Corcagiensis ann. 1719. & seq. *M. o Connel* Observ. de morbis.

Febris petechialis epidemica, Cremonae 1734. *Valcharenghi* Med. ration. Sect. III.

Febris petechizans Petropoli 1735. *Weitbrecht* Diss. apud Haller. tom. V.

Febris petechialis, ann. 1740. 1741. in Hassia; *Ritter.* A. N. C. vol. VII. obs. 4.

Febris petechialis epidemica Vigorniae & aliis Angliae locis. *Wall's Works*, p. 337.

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. *Furstenau.* A. N. C. vol. VII. obs. 5.

Febris petechialis epidemica Silesiae 1741. & seq. *Brandhorst.* Diss. apud Haller. tom. V.

Febris petechialis epidemica Viennae 1757. *Hasenobrl.* Hist. med. cap. 2.

Febris



Febris petechialis epidemica Lipsiæ 1757. *Ludwig. Adversar. tom. I. pars. 1.*

Febris petechialis epidemica variis Germaniæ locis ab ann. 1755. ad 1761. *Strack de morbo cum petechiis.*

Febris epidemica maligna a Coutances 1772. & 1773. *Soc. Royale I. Mem. p. 23.*

Febris petechialis nervosa a Dijon 1760. & 1761. *Mem. par Maret 1775.*

## II. Typhus (*icterodes*) cum flavedine cutis.

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiæ Occidentalis *Warren*, Malignant Fever of Barbadoes. *Hillary's Diseases of Barbadoes.*  
*Linning on the Yellow Fever of South Carolina.*  
*Edinb. Phys. Litter. Essays, Vol. II. Mackittrick*  
de febre flava Indiæ Occidentalis, *Edinb. 1766.*

## Typhi etiam species esse videntur:

Ephamera sudatoria, S. sp. 7.

Ephamera Britannica, *Caius de ephem. Brit.*

Sudor Anglicus, *Sennert. L. IV. cap. 15.*

Hydronofus, *Forest. L. VI. obs. 8.*

## An eodem pertinet,

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Febris sudatoria, *La Svette Gallorum, Meyserey Meth. aisé, &c. Ejusd. Maladies des Armées 250. Boyer*  
*Methode a suivre dans les maladies epidemiques*  
*Tessier, Soc. Royale II. Mem. p. 46.*

De Typho hysterico verminoso, S. sp. 4.

Typho exhaustorum, S. sp. 8.

Typho a manipuera, S. sp. 9.

## Nobis non liquet.

## G. VI. SYNOCHUS\*

Morbus contagiosus. Febris ex synocha & typho

\* Cum plures febres nec inflammatoriæ nec nervosæ ex omni parte sint, neque idcirco vel ad Synocham vel ad Ty.

pho composita, initio synocha, progressu & versus finem typhus.

Synochus, S. G. 81. L. 13.

Lenta L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, Boerb. 730.

**Varietates ex Sauvagesio sunt:**

Synochus sanguinea, S. sp. 1.

Febris depuratoria, ann. 1661. ad 1664. Sydenh. de morb. acut.

Synochus sudatoria, S. sp. 2.

Febris continua epidemica, ann. 1665. ad 1667. Sydenh. ibid.

Synochus soporosa, S. sp. 12.

Febris continua epidemica, ann. 1673. Sydenh. ibid.

Febris continua putrida annor. variorum. VVinthringham Com. Nosologicum.

Synochus ardens, S. sp. 6.

Synochus miliaris, S. sp. 14.

Synocha miliaris, S. sp. 6.

De synocho variolode, S. sp. 3. &

Synocha dysenteriode, S. sp. 4.

**Nobis non satis liquet, & minus adhuc de**

Synocho anniversaria, S. sp. 9.

Synocho spermatica, S. sp. 10.

Synocho tarantata, S. sp. 11.

**Complicata est**

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Et

---

Typhum facile referenda; genus Synochi, cujus typus hinc regionibus frequens conspicitur, hic inserui. Inter Typhum tamen & Synochum limites accuratos ponere non possum; & an revera pro diversis generibus habenda, vel positis diversis, utri eorum Synonyma auctorum referenda sunt, dubito. Quæ vero hic subjunguntur, a SAUVAGESIO species dictæ, ad Synochum satis recte, ut mihi videtur, referri possunt.

Et symptomatica est

Synochus a febre, S. sp. 15.

### HECTICA.

Febris quotidie revertens; accessionibus meridianis & vespertinis; remissione, rarius apyrexia, matutina; plerumque sudoribus nocturnis, & urina sedimentum furfuraceo-lateritium deponente. \*

Hectica, S. G. 83. L. 24. V. 80. Sag. 684.  
Med. Trans. H. 1.

Ex Sauvagesio species sunt,

Hectica chlorotica, S. sp. 3.

Hectica syphilitica, S. sp. 4.

Hectica scrophulosa, S. sp. 5.

Hectica a calculis, S. sp. 6.

Hectica hydropum, S. sp. 7.

Hectica verminosa, S. sp. 9.

Hectica cachectarum, S. sp. 10.

Hectica fluxuum, S. sp. 11.

Hectica infantilis, S. sp. 1. Charactere caret, & nobis vel rachitica, vel scrophulosa, vel verminosa videtur.

Hectica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo haberi potest.

De hectica lymphatica, Baglivi S. sp. 12. & Hectica nervea, Cl. Lorry, S. sp. 13.

D 3

No-

\* Cum febrium in numerum hecticam receperint Nosologi omnes, eam etiam cum caractere hic apponendam duxi. Ejusmodi autem febrem, cum nunquam nisi symptomaticam observaverim, in numerum idiopathicarum, quas solas enumerare licet, admittere nolui. In plerisque exemplis, hecticam revera symptomaticam esse, ex SAUVAGESII speciebus, quas vocat, hic recensitis, satis manifestum fiet. Vide ipsius SAUVAGESII Scholium. Tom. I. pag. 319.

Nobis non liquet.

## O. II. PHLEGMASIE.

Febris synocha; phlogosis; vel dolor topicus, simul læsa partis internæ functione; sanguis missus, & jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

Plegmasiæ membranosæ & parenchymatosæ, S. Cl. III.

O. I. II. *Sag.* 605. \*

Morbi febriles phlogistici, L. Cl. III.

Febres continuæ compositæ inflammatoriæ, V.

Morbi acuti febriles, *Boerb.* 770.

Febres inflammatoriæ, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

## G. VII. PHLOGOSIS. \*\*

Pyrexia, partis externæ rubor, calor, & tensio dolens.

Species sunt,

I. Phlo-

\* Hæc phlegmasiarum in membranosas & parenchymatosas divisio prorsus inepta est: primo enim, quod de statu partium internarum statuit, de quo in Nosologia statuere non licet; dein, quod partes membranosæ & parenchymatosæ non satis certo distinguuntur; & hinc Meritritis, quam inter membranosas recenset SAUVAGESIUS, a LINNÆO & SAGARO inter parenchymatosas collocatur; denique, quod phlegmasiæ quædam, ut hepatitis, vel membranosæ vel parenchymatosæ esse possunt.

Nec magis idonea est ordinis phlegmasiarum musculosarum apud LINNÆUM & SAGARUM institutio, in qua neuter quidem satis accuratus est. Male enim phlegmone a LINNÆO musculosa dicitur, nec bene Cynanche plerumque membranosa, rarius musculosa, a SAGARO ad musculosas in universum refertur.

\*\* Pro nomine generis cujus species est Erythema, minus recte in priore editione usurpatum fuit phlegmone. Novum nomen necessarium nobis videbatur, & nihil aptius quam Phlogosis suppetebat.



- I. Phlogosis (*Phlegmone*) rubore vivido; tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, sæpe in apostema abeunte; dolore sæpe pulsatili.

Phlegmone *Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351. *Sag.* 299. *Macb.* p. 418.

Inflammatio, L. 231. *Boerb.* 370. *Juck.* 20.

1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352. *Sag.* 23. *Macb.* p. 422.

Therminthus, V. 381.

Papula, L. 275. S. p. 6.

Varus, V. 436. L. 269. S. p. 7.

Bacchia, L. 270.

Gutta rosea, S. G. 4.

Gutta rosacea, V. 437.

2. Variat sede. \*

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.

Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148.

Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.

Parulis. V. 362.

Mastodynia. S. G. 210. V. 153.

Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.

Arthrocace, S. G. 78. L. 256.

Pædarthrocace, V. 419.

Spina ventola, *Boerb.* 526.

Phimosis, S. G. 20. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. G. 214.

Clunisia, V. 167.

- II. Phlogosis (*Erythema*) colore rubicundo, pressione evanescente; ambitu inæquali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulæ

---

\* An sequentes pro totidem speciebus recenseri possint?,  
judicent peritiores.

squmulas, in phlyctænas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11. *Sag.* 16.

Erysipelas *Auctorum*, V. 343. *Macb.* 421.

Hieropyr, V. 344.

## 2. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353. *Sag.* 24. Carbo & carbunculus *Auctorum*. *Macb.* p. 423.

Erythema gangrænosum, S. sp. 7.

## 2. Variat causa remota.

Erythema a frigore.

Erythema pernio, S. sp. 4.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema ambustio, S. sp. 2.

Erysipelas ambustio, S. sp. 4.

Combustura, L. 245.

Combustio, *Boerb.* 476.

Encausis, V. 347.

Erythema ab acri alieno applicato;

Erysipelas Chinense, S. sp. 7.

Erythema ab acri inquilino,

Erythema intertrigo, S. sp. 5.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema a compressione,

Erythema paratrima, S. sp. 6.

Erythema a punctura, S. sp. 9.

Erysipelas a vespis, S. sp. 19.

Psyracia a vespis, S. sp. 2.

## 3. Variat complicata.

Erythema cum phlegmone,

Erysipelas phlegmonodes *Auctorum*.

Erythema cum œdemate,

Erysipelas symptomaticum, S. sp. 6.

Phlogosis sequelæ sunt.

## A P O S T E M A.

Post phlogosin, remittentibus dolore & pulsatio-

tionē, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

Apostema, S. G. 39. *Sag.* 55.

Abcessus, L. 132. V. 345. *Boerb.* 387. 402. *Mach.* p. 414.

Pustula, L. 274.

## GANGRÆNA.

Post phlogosin, pars livens, mollis, parum sensibilis, sæpe cum vesiculis ichorosis.

Gangræna, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Sag.* 203. *Boerb.* 338. 419. *Mach.* p. 415.

## SPHACELUS.

Post gangrænam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, & cum foetore carnis putridæ; vitio celeriter ferpente.

Sphacelus, L. 234. V. 328. *Boerb.* 419. 457.

## G. VIII. OPTHALMIA.

Rubor & dolor oculi; lucis intolerantia; pleurumque cum lachrymatione.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Sag.* 231. *Junc.* 24. *Mach.* p. 423.

Chemosis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammatiō oculorum. *Hoffm.* II. 165.

Ophthalmiæ species & varietates sunt.

### I. Idiopathicæ.

1. Ophthalmia (*membranarum*) in tunica adnata, & ei subjacentibus membranis, five tunicis oculi.

A. Variat gradu phlogosis externæ.

Oph-

- Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.
- Ophthalmia humida, S. sp. 8.
- Ophthalmia chemosis, S. sp. 12.
- Ophthalmia erysipelatosa, S. sp. 7.
- Ophthalmia pustulosa, S. sp. 6.
- Ophthalmia phlyctænodes, S. sp. 21.

## B. Variat affectis tunicis internis.

2. Ophthalmia (*Tarfi*) cum tumore, erosione,  
& exudatione glutinosa tarfi palpebrarum.

- Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.
- Ophthalmia sicca, S. sp. 5.

## II. Symptomaticæ.

2. A morbo ipsius oculi.

- Ophthalmia angularis, S. sp. 14.
- Ophthalmia tuberculosa, S. sp. 3.
- Ophthalmia trichialis, S. sp. 2.
- Ophthalmia cancroſa, S. sp. 15.
- Ophthalmia a tyoechia, S. sp. 16.
- Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.
- Ophthalmia ab eleomate, S. sp. 18.
- Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.
- Ophthalmia a corneæ fistula, S. sp. 20.
- Ophthalmia uveæ, S. sp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

- Ophthalmia metastatica, S. sp. 24.
- Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.
- Ophthalmia syphilitica, S. sp. 11.
- Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

## G. IX. P H R E N I T I S.

Pyrexia vehemens; dolor capitis; rubor faciei  
& oculorum; lucis & soni intolerantia; per-  
vigilium; delirium ferox, vel typhomania.

Phrenitis, S. C. 101. L. 25. Sag. G. 301. Boerh.  
771. Hoffm. II. 131. Junck. 63. Macb. p. 432.  
Phre-



Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. G. 109. Sag. G. 310. \*

Sphacelismus, L. 32.

Sirialis, V. 34.

Phrenitidis idiopathicae speciem unicam hic ponere licet, & cujus synonyma sequentia esse putamus.

Phrenitis vera, S. sp. 1. Boerb. 771.

Phrenitis idiopathica, Junck. 63.

Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.

Cephalitis spontanea, S. sp. 3.

Cephalitis sirialis, S. sp. 4.

Sirialis, V. 34.

Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

## II. Phrenitides Symptomaticæ sunt,

Phrenitis synochi pleuriticae, S. sp. 2.

Phrenitis synochi sanguineae, S. sp. 4.

Phrenitis calentura, S. sp. 11.

Phrenitis Indica, S. sp. 12.

Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.

Cephalitis epidemica, ann. 1510. S. sp. 6.

Cephalitis verminosa, S. sp. 7.

Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.

Phrenitis variolosa, S. sp. 5.

Phrenitis morbillosa, S. sp. 6.

Phre-

---

\* Cum symptomata nulla dentur, quæ semper phlegmasiam cerebri a phlegmasia membranarum ejus, sive meningum, certo distinguere possint, neque sectiones cadaverum distinctiones a SAUVAGESIO, LINNÆO, & SAGARRO adhibitas confirmant, *Cephalitidem*, S. G. 109. Sag. G. 310. & *Sphacelismum* L. 32. pro generibus a *phrenitide* diversis admittere nolui, & ea hic ideo, uti synonyma, sub titulo Phrenitidis posui.

Recte monet VOGELIUS signa phrenitidis, vel ut vocat phrenismi, hoc est inflammationis cerebri aut membranarum ejus, admodum ambigua esse.

Phrenitis a plica, S. sp. 8.

Phrenitis aphrodisiaca, S. sp. 9.

Phrenitis a tarantismo, S. sp. 14.

Phrenitis hydrophobica, S. sp. 15.

Phrenitis a dolore, S. sp. 13.

Cephalitis traumatica, S. sp. 2.

G. X.

CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor & dolor faucium; deglutitio & spiratio difficiles, cum angustia in faucibus sensu.

Cynanche, S. G. 110. L. 33. Sag. G. 300.

Angina, V. 49. Hoffm. II. 125. Junck. 30.

Angina inflammatoria, Boerb. 798.

Species sunt;

I. Cynanche ( *tonsillaris* ) membranam faucium mucosam, & præcipue tonsillas, tumore & rubore afficiens, cum febre synocha.

Cynanche tonsillaris, S. sp. 1.

Anginae inflammatoriæ, S. sp. 5. Boerb. 805.

II. Cynanche ( *maligna* ) tonsillas & membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, & crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentibus, & ulcera tegentibus; cum febre typhode, & exanthematis.

Cynanche maligna, S. sp. 3.

Cynanche ulcerosa, S. Var. a Journ. de Med. 1758.

Cynanche gangrænosa, S. Var. b. Journ. de Med. 1756.

Ulcera faucium & gutturis anginosa & lethalia.

Hispanis Garotillo, Lud. Mercat. consult. 24.

Angina ulcerosa, Cl. Fothergill, Account of the ulcerous sore throat Edit. 1751. Huxham on the malignant ulcerous sore throat, from. 1751. to.

1753.

Febris epidemica cum angina, ulcusculosa, Douglas Pra-

Practical History, Boston 1736. Lond. Med. Obs.  
I. 10.

Angina epidemica, *Russel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangrænoſa, *Withering's* Diff. Inaug. Edinb.  
1766.

Angina ſuffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York,  
1771.

Angina maligna, *Johnstone* on the malignant angina,  
&c. Worcester. 1779. Wall's Works, p. 58.

III. Cynanche (*trachealis*) respiratione difficili, inspiratione ſtrepente, voce rauca, tuſſi clangola, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, & febre ſynocha.

Cynanche trachealis, S. ſp. 5.

Cynanche laryngea *Auctorum*, *Eller.* de cogn. & cur.  
rand. morb. ſect. 6.

Anginæ inflammatoriæ, ſp. 1. *Boerh.* 801.

Angina latens & difficilis, *Dodon.* obſ. 18.

Angina interna, *Tulp.* L. 1. obſ. 51.

Angina pernicioſa, *Greg. Horſt.* Obſerv. L. III.  
obſ. 1.

N. An hæc Sauvageſii ſynonyma & ſequentia ad eundem morbum pertineant, videant experti; ſequentia autem ad morbum characteris dati manifeſto pertinere videntur.

Suffocatio ſtridula, *Scotis* the CROUP. Cl. *Home* on the Croup.

Aſthma infantum, *Millar* on the aſthma and chin-cough.

Aſthma infantum ſpſmodicum, *Ruſh*, Diſſertation, London 1770.

Cynanche ſtridula, *Cravvford*, Diſſ. Inaug. Edinb.  
1771.

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy* apud *Rutty's* hiſtory of the weather.

Mor-

Morbus strangulatorius, *Starr*, Phil. Trans. Num. 495. \*

Morbus truculentus infantum, *Francof.* ad Viadrum & in vicinia grassans, ann. 1758. C. a Bergen. A. nova. N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Russel*, Oecon. nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadenfis, ann. 1758. *Hilary's* Barbadoes, p. 134.

Angina polyposa, five membranacea *Michaelis*, Argentorati 1778., & Auctores ab ingenioso & erudito *Michaelis* allegati.

Morbus anginae polyposae analogus, Soc. Royale H. Hist. p. 206.

IV. Cynanche (*pharyngea*) cum rubore in imis praesertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentissima; respiratione satis comoda, & febre synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller* de cogn. & cur. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 4., *Baerb.* 804.

V. Cynanche (*parotidæa*) cum tumore externo parotidum & maxillarum glandularum magno; respiratione & deglutitione parum laesis; febre synocha plerumque leni.

Cynanche parotidæa, S. sp. 14. Gallis OREILLONS & OURLES, *Tissot* Avis au peuple, Num. 116. *Encyclopedie*, au mot OREILLONS.

Angina externa, ANGLIS the MUMPS; *Russel*. Oecon. natur. p. 214. SCOTIS, the BRANKS.

Catarrhus Bellinulanus, S. sp. 4.

Osservazioni di *Girol. Gaspari*, Venez. 1731.

Of-

---

\* An hic morbus ad cynanchem malignam, an ad trachealem pertineat, mihi non certo constat; & saepius de eorundem morborum apud plures auctores descriptionibus itidem incertus sum.



Offervazioni di Targ. Tozzetti, Raccolta prima  
p. 176.

Cynanche purpureo-parotidæa, S. sp. 15. vel ad  
malignam, S. sp. 3. vel ad Searlatinam per-  
tinere videtur.

Cynanchæ symptomaticæ sunt.

a. A causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Febris anginosa, *Huxham* de aere.

Cynanche prunella, S. sp. 12.

Cynanche exanthematica, S. sp. 4.

Cynanche arthritica, S. sp. 10.

Cynanche hepatica, S. sp. 8.

Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

b. A causis externis.

Gynanche a deglutitis, S. sp. 9.

Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

Cynanche thymica, S. sp. 7. raro inflamma-  
toria est, & vix hujus loci.

G. XI. PNEUMONIA.\*

Pyrexia; dolor in quadam thoracis parte; re-  
spiratio difficilis; tussis.

Febris

\* Ab omni ævo in hunc fere diem scriptores medi-  
ci, & eos secuti Nosologi omnes, phlegmasiarum pectoris  
interni duo esse genera, peripneumoniam scilicet & pleu-  
ritidem, statuerunt. Recentiores autem ex sectione cada-  
verum didicerunt, veteres de sede, ideoque de differen-  
tia horum morborum sæpe falso statuisse, & quem in pleu-  
ra costali sedem habere veteres putabant, sapius in pleu-  
ra pulmonem investiente situm fuisse invenerunt anatomici  
recentiores. Novimus porro, quod, si quidem morbi il-  
li diversam aliquando sedem habuerint, id tamen per sym-  
ptomata vix certo cognosci posse; &, utcumque sit, mor-  
bos illos quatenus, quovis modo distinctos, revera maxi-  
me esse affines, plerumque simul conjunctos, & eosdem  
distin-

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136. *Macb.* pag. 435.

Species sunt,

I. Pneumonia (*peripneumonia*) pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso; respiratione perpetuo difficili, sæpe non nisi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumide colore eurpureo; tussi plerumque humida, sæpe cruenta.

Peripneumonia, *S. G.* 112. *L.* 34. *V.* 51. *Sag. G.* 311. *Boerb.* 820. *Juncker*, 67.

1. Peripneumonix idiopathix simplices.

Peripneumonia pura sive vera *Austorum*, *S. sp.* 1.

Peripneumonia gastrica, *S. sp.* 11. *Morgagn.* de caus.

& sed *Epist.* XX. art. 30. 51. \*

Variat gradu.

Peripneumonia catarrhalis, *S. sp.* 6.

Peri-

distinxisse ad usus medicinæ parum omnino contulisse. Hisce igitur perpenſis, phlegmasias pectoris interni non nisi genus unicum constituere, cum **HOFMANNO** expertissimo putamus: quamobrem hujusmodi genus hic sub nomine Pneumonix posuimus: Symptomata, quæ pro characteristicis adhibuimus, cum quæ in omni phlegmasia pectoris interni semper adsint, & in qualibet præcipua sint, ea recte characterem genericum constituere videntur.

An species diversæ vere statuendæ sint, anceps hæreo. Sed, opinionibus & consuetudini medicorum aliquid concedere volens, peripneumonix & pleuritidis, quatenus vel ex opinione medicorum, vel ex propria observatione, eas distinguere liceat, characteres specificas dedi. Interim tamen observari velim, inter illos morbos, utcumque aliquando distinctos, limites accuratos plerumque non ponendos esse.

\* Ad peripneumoniam, an ad pleuritidem, potius pertineat hæc varietas, mihi non certo constat.

Peripneumonia notha \* Sydenh. sect. 6. cap. 4. Boerh. §67. Morgagni de caus. & sed. Epist. XXI.  
11. — 15.

## 2. Peripneumoniæ idiopathicæ complicatæ febre. \*\*

Peripneumonia putrida, S. sp. 1. †

Peripneumonia ardens, S. sp. 3.

Peripneumonia maligna, S. sp. 4.

Peripneumonia typhodes, S. sp. 5.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Tom. II.

E

3. Peri-

\* Peripneumoniam *notham* a vera gradu tantum differre opinor; ideoque uti varietas hic apposui. In eo quidem differre puto, quod in peripneumonia *notha* inflammatio sit lenior, & affluxus humorum in pulmones copiosior, quam in *vera*. Cum autem in *notha* symptomata pyrexia, doloris, dyspnœæ, & tussis, vario gradu & varia ratione conjuncta, adesse possint, minime mirandum si hujus morbi apud diversos auctores descriptiones parum uniformes sint, & nec ne morbus sub titulo peripneumoniarum *notharum* a diversis auctoribus descriptus idem revera sit, dubia quædam moverit doctissimus MORGAGNI. Peripneumoniam tamen omnibus de hac re dictis, & cum observationibus pluribus apud ipsos ægros factis collatis, nihil dubito quin morbus a SYDENHAMO & BOERHAAVIO, sub titulo *peripneumoniarum notharum* descriptus, unus idemque sit, nec ab eo morbum a VALSALVA in FRANCISCO CORALIO, vel morbum in celebri ANTONIO VALISNERIO, ab ipso MORGAGNI observatum re ipsa diversum fuisse puto. Vide First Lines of the Practice of Physic, edit. 1784. §. CCCLXXVI.

\*\* Cum morbi diversi simul complicati sint, sæpe quis illorum pro morbo primario habendus sit dubitari potest; nec in hac re me ubique recte judicatum iri spondeo. In quibusdam mei ipsius judicio usus sum: in plerisque vero SAUVAGESIUM secutus sum. Sufficere plerumque ratus ob oculos studiosorum complicationes istas quomodoque ponere.

† SAUVAGESIUM, ut soleo, secutus, hanc & tres sequentes species quasi diversas recensui, cum tamen pro una eademque habere vellem.

## 3. Peripneumoniæ symptomaticæ.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.

Peripneumonia phthisicorum, S. sp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

II. Pneumonia (*pleuritis*) pullu duro; dolore, plerumque lateris, pungente, sub inspiratione præsertim aucto; decubitu in latus molestus; tussi dolentissima, initio sicca, postea humida, sæpe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. *Sag.* G. 303.

*Boerb.* 875. *Junk.* 67.

Paraphrenesis, S. G. 102. L. 26. \*

Paraphrenitis, V. 55. *Boerb.* 907.

Diaphragmitis; *Sag.* G. 314.

I. Pleuritides idiopathicæ simplices:

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 875. *Verna* princeps morb. acut. pleuritis. L. 1. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgagn.* de sed. & caus. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45. *Wendt.* de pleuritide, apud *Sandifort.* Thes. II.

Pleur-

---

\* In morbo qui vulgo *paraphrenesis* vel *paraphrenitis*, & rectius a SAGARO *diaphragmitis* appellatur, pleuræ super diaphragma extensæ inflammationem adesse, & in ea morbum consistere agnoscunt medici omnes: non recte igitur uti genus a pneumonia diversum recensuerunt Nosologi.

Nec quidem pro diversa a pleuritide specie recenseri potest; cum plerumque nulla alia præter illa pleuritidis symptomata ostendit. Quæ a plurimis huic morbo tributa sunt, risus nempe sardonius, & delirium phreniticum, certe non semper adsunt. Primum, quod nunquam vidi, certe rarissimum est; & posterius, alias etiam pneumoniæ species sæpe comitatur, nec tantum a parte pleuræ inflammata, quantum a gradu pyrexia, vel diathesis phlogistica, pendere videtur.



Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian*. della parapleur.  
III. 28. &c.

Pleuripneumonia, plero-peripneumonia, peripneumo-  
pleuritis *Auctorum*. *Baronius* de pleuripneumonia.

III. *Halleri* opuscul. patholog. ob. 13. *Morgagn*. Ide  
fed. & caus. Epist. XX. & XXI. passim. *Cleghorn*  
Minorca, p. 247. *Triller* de pleuritide, app. 1. 2.  
3. cap. l. g. *Huxham* Dis. on pleurifies, &c. chap.  
I. III. *Pringle* Dis. of the army, p. 147.

Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianch*. Hist. hep.  
vol. 1. p. 234.

Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morgagn*. de caus.  
& fed. XX. 34.

Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. *Verna*, P. III. cap. 8.

Pleuritis mediastini, S. sp. 4. *Pl. Sal. Div.* de affect.  
part. cap. 6. *Friend*, Hist. Med. de Avenzoare,  
Mediastina, V. 52.

Pleuritis pericardii, S. sp. 5. *Verna*, P. III. cap. 9.

Parapleuritis *Zeviani* della parapleuritide.

Pleurodyne, parapleuritis, S. sp. 19.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen*,  
Rat. med. l. 7. III. pag. 31.

Paraphrenesis pleuritica, S. sp. 2.

Paraphrenesis hepatica, S. sp. 3.

De inflammatione mediastini, pericardii, &  
diaphragmatis Vide *Morgagn*. de caus. &  
fed. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16.  
*Van Swieten* ad *Boer*. 913.

## II. Pleuritides complicatæ.

### I. Febre.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatoza, S. sp. 11.

Pleuritis biliosa, *Bianch*. Hist. hep. vol. I. pag.  
236.

Pleuritis putrida, S. sp. 9.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Pleuritis pestilens, S. sp. 16.

Pleuritis miliaris, S. sp. 20.

## 2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. sp. 10.

Pleuritis lymphatica, *Bianch. Hist. hep. I. pag. 233.*

## III. Pleuritides symptomaticæ.

Pleuritis traumatica, S. sp. 6.

Pleuritis verminosa, S. sp. 8. *Verna pleur. p. I. cap.*

1. P. III. cap. 11. *Morgagn. de sed. & caus. XXI. 43. 44.*

Pleuritis stomachalis, *Bianch. Hist. hep. I. p. 232.*

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Pleuritis lactea, S. sp. 17.

Pleuritis Polonica, S. sp. 18.

## IV. Pleuritides falsæ.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12. *Panarol. Pentac. I. obs.*

37.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Pneumoniæ sequelæ sunt.

## V O M I C A.

Post pneumoniam, resolutione quadam non terminatam, dyspnoea & tussis persistentes, cum decubitu in latus sanum difficili, & febre hectica.

Vomica *Boerb. 835. Junck. 35. \**

Pleurodyne vomica, S. sp. 21.

## E M P Y E M A.

Post pneumoniam suppuratione terminatam, sæpe post vomicam remissio doloris, dum persistant dyspnoea, tussis, decubitus difficilis, & febris

---

\* Vomicam vocamus quam vomicam, clausam appellant medici, & inde character noster. Characteres autem vomicæ apud LINNÆUM & VOGELIUM vomicam apertam tantum respiciunt; ideoque ad illos auctores hic non referimus.

bris hæctica, sæpe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, & signis hydrothoracis.

Varietates ex SAUVAGESIO, licet non semper distinguendas, hic subjungimus.

Empyema a peripneumonia, S. sp. 1.

Empyema a vomica, S. sp. 2.

Empyema pleuræ, S. sp. 3.

Empyema mediastini, S. sp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. sp. 5.

Empyema intercostale, S. sp. 6.

### G. XIII. C A R D I T I S. \*

Pyrexia; dolor in regione cordis, anxietas spiritus difficilis; tussis; pulsus inæqualis; palpitatio; syncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

#### I. Idiopathica.

Carditis spontanea, S. sp. 1. *Senac. Traité de cœur*

L. IV. chap. 7. *Meckel, Mem. de Berlin, 1756.*

Erylipelas pulmonis, *Lomm. Observ. Lib. II.*

#### II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. sp. 2. *Senac. ibid. chap. 6.*

### G. XIV. P E R I T O N I T I S.

Pyrexia: dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

E 3

Si

---

\* Recte omnino dixit VOGELIUS *Carditidis symptomata fere eadem esse ut in peripneumonia, sed graviora*, & ita etiam sensisse videtur LINNÆUS, cum apud illum neque *Carditis*, neque *Pericarditis*, inter morbos phlogisticos recensetur. Certe novimus, pericardium sæpe inflammatum fuisse sine aliis præter peripneumoniæ signis.

Si signa darentur, quibus dignosci queant sequentes, pro speciebus peritonitidis recenseri possent:

I. Peritonitis (*propria*) in peritonæo strictius dicto, sive in peritonæo, abdomen intus contingente.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud.* Hist. anat. med. L. I. obs. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obs. 341. *Morgagn.* de sed. LVII. 20.

II. Peritonitis (*omentalis*) in peritonæo per omentum extenso.

Epiplöitis, S. G. 106. *Sag.* G. 308. \*

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerh.* 958. & III. *Van Swieten* Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132. *Hulme* on the puerperal fever.

III. Peritonitis (*mesenterica*) in peritonæo per mesenterium extenso.

Mesenteritis, V. 60.

Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

G. XV.

G A S T R I T I S.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor & dolor, ingestis quibuslibet auctus; vomendi cupiditas, & ingesta protinus rejecta; singultus.

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56. *Sag.* G. 306.

Ventriculi inflammatio, *Boerh.* 951.

Febris

---

\* Tum epiplöitis, tum Mesenteritis, ut Peritonitidis species hic recensetur, non quam quod ejusdem continuæ membranæ sint affectiones, quam quod nulla fere signa dari possunt, quibus a peritonitide, strictius dicta, dignosci queant.



Febris stomachica inflammatoria, *Hoffm.* H. 120.

## I. Idiopathica.

### 1. A causis internis.

#### A. Gastritis (*phlegmonodea*) dolore acuto, pyrexia vehementi. \*

Gastritis legitima, S. sp. 1. *Eller*, de cogn. & cur. morb. Sect. XI. *Haller*, obs. 14. hist. 3. *Lieut.* Hist. anat. med. L. 1. 74.

Gastritis erysipelatoſa, S. sp. 4. †

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. *Tralles* de opio, sect. II. p. 231. (*phlegmonodea*; *erysipela*)

### 2. A causis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

#### B. Gastritis (*erythematica*) dolore, & pyrexia lenioribus; rubore erysipelatoſo in faucibus apparente.

## II. Symptomatica.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

Gastritis hernioſa, S. sp. 7.

De gastritide sternocostali, S. sp. 6. non liquet.

## G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens, vomitus; alvus pertinaciter adſtriſta.

E 4

Ente-

\* Tum gastritis; tum enteritis duarum eſſe ſpecierum, quarum una phlegmonodea, altera eryſipelatoſa dici poteſt, mihi ex pluribus obſervationibus ſatis certo conſtat; & ejuſmodi ſpecies itaque hic reſcenſui, etſi fatendum ſit, gastritidis eryſipelatoſæ, & magis adhuc enteritidis eryſipelatoſæ, ſigna ſæpe obſcura & incerta eſſe, De his vero monere volui, ut diligentius inquirent poſteri.

† Quam hic gaſtriitdem eryſipelatoſam dixit SAUVAGESIUS, omnino phlegmonodeam eſſe mihi videtur.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57. *Sag. G.* 307.

Intestinatorum inflammatio, *Boerb.* 959.

Febris intestinatorum inflammatoria ex mesenterio  
*Hoffm.* II. 170.

### I. Idiopathica.

Species sunt,

1. Enteritis (*pblegmonodea*) dolore acuto, pyrexia vehementi, vomitu & alvo astricta.

Enteritis iliaca, S. sp. 1.

Enteritis colica, S. sp. 2. *Boerb.* 963.

2. Enteritis (*erythematica*) dolore & pyrexia lenioribus, sine vomitu, & cum diarrhoea.

Species symptomaticæ.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.

### G. XVII.

### H E P A T I T I S.

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio & dolor, sæpe pungens pleuritici instar, sæpius obtusus; dolor ad claviculam & summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnœa; tussis sicca; vomitus; singultus. \*

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Sag. G.* 312.  
*Boerb.* 914. *Hoffm.* II. 14. *Junck.* 66. *Mach.* pag.

446.

Va-

---

\* Inter symptomata hepatiditis, colorem faciei flavescentem, posuit tum SAUVAGESIUS, tum SAGARUS, & hic etiam addit, urinas icteritias, biliosas, & serum sanguinis miss & crusta subflava; sed hæc symptomata bilis regurgitantis vel resorptæ rectius a LINNEO & VOGELIO omissa fuisse censeo; nam ejusmodi symptomata non tantum non perpetua, sed etiam rarissima sunt.

Variat.

I. Acuta signis in charactere dictis dignoscenda.

II. Chronica. Hæc sæpe nulla quibus dignoscatur signa præbet; aliquando tamen eandem adeste suspicari potest, ex hepatitidis causis quibusdam prægressis, ex sensu quodam plenitudinis & gravitatis in hypochondrio dextro, ex doloribus plus minusve pungentibus in eadem parte subinde perceptis, ex dolore quodam a presso hypochondrio dextro vel a decubitu in latus sinistrum sentito, & denique ex pyrexia leviori cum dictis signis subinde infestante.

*Sauvagesii* species sunt,

Hepatitis erysipelatoſa, S. sp. 1. \*

Hepatitis pleuritica, S. sp. 2. *Bianc.* Hist. hep. tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12.

Hepatitis cystica, S. sp. 4. †

He-

\* De erythemate vel eryſipelate, quod vocant, vicerum, minus recte ſenſiſſe medicos cenſeo; nam, me ſaltem iudice, erythema non niſi ſuperficies illas internas quas tegit epithelion & tunica villoſa, epidermidi externæ continua & analoga, afficere poteſt. Nullum igitur eryſipelas pulmonis, de quo ſcripſit LOMMIUS, Obſ. lib. 2. agnoſco; nec hepatitidem quandam a SAUVAGESIO hic eryſipelatoſam recte dictameſſe puto, hepatitidem quidem ex AMATO hic deſcriptam revera phlegmonodeam fuiſſe credo.

† Quin ex contuſione vel aliis cauſis oriri poſſit inflammatio cyſtidis felleæ, vel ductus choledochi, nullus dubito; ſed quibus ſignis cognosci queat, niſi in uno ca-

Hepatitis obscura, S. sp. 5.

**Pro specie male recensetur morbus secundarius.**

Hepatitis suppurans, S. sp. 6. *Cheston's Pathol. Inq.*  
Chap. III. Sect. 2. & app. Case 12.

Hepatalgia apoplematosa, S. sp. 7.

G. XVIII. S P L E N I T I S.

**Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor,  
tumor, & dolor pressu auctus; absque signis  
nephritidis.**

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junc.* 67. *Sag.*

G. 313. *Macb.* p. 448.

Lienis inflammatio, *Boerb.* 958. & Ill. *Van Swieten.* Comm.

**Una tantum species recensetur.**

Splenitis phlegmonodea, S. sp. 1. *Forest.* L. XX. Obs.  
5. 6. *De Haen* apud *Van Swieten.* p. 958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

G. XIX. N E P H R I T I S.

**Pyrexia; dolor in regione renis; sæpe ureteris  
iter sequens; mictio frequens urinæ, vel te-  
nuis decoloris, vel ruberrimæ; vomitus,  
cruris stupor; testiculi ejusdem lateris re-  
tractio aut dolor.**

Nephritis, S. G. 115. L. 37. V. 65. *Sag.* G. 314.

**Species.**

I. Idio-

---

fi, non novi. In ictero scilicet, cum dolore in regione  
epigastrica acuto, a calculo, ut videtur, in ductu cho-  
ledocho hærente, inflammationem ductus cystici sæpe or-  
tam fuisse, omnino censendum, & ne oriatur semper ca-  
vendum.



I. Idiopathica, Spontanea.

Nephritis vera, S. sp. 1.

II. Symptomaticæ.

Nephritis calculosa, S. sp. 2.

Nephralgia calculosa, S. sp. 1.

Nephralgia arenosa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7. *Cheston's Inq. Chap.*

II.

Nephralgia arthritica, S. sp. 3.

G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogastrii tumor & dolor; mictio frequens dolorifica, vel ischuria; tenesmus.

Cystitis, S. G. 108. L. 31. V. 66. *Sag. G. 309.*

Inflammatio vesicæ, *Hoffm. II. 157.*

Species sunt,

I. A causis internis.

Cystitis spontanea, S. sp. 1.

II. A causis externis.

Cystitis a cantharidibus, S. sp. 2.

Cystitis traumatica, S. sp. 3.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor, & dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 63.

Metritis, S. G. 107. *Sag. G. 315.*

Inflammatio & febris uterina, *Hoffm. II. 156.*

Species sunt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1.

Metritis typhodes, S. sp. 2.

Metritis lactea, S. sp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa, & plerumque evidente causa;

fa; pyrexia; dolor circa articulos, musculorum tractum sequens, genua & reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos infestans, calore externo auctus.

Rheumatismus, S. G. 185. L. 62. V. 138. Boerb. 1490. Junck. 19.

Dolores rheumatici & arthritici, Hoffm. II. 317.

Moyitis, Sag. G. 501.

Lumbago, S. G. 212. V. 138. Sag. 169.

Ischias, S. G. 213. V. 138. Sag. 170.

Pleurodyne S. G. 148. V. 138. Sag. 254. Mach. pag. 511.

### Species idiopathica,

Rheumatismus acutus, S. sp. 1.

Rheumatismus vulgaris, S. sp. 2.

### Variat sede.

#### A. In musculis lumborum,

Lumbago rheumatica, S. G. 212. sp. 1.

Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.

#### B. In musculis coxendicis.

Ischias rheumaticum, S. G. 213. sp. 10.

#### C. In musculis thoracis.

Pleurodyne rheumatica, S. G. 148. sp. 3.

Pleuritis spuria, Boerb. 878.

### Species symptomaticæ.

Lumbago plethorica, S. sp. 3.

Ischias sanguineum, S. sp. 2.

Pleurodyne plethorica, S. sp. 1.

Rheumatismus hystericus, S. sp. 7.

Ischias hystericum, S. sp. 3.

Pleurodyne hystERICA, S. sp. 6.

Rheumatismus saltatorius, S. sp. 8.

Pleurodyne flatulenta, S. sp. 4.

Pleurodyne a spasmate, S. sp. 9.

Rheu-

Rheumatismus scorbuticus, S. sp. 4.

Lumbago scorbutica, S. sp. 5.

Pleurodyne scorbutica, S. sp. 11.

Ischias syphiliticum, S. sp. 7.

Pleurodyne venerea, S. sp. 5.

Lumbago lymphatica, S. sp. 13.

*a mesenterii glandulis induratis,*

*a pancreate tumido, purulento, scirrhuso, putri,*

*ab induratis pyloro, vena cava, pancreate,*

*a rene scirrhuso, putrefacto,*

*ab abscessu circa vena cavae bifurcationem,*

*a vermibus intra renes.*

Lumbago a saburra, S. sp. 7.

Pleurodyne a cacochylia, S. sp. 7.

Rheumatismus saltatorius verminosus, S. sp. 8.

Ischias verminolum, S. sp. 8.

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Rheumatismus metallicus, S. sp. 10.

Lumbago a hydrothorace, S. sp. 14.

Lumbago pseudoischuria, S. sp. 16.

Lumbago ex aneurysmate, S. sp. 11.

Pleurodyne ex aneurysmate, S. sp. 10.

Pleurodyne a rupto oesophago, S. sp. 20.

Pleurodyne rachitica, S. sp. 13.

Ischias a sparganosi, S. sp. 5.

Pleurodyne catarrhalis, S. sp. 14.

Pleurodyne pthifica, S. sp. 8.

Rheumatismus necroseos, S. sp. 14.

Rheumatismus convulsivus, S. sp. 15.

Ischias gravidarum, S. sp. 4.

Lumbago partus, S. sp. 7.

Lumbago a nisu, S. sp. 10.

Ischias a subluxatione, S. sp. 9.

Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11.

Lumbago a fatyriasi, S. sp. 15.

Rheumatismus febricosus, S. sp. 9.

Lumbago febrilis, S. sp. 4.

Pleurodyne febricosa, S. sp. 15.

Rheu-

Rheumatismus miliaris, S. sp. 12.

Lumbago miliaris, S. sp. 9.

Pleurodyne miliaris, S. sp. 16.

Rheumatismi sequela est,

### ARTHRODYNIA.\*

Post rheumatismum, nifum violentum vel subluxationem; dolores artuum vel musculorum, sub motu præsertim, aucti, plus minusve fugaces; calore lecti vel alio externo levati; artus debiles, rigidi, facile, & sæpe sponte frigescentes; pyrexia nulla; tumor plerumque nullus.

Rheumatismus chronicus *Auctorum*.

Lumbago & ischias aliquando morbi acuti; sed cum sæpius chronici sint, plerumque ad hunc locum pertinent.

Lond. Med. Obs. IV. 5.

### G. XXIII. ODONTALGIA.\*\*

Rheumatismus vel arthrodynia maxillarum, & carie dentium.

Odon-

---

\* Si, ut quidam statuunt, rheumatismus chronicus ab acuto, genere omnino diversus sit, nomen simplex, uti genus omne, habere oportet, & hujusmodi nec ineptum, ut puto, imposui. Porro, cum pro sequela rheumatismi acuti vel rheumatismi simpliciter dicendi, rheumatismum chronicum dictum semper habeo, & cum inter utrumque morbum sæpe limites vix statuendi sint, ideoque pro diverso genere rheumatismum chronicum recensere vix potui; rheumatismus tamen chronicus exquisitus ab acuto natura adeo diversus evadit, & medelam adeo diversam exposcit, ut merito nomine prorsus diverso insigniri possit, & si quis pro genere etiam diverso ponere velit, per me profecto licet.

\*\* In priori Nosologiæ methodicæ nostræ editione, Odontalgiam pro rheumatismi specie habui, ac recensui; sed,



Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. Sag. G. 157.  
*Junc.* 25. *Macb.* 509.

Odontalgia, sive rheumatismus odontalgicus, *Hoffm.*  
 H. 330.

**Varietates ex Sauvagesio sunt,**

Odontalgia cariola, S. sp. 1.

Odontalgia scorbutica, S. sp. 4.

Odontalgia catharralis S. sp. 3.

Odontalgia arthritica, S. sp. 6.

Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.

Odontalgia hysterica, S. sp. 3.

Odontalgia stomathica, S. sp. 9.

G. XXIV.

PODAGRA.\*

Morbus hæreditarius, oriens sine causa externa evidente, sed præeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum, & plerumque pedis pollicis, certe pedum & manum juncturis, potissimum infectus;

sed, cum eam a rheumatismo alio quovis causam prorsus diversam, acre scilicet membranas sensibiles irritans, habere observaverim, pro genere a rheumatismo diverso etiam habere vellem, & hic itaque uti genus diversum posui.

Etiam si odontalgiam a frigore & aliis irritamentis aliquando suscitari videtur, cariem dentium, diathesin phlogisticam inducentem, semper subesse puto. Sunt fortassis alii morbi, ab acri irritante orti, qui rheumatismum exagere satis referunt; sed de iis nobis non constat. Si tamen revera existeret, ad mentem Clariss. D. COTUNNII, *Ischias nervosa*, rheumatismi ab acri nervos irritante orti exemplum aliud haberemus; sed neque phaenomena a Cotunnio relata, neque ratio medendi, neque sectiones cadaverum, ejusmodi morbum unquam extitisse mihi probant; ideoque neque hic, neque alibi, *Ischiadem nervosam Cotunnii* inter rheumatismi species recensui.

\* *Arthritis* nomen, utpote apud medicos ambiguum, rejeci, & *podagræ* nomine, utpote typum morbi precipuum notante, cum celebri BOERHAAVIO usus sum.

flus; per intervalla revertens, & sæpe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium, affectionibus alternans.

Podagra, V. 175. Boerb. 1254.

Febris podagrica, V. 69.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139. Sag. G. 142. Macb. p. 487. Lond. Med. Obl. VI. 20.

Dolor podagricus & arthriticus verus, Hoffm. H. 339.

Dolores arthritici, Hoffm. H. 317.

Affectus spastico-arthritici, Junk. 46.

Recte forsitan SAUVAGESIUS, more sibi insolito, hujus morbi non nisi unicam esse speciem affirmavit, sed varietates sequentes notari possunt.

I. Podagra (*regularis*) cum inflammatione artuum satis vehementi, per aliquot dies persistente, & paulatim cum tumore, pruritu, & desquamatione parti, recedente,

Arthritis podagra, S. sp. 1.

Arthritis rachialgica, S. sp. 11. \*.

Arthritis æstiva, S. sp. 4.

II. Podagra (*atonica*) cum ventriculi vel alius partis internæ atonia, & vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum & fugacibus, & cum dyspepsia, vel aliis atoniæ symptomatibus, subito sæpe alternantibus.

Ar-

---

\* Ut solitus sum, SAUVAGESII varietates, five species quas vocat, hic appono: sed tum quod species ejus non semper bene definitæ sint, tum quod podagra regularis & atonica a se invicem non semper prorsus disjungantur, in apponendis loco idoneo SAUVAGESII speciebus, me ubique accuratum fore non spondeo.

Arthritis melancholica, S. sp. 6.

Arthritis hiemalis, S. sp. 2.

Arthricis chlorotica, S. sp. 5.

Arthricis asthmatica, S. sp. 9.

III. Podagra (*retrograda*) cum inflammatione artuum subito recedente, & ventriculi vel alius partis internæ atonia mox insecta.

IV. Podagra (*aberrans*) cum partis internæ inflammatione, vel non prægressa, vel prægressa, & subito recedente, inflammatione artuum.

Conjungitur aliquando aliis morbis podagra.

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.

Arthritis scorbutica, S. sp. 7.

Arthritis syphilitica, S. sp. 8.

Ad podagram nequaquam pertinere videntur sequentes.

Arthritis rachitica, S. sp. 13.

Arthritis Americana, S. sp. 14.

Arthritis Bahamensis, S. sp. 15.

## G. XXV. ARTHROPUOSIS. \*

Dolores artuum vel partium musculosarum, sæpe post contusionem profundi, obtusi, diuturni; tumor vel nullus vel modicus, & diffusus; phlogosis nulla; pyrexia primum lenis, tandem hectica, & simul partis apostema.

Tom. II.

F

Lum-

---

\* Cum neque rheumatismum neque podagram in apostema unquam abire credo, est hic morbus ab utroque certe diversus, ideoque pro genere peculiari recensendus. Utinam character ad eum a rheumatismo, arthrodynia, arthrocace, & phlogosi, distinguendum, ubique satis certo adhibendus, dari possit.

Lumbago psoadica, S. sp. 6. *Fordyce*, *Prædixce of Physicæ*

P. II. pag. 70. *Cheston*, App. Gase 4. & 5.

Lumbago apostematosa, S. sp. 12.

Lumbago ab arthrocace, S. sp. 17.

Ischias ex abscessu, S. sp. 6.

Morbus coxarius, *De Haen*, *Rat. Med.* Vol. I. C.

xxxii.

### O. III. EXANTHEMATA.

Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitæ aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, sæpe plures, exiguæ per cutem sparsæ. \*

Exanthemata, *Sag.* Cl. X.

Phleg-

\* Quo charactere recte definiri, & quibus limitibus circumscribi debeat hic ordo, admodum incertum est. Si eruptiones enim a contagione specifica ortæ, solæ pro exanthematis, & morbis hujus ordinis, habendæ sint; certe eruptiones a nulla contagione specifica, sed a quodam febris statu solum, pendentes, inter exanthemata genuina nequaquam recensendæ sunt. Ita *petechia* a nobis omittitur, & forsitan tum *miliaria* tum *aphtha* omittenda esset. Dein, cum exanthemata pleraque contagiosa sint, & non nisi semel in decursu vitæ aliquem afficiant, omnino idoneum videtur ut hæc ab eruptionibus non contagiosis, quæ sæpe in decursu vitæ aliquem afficiant vel afficere possint, rite distinguantur. Variola igitur & erysipelas minus recte sub eodem ordine collocantur. Denique, cum eruptiones in morbo quodam non semper ejusdem sint formæ, nec semper, nec certo quovis morbi die, in illo morbo compareant, an ejusmodi morbus inter exanthemata recensendus sit, merito dubitari potest: ideoque an pestis ad exanthematatum, an ad febrium ordinem, referri debeat, dubito.

De hisce omnibus utiliter fortassis disputari potest; de iisdem vero certo statuere vix ausim; quod mihi tamen in Nosologia maxime idoneum esse videtur, id ex caractere quem dedi satis patebit.

Cum autem ad characteres generum & specierum, ordinis character non omnino necessarius sit, hunc quodammodo neglexi; & hic morbus a Nosologis pro exanthematis habitos plerosque recensui.



Phlegmasiæ exanthematicæ, S. Cl. III. O. I.

Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.

Febres exanthematicæ, V. Cl. I. O. II.

## G. XXVI. VARIOLA.

Synocha contagiosa cum vomitu, & ex epigastrio pressio, dolore.

Tertio die incipit, & quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quæ, spatio octo dierum, in suppurationem, & in crustas demum abeunt, sæpe cicatrices depressas, sive foveolas in cute, relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3. Sag. G. 290.

Febris variolosa, V. 35. Hoffm. II. 49.

Variolæ, Boerb. 1371. Junck. 76.

Species sunt,

I. Variola (*discreta*) pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante.

Variola discreta benigna, S. sp. 1.

Variolæ regulares discretæ, Sydenh. Sect. III. cap. 2.

Variolæ discretæ simplices, Helvet. obs. sp. 1.

Variola discreta complicata, S. sp. 2. Helv. sp. 2.

Variolæ anomalæ, Sydenh. Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. Sydenh. Sect. IV. cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, Mead de variol. c. 2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. Mead ibid.

Variola discreta siliquosa, S. sp. 7. Friend Oper. p. 358.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. Helvet. obs. sp. 3.

II. Variola (*confluens*) pustulis numerosis, confluentibus, circumscriptione irregularibus,

F 2

flac-

flaccidis, parum elevatis; febre post eruptionem persistente.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolæ regulares confluentes, ann. 1667. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Variolæ confluentes simplices, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, *Kempfer.*

Vesiculæ Divæ Barbaræ, *G. Pis.* obs. 149. \*

Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola confluens cohærens, S. sp. 11.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.

Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenh.* Sect. V. cap. 4.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.

Variola sanguinea, *Mead* de variolis, cap. 2.

Variola confluens corymbosa, S. sp. 13.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

## G. XXVII. V A R I C E L L A.

*Synocha.*

Papulæ post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolæ similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 42.

Variola lymphatica, S. sp. 1.

Anglis, the CHICKEN-POX, *Edinb. Med. Essays*, Vol. II. Art. 2. near the end. *Heberden.* Med.

Transact. Art. 17.

## G. XXVIII. R U B E O L A.

*Synocha* contagiosa cum sternutatione, epiphora, & tussi sicca, rauca.

Quar-

---

\* Pro specie variolæ, has vesiculas hic posuit SAUVAGESIUS. Sed vesiculæ a Pisone descriptæ potius ad pemphygum pertinere mihi videntur.

Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulæ exiguæ, confertæ, vix eminentes, & post tres. dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4. Sag. 293.

Febris morbillosa, V. 36. Hoffm. II. 62.

Morbilli, Junck. 76.

I. Rubeola (*vulgaris*) papulis minimis, confluentibus, corymbosis, vix eminentibus.

Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, Sydenh. Sect. IV. cap. 5.

Lond. Med. Obs. IV. 19. 20.

Variat

1. Symptomatibus gravioribus, & decursu minus regulari.

Rubeola anomala, S. sp. 2.

Morbilli anomali, Sydenh. Sect. V. cap. 3.

2. Comitante Cynanche.

Rubeola anginosa, S. sp. 4. Edinb. Essays, Vol. V. art. 2.

3. Comitante diathesi putrida, Clar. Watson, Lond. Med. Observ. Vol. IV. Art. XI.

II. Rubeola (*variolodes*) papulis discretis eminentibus.

Rubeola variolodes, S. sp. 3. \*

F 3

Sco-

\* SAUVAGESIUM fecutus, hunc morbum hic indicavi, etsi multum dubito an recte ad rubeolam referendus sit. Non solum enim forma papularum plurimum differt, sed, quod majoris momenti esse videtur, est plerumque absque symptomatibus catarrhalibus, rubeolæ adeo propriis.

Scotis the NIRLES.

G. XXIX. SCARLATINA.

Synocha contagiosa.

Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein sæpe anasarca.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. Sag. G. 294. Junck. 75.

Species sunt,

I. Scarlatina (*simplex*) nulla comitante cynanche.

Scarlatina febris, S. sp. 1. Sydenh. sect. VI. cap. 2.  
Soc. Royale I. Mem. p. 10. Macb. p. 380.

II. Scarlatina (*cynanchica*) cum cynanche ulcerosa.

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. Withering on the scarlet fever.

De

---

\* Spatio quadraginta annorum Scarlatinam sexies vel septies in Scotia epidemicam observavi, & in unoquoque exemplo morbus illius speciei erat quam Scarlatinam anginosam vocat SAUVAGESIUS. Nos Cynanchicam appellavimus, ex eo quod ulceribus faucium internarum fere semper comitata fuit. Cum in plerisque ægris morbus cynanchem malignam plurimum, aliquando satis exacte referebat, nec unquam scarlatinam epidemicam in omnibus ægris simplicem esse viderim, sæpe dubitavi annon scarlatina omnis sit cynanchica, & semper idem fere morbus ac cynanche maligna, supra inter phlegmasias relata. Plures autem rationes in hanc sententiam ire non sinunt. Certe enim, testibus SYDENHAMO perspicacissimo & aliis, scarlatina simplex, sive nulla comitante cynanche, aliquando observata fuit, & datur, itaque contagio quædam specifica efflorescentiam cutis scarlatinam, & hanc absque affectione quadam cynanchica, signens.

Quod,



De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. Sydenh.  
 Sect. VI. Cap. 6. & Scarlatina variolode,  
 S. sp. 5. nobis non liquet,

G. XXX. PESTIS.

Typhus maxime contagiosa, cum summa debilitate.

Incerto morbi die eruptio bubonum, vel anthracum.

Pestis, S. G. 91. L. 2. *Junck.* 78.

Febris pestilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. sp. 2. Pestis Masiliensis Class. 3.  
 Traité de la peste, p. 41. Eiusdem pestis, Cl. 5ta,  
 Traité, p. 22S.

F. 4. Pe-

Quod, si aliquando etiam contagio sit, fauces afficiens, quæ plerumque etiam scarlatinam gignat, hoc nihil præterea mihi probare videtur, quam quod sit contagionum quarundam natura, ejusmodi ut simul tum fauces, tum cutem, afficere valeat. Cum tamen contagiones istæ ita differre possint, ut altera cutem, altera fauces magis & primario afficere proclivis sit, hanc differentiam inter scarlatinæ & cynanchis malignæ contagionem semper inesse puto. In morbo epidemico, quem pro Scarlatina habui, aliquot ægrotantium sine cynanche quacunque erant; & in iis fere omnibus, quibus adfuit cynanche, hæc benigna admodum, ulcera tonsillarum, parva tantum nec serpentia, & plerumque pus bonum fundentia, exhibuit, & morbus raro funestus fuit. In cynanche vero maligna ægrotantes omnes in ipso morbi ingressu cynanche correpti sunt, & hæc fere semper ulcera maligna, foeda, serpentia, gangranosa, ostendebat. Morbus porro, putredinis & debilitatis indicia plurima prodens, plerumque exitialis evasit.

\* De charactere pestis, lites inter medicos sæpe ortæ sunt, nec facile dirimendæ, ita ut character quibuscunque pestis casibus adhibendus dari possit; sed sufficiat characterem dedisse, qui in plerisque adhiberi queat.

Pestis remittens, S. sp. 9.

Pestis vulgaris, S. sp. 1. Pestis Massil. Cl. 2. Traité, p. 38. Ejusd. Cl. 2. 3. & 4ta, Traité p. 225. &c. Waldschmidt. de peste Holsatica, apud Halleri, Diss. pract. tom. V. Chenot de peste Transylvanica 1755. 1759. De Haen, Rat. med. Pars xiv. Car. de Mertens de peste Moscovense 1771. Samoilowitz Mémoire sur la peste de Moscou 1771. Ejusd. lettre sur l'experience des frictions glaciales pour la guerison de la peste. Ejusd. mem. sur l'innoculation de la peste. Unterrichte vors volk gegen die pest. Dantzig 1770. Muratorius del Governo della peste. Brescia 1721.

Peste Ægyptiaca, S. sp. 11. Alpin. de med. Ægypt.

Pestis interna, S. sp. 3. Pest. Massil. Cl. 1. Traité, p. 37. 224.

### Species dubiæ sunt,

Pestis sporadica, S. sp. 4.

Pestis carbunculosa, S. sp. 5.

Pestis Siamæa, S. sp. 8.

Pestis scorbutica, S. sp. 10.

### G XXXI. E R Y S I P E L A S. \*

Synocha duorum vel trium dierum, plerumque cum somnolentia, sæpe cum delirio.

In aliqua cutis parte, sæpius in facie, phlogosis (*erythema*, G. VII. sp. 2.

Erysipelas, S. G. 97. L. 10. Sag. G. 296.

Fe-

---

\* Vox Erysipelas tum pro phlogosi erythemate, tum pro febre erysipelacea, a scriptoribus medicis usurpatur, sed recte SAUVAGESIUS vitium cutaneum, quod nullam febrem, nisi symptomaticam, sibi junctam habeat, erythema appellari & erysipelas, tantum febris illa exanthematica, quam erythema sequitur, vocari velit.

Minus recte forsitan III. LINNÆUS erysipelas pro protypo exanthematicorum habuit; inter exanthemata enim an recte recensetur ipsum erysipelas dubitari potest.

Febris erysipelacea. V. 68. Hoffm. II. 98.

Febris erysipelatosa. Macb. p. 382.

Species sunt,

I. Erysipelas (*vesiculosum*) erythemate, rubedine serpente, latum spatium occupante, & locis ejus quibusdam in vesiculas magnas abeunte.

Erysipelas rosa, S. sp. 1. Sennert. de febr. L. II. cap. 15.

Febris erysipelatosa, Sydenham, sect. VI. cap. 5.

Erysipelas typhodes, S. sp. 2. \*

Erysipelas pestilens, S. sp. 5. \*\*

Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

II. Erysipelas (*phlyctenodes* \*\*\*) erythemate ex papulis pluribus, trunci corporis partes præcipue occupantibus, & protinus in phlyctænas, sive vesiculas parvas, abeuntibus.

Erysipelas Zoster, S. sp. 8.

Zona, Anglis, The SHINGLES, Russel de tabe gland. p. 124. Hist. 35.

Zona ignea, Hoffm. app. tom. III. p. 426.

Herpes Zoster, S. sp. 9.

Symptomaticum.

Ery-

---

\* Hæc non nisi varietas erysipelatis vesiculosi, gradu solum differens, esse videtur.

\*\* Hæc & sequens non nisi febres cum erythemate symptomatico videntur. Hic tamen notandum est, erysipelas sæpe aliquid putridæ & gangrenosæ indolis præ se ferre; nec dubito quin erysipelas, quod in hac regione, plerumque diathesi phlogistica comitatur, aliquando, præsertim in regionibus calidioribus, cum diathesi putrida adsit; & forsitan duas erysipelatis species, inflammatoriam nempe & putridam, indicare potuissimus; sed de posteriori nobis non satis constat.

\*\*\* An hæc species ad idem cum erysipelate vesiculosi genus recte referatur, dubito; sed judicent periti.

Erysipelās a veneno, S. sp. 13.

Cæteræ SAUVAGESII species ad erythema pertinent.

G. XXXII.

MILIARIA.\*

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, & punctiōibus cutis.

In-

\* Inter medicos, speciatim Viennenses, de indole morbi miliaris nuper acriter disputatum est: & imprimis, an unquam idiopathicus, an vero semper symptomaticus sit, certatim quæritur. Quod nunquam idiopathicus sit, præter opinionem medicorum, a medio sæculi decimi septimi in hunc fere diem, omnium, & contra sententiam medicorum hujus ævi quorundam spectabilium, affirmare non ausim; sed cum experientiam in hac re sæpe fallacem, & medicos plerosque imitatorum servum pecus fuisse noverim, dubitare cogor; & utcumque sit, morbum miliarem plerumque symptomaticum fuisse, ex observatione propria, per multos annos frequenti, certo novi. Nunquam contagiosum, nec manifesto epidemicum, quibusdam licet temporibus solito frequentiore, vidi. Morbis febrilibus quibuscunque, tum inflammatoriis tum putridis, aliquando adjungitur: in nullis tamen, nisi regimine calido & sudoribus præeuntibus, ortum, & in pluribus, regimine temperato, & sudoribus vitatis, morbum, alias expectandum, prorsus vitatum observavi. In quibusdam corporis partibus quasi arte excitatum aliquoties novi. Denique, cum contagionum specificarum plerarumque indolem materia, si qua datur, miliaris nequaquam imitetur, tum quod certo morbi die eruptionem non efficiat, tum quod non semel tantum, sed sæpius in vitam decursu, hominem afficiat. De hujus igitur materiæ naturæ specifica, vel ad morbum quemvis idiopathicum gignendum apta, valde dubito. In hac re mecum sentientem experientissimum & peritissimum CAROLUM VWHITE habere mihi gratulor. Vide *VWhite on the Management of Lying-in Women*.

Cum autem in hac re me falli potuisse, facile agnosco, ne tamen alios simul fallerem, miliariam inter exanthemata hic recensui, & characterem ejus, quem quivis, hunc morbum pro idiopathico habens, dare voluerit, exhibui, peritis quibuscunque hanc rem certius dijudicandam relinquens.



Incerto morbi die erumpunt papulæ rubræ, exiguæ, discretæ, per totam cutem, præter faciem, crebræ, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95. *Sag.* G. 295.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra & alba miliaris; *Hoffm.* II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75.

Germanus der FRIESEL. *God. Welsch. Hist. med. de novo puerperarum morbo, qui der FRIESEL dicitur, Lips.* 1655.

De hoc morbo scriptores præcipui sunt.

*Hamilton* de febr. miliar. 1710. *Fantonus* de febr. mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce* de febre mil. 1748. *Fischer.* de febr. mil. 1767. *De Haen*, de divis. febr. 1760. & in *Ratio med. passim.* *Matt. Collin.* ad *Baldinger* de miliar. 1764. *Baraillon* sur la fièvre miliaire, *Soc. Royale I. Mem.* p. 193. *ibid.* II. *Hist.* p. 198.

*Gastellier* sur la fièvre miliaire des femmes en couche *Montargis* 1779. *Varnier* sur la fièvre miliaire de *Normandie*, *Soc. Royale III. Mem.* p. 281.

Ad Idiopathicam, si qua datur, pertinent:

Miliaris benigna, S. sp. 1.

Miliaris maligna, S. sp. 2.

Miliaris recidivans, S. sp. 3.

Miliaris Germanica, S. sp. 5.

Symptomaticæ manifesto sunt,

Miliaris Boia, S. sp. a.

Miliaris Britannica, S. sp. i.

Miliaris nova febris, *Sydenh. Sched. monit.* S. p. d.

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Miliaris purpurea. S. sp. b.

Miliaris lactea, S. sp. c.

Miliaris puerperarum, S. sp. k.

Miliaris scorbutica, S. sp. 7.

Miliaris critica, S. sp. b.

### G. XXXIII. URTICARIA.

Febris amphemerina. \*\*

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeunt, & post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeunt. \*\*\*

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata; *Junc.* 75.

Scarlatina urticata, S. sp. 2.

Erysipelatis species altera, *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6.

Febris scarlatina, & febris urticata, *Meysercy,*

*Mal. des armées,* 291. & seq.

### G. XXXIV. PEMPHIGUS.

Typus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculæ, avellanæ magnitudi-

ne,

\* Est morbus ab Anglis, *The Nettle Rash* dictus; qui quibusdam Urticaria audit; sed morbus ille, *The Nettle Rash*, ut ab eruditissimo viro G. HEBERDEN, in Coll. Reg. Med. Lond. Actis describitur, & qualem sæpius ipsi vidimus, est ab urticaria nosologorum omnino diversus, utpote sine febre chronicus, & ad Impetigines fortassis referendus.

\*\* Hanc in priori editione contagiosam dixi; sed ex propria experientia contagiosam fuisse non novi, & quo auctore contagiosam antea dixi, nunc non invenio.

\*\*\* Ad aliorum potius quam meipsum mentem character conscriptus est: nam hunc morbum raro vidi, & nunquam epidemicum, vel regulariter, ut hic describitur, decurrentem, observavi.

ne, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphygus, S. G. 93. Sag. 291.

Morta, L. 1.

Febris bullosa, V. 41.

### Species ex SAUVAGESIO sunt. \*

Pemphygus major, S. sp. 1.

Exanthemata serosa, C. Pison. obs. 150.

Febris pemphygodes. Ephem. Germ. D. I. A. VIII. obs. 56.

Pem-

---

\* Cum pemphygum, quæ pro exanthemate habere possum, nondum ipse viderim, & in scriptis medicorum de ejusmodi morbo paucissima tantum invenerim, quæ in Nosologia nostra de eo diceuda essent, omnia fere ex SAUVAGESIO necessario depromenda erant. Eum itaque secutus sum; sed hunc morbum lubenter ipse prorsus omissem, cum omnia fere de eo dicta, dubia, obscura, & ambigua mihi videantur. Quæ ex sui ipsius aut CAROLI PISONIS observatione habet SAUVAGESIUS, omnino credere fas est: quæ autem ex CRISTOPHORI SELIGERI, tenui scerte judicii hominis, observatione duxit, parum attentione digna mihi videntur. Quæ porro ex D. THIERRY relatione adducuntur, meam fidem omnino superant. Nimirum, *quod in morbo admodum exitiali acetum bezoarticum, a medico quodam datum, omnes salvos fecit, interea dum vix unus, aliis medicis commissus, mortem evadebat.* Denique, de morbo admodum ambiguo a D. LANGHANS in Actis Helveticis descripto, donec aliæ observationes rem elucidaverint, nihil concludere vellem. Nihil aliud fortassis, quam cynanche maligna fuit ille morbus, & ad summum quod pemphygus omnis morbus symptomatikus sit, satis verisimile videtur. Paulo postquam hæc impressa sunt, Collega noster eximius Franciscus Home mihi hominem leviter febricitantem ostendit, cui primum in brachiis, & successive demum in toto corpore, vesiculæ magnitudinis avellanæ abortæ sunt, & post duos tresve dies effuso humoris serosi pauxillo collapsæ sunt. Hæc febris autem nullam indolem vel typum peculiarem monstrabat, & cito disparuit nequaquam contagiosa.

*Pemphygus castrensis*, S. sp. 2.

Febris syneches, cum vesiculis per pectus & collum  
sparsis, *Morton.* app. ad exerc. II.

*Pemphygus Helveticus*, S. sp. 3. *Langhans* in *Act.*  
*Helvet.* vol. 2. pag. 260. & in *Beschreibung des*  
*Siementhals*, Zurich. 1753.

Febris velicatoria, *Macb.* sp. 389.

De pemphygo Indico, S. sp. 4. &

*Pemphygo Brasiliensi*, S. sp. 5. non liquet.

## G. XXXV. A P H T H A.

*Synochus*. \*

Lingua tumidiuscula; linguæ & faucium color  
purpurascens; escharæ in faucibus & ad lin-  
guæ margines primum comparentes, os in-  
ternum totum demum occupantes, albidæ,  
aliquando discretæ, sæpe coalescentes, abra-  
sæ cito renascentes, & incerto tempore ma-  
nentes.

*Aphtha*, S. G. 100. L. 9. *Sag.* 298. *Boerb.* 978. *Hof-*  
*fm.* II. 478. *Junc.* 137.

Febris aphthosa, V. 44.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

*Aphtha infantum*.

*Aphtha lactucimen*, S. sp. 1.

*Symptomata videntur*,

*Aphtha febrilis*, S. sp. 2.

*Aph-*

---

\* An aphtha inter exanthemata recensenda sit, dubi-  
to. Aphtha enim quæque fere quam ego vidi sine febre  
fuit: & si quando cum aphtha infantum febris adfuit,  
hæc fere semper aphthæ supervenerat. Aphtha adultorum  
quidem sæpe febris supervenit. Sed, febribus diversarum  
specierum plerumque sub earum finem jungitur, nec,  
quantum novi, febris quævis aphthæ propria, a medicis  
nota, vel quidem dicta fuit.



Aphtha maligna, S. sp. 3.

Manifesto symptomaticæ sunt,

Aphtha syphilitica, S. sp. 4.

Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

Exanthema symptomaticum est

PURPURA, S. G. 96. *Sag.* G. 292. \*

Petechia, L. 5.

#### O. IV. HÆMORRAGIÆ. \*\*

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet.

Hæmorrhagiæ, V. Cl. H. O. I. *Hoffm.* II. 194.  
*Junck.* 5.

Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I. *Sag.* Cl. V. O. I.  
G. XXXVI.

\* Cum in quibusvis febribus, vel intermittentibus vel continuis, in quibusvis etiam exanthematis & profluviis, modo in iis morbis sit quædam ad putredinem proclivitas, appareant petechiæ; has pro efflorescentia symptomatica, potius quam pro exanthemate idiopathico, habere volui.

\*\* Classẽm Fluxuum apud SAUVAGESIUM & SAGGARUM, vel Profluviõrum apud VOGELIUM, vel morborum evacuatiõrum apud LINNÆUM, cum illa morbos, tum facie, tum natura, omnino dissimiles conjunxerit minime naturalem esse, nec proinde idoneam putavi. In nostram igitur Nosologiam ejusmodi classẽm admittere nolui, & morbos in ea recensitos aliorum referendos esse censui. Illi quos pyrexia quædam semper comitatur, sub classẽ Pyrexiarum certe recensendi sunt; & hic igitur hæmorrhagias activas quas vocant posui. HOFFMANNUM sequor, qui mox post febres de ejusmodi hæmorrhagiis tractavit, & in præfatione rationem reddidit; quod, scilicet, "probe consideratis phenomenonis, & paulo pensiculatius subductis rationibus, sanguinis eruptiones iisdem propemodum, utut, non satis completis motibus quibus febres oriuntur, progignuntur."

## G. XXXVI. EPISTAXIS. \*

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

Hæmorrhagia, S. G. 239. L. 173. Sag. G. 174.

Hæmorrhagia narium, Hoffm. II. 196. Junck. 6.

## I. Idiopathica.

Hæmorrhagia plethorica, S. sp. 2. Hoffm. II. 198.

Variat ratione ætatis,

Epistaxis (*juniorum*) cum signis plethoræ arteriosæ.

Epistaxis (*senum*) cum signis plethoræ venosæ.

## II. Symptomaticæ.

## 1. A causis internis.

Hæmorrhagia febrilis, S. sp. 3.

Hæmorrhagia critica, S. sp. 4. Hoffm. II. 198.

Hæmorrhagia insalubris, S. sp. 5. Hoffm. ibid.

Hæmorrhagia in chronicis, S. sp. 6.

## 2. A causis externis.

Hæmorrhagia passiva, S. sp. 1.

Hæmorrhagia a hirudine, S. sp. 7.

G. XXXVII.

\* Recte tum in Criticis Botanicis, tum in Philosophia Botanica, No. 233. monuit LINNÆUS: „*Nomina generica, cum classium & ordinum naturalium nomenclaturis communis, omittenda esse.*„ Contra hanc regulam tamen ipse peccat, cum vocabulo hæmorrhagia, classis vel ordinis naturalis appellatione satis frequenter usitata, pro nomine generico utatur. Nec quidem, cum erraverit, ipse HIPPOCRATES imitandus sit. Hujus generis itaque nomen mutandum erat, & a VOGELIO quod hic usurpatum est desumpti.

## G. XXXVII. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; molestiæ aut doloris, & aliquando caloris, in pectore sensus; dyspnœa; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, sæpe spumosum rejiciens.

Hæmoptylis, S. G. 240. L. 179. V. 34. Sag. G. 175. Junck. 8.

Hæmoptoe, Boerb. 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, Hoffm. II. 102.

Species idiopathicæ sunt,

1. Hæmoptylis ( *plethorica* ) nulla vi externa applicata, neque prægressa tussi aut evacuationis solitæ suppressione.

2. Hæmoptylis ( *violenta* ) a vi externa applicata.

Hæmoptylis accidentalis, S. sp. 1.

Hæmoptylis habitualis, S. sp. 2.

Hæmoptylis traumatica, S. sp. 12.

3. Hæmoptylis ( *phthifica* ) post tussim cum macie & debilitate diuturnam.

Hæmoptylis phthifica, S. sp. 9.

Hæmoptylis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.

Hæmoptoe, Lond. Med. Obs. IV. 16. 18.

4. Hæmotypsis ( *calculosa* ) rejectis simul moleculis calculosis plerumque calcariis.

Hæmoptylis calculosa, S. sp. 14.

5. Hæmoptylis ( *vicaria* ) post evacuationis solitæ suppressionem.

Hæmoptylis catamenialis, S. sp. 4.

Hæmoptylis periodica, S. sp. 5.

Symptomaticæ sunt,

Hæmoptylis *pneumonica*.

Tom. II.

G

Hæ-

Hæmoptysis catarrhalis, S. sp. 8.

Hæmoptysis peripneumonica, *Lælii a fonte*.

Hæmoptysis exanthematica.

Hæmoptysis variolosa, S. sp. 7.

Hæmoptysis rubeolosa.

Hæmoptysis hydropica.

Hæmoptysis ascitica, S. sp. 15.

Hæmoptysis hydrothoracica.

Hæmoptysis cachectica.

Hæmoptysis splenetica, S. sp. 16.

Ineptæ & spurie sunt,

Hæmoptysis a diapedesi, S. sp. 3.

Hæmoptysis a sphacelo pulmonum, S. sp. 11.

Hæmoptysis scorbutica, S. sp. 6.

Hæmoptysis Helvigiana, S. sp. 17.

Hæmoptysis a hirudine, S. sp. 13.

Hæmoptyscos sequela est

## P H T H I S I S.

Corporis emaciatio & debilitas, cum tussi,  
febre hæctica, & plerumque expectoratione  
purulenta.

Phthisis, S. G. 276. L. 208. V. 319. *Sag.* 101.  
*Junck.* 33.

Phthisis pulmonalis, *Boerb.* 1196.

Affectio phthisica, sive tabes pulmonalis, *Hoffm.* III.  
284. Lond. Med. Observ. IV. 18. 23. V. 33.

Simmons on consumptions 1780.

Species sunt,

I. Phthisis ( *incipiens* ) sine expectoratione pu-  
ris.

Phthisis incipiens, *Morton.* Physiolog. L. II. c. 3.

Phthisis sicca, S. sp. 1.

II. Phthisis ( *confirmata* ) cum expectoratione  
puris.

Phthi-



Phthisis confirmata *Auctorum*.

Phthisis humida, S. sp. 2.

Variat utraque species.

Ratione causæ remotæ.

Phthisis hæmoptoica, S. sp. 6.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis asthmatica, S. sp. 5.

Phthisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

Phthisis a febribus, S. sp. 13.

Phthisis rheumatico-arthritis, S. sp. 12.

Phthisis chlorotica, S. sp. 10.

Phthisis ictericia, S. sp. 15. *Schacht.* de phthisi icterit. 1724.

Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.

Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.

Phthisis chylosa, S. sp. 17.

Phthisis scorbutica, S. sp. 4.

Phthisis syphilitica, S. sp. 8.

Phthisis a plica, S. sp. 19.

Phthisis a metastasi puris, S. sp. 9.

Variat ratione fontis purulentæ.

Phthisis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen.* Rat. medendi, vol. I. cap. 7. 11. Ed. Leid. \*

G. XXXVIII. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia; e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

G. 2 Hæ-

---

\* Utrum, de hoc fonte puris, recte an fecus judicaverit HAENIUS, hujusmodi species vix in Nosologia locum habere potest, cum a signis quibusvis externis dignosci non queat.

Hæmorrhoids, S. G. 217. L. 192. Sag. G. 182. Macb. p. 481.

Hæmorrhoidalis fluxus, Hoffm. 219.

Hæmorrhoides, Junck. 11. & 12.

Leucorrhoids, V. 112.

Proctalgia hæmorrhoidalis, Macb. p. 540.

Species sunt,

1. Hæmorrhoids ( *tumens* ) externa a mariscis,  
Marisci, S. G. 35. Sag. G. 37.

Variat,

A. Cruenta.

Hæmorrhoids moderata, S. sp. 1.

Hæmorrhoides ordinatæ, Junck. 11.

Hæmorrhoides nimix, Junck. 11.

Hæmorrhoids immodica, S. sp. 2.

Hæmorrhoides excedentes, Alberti de hæmorrhoid.  
p. 179.

Hæmorrhoids polyposa, S. sp. 3.

B. Mucosa.

Hæmorrhoides decoloratæ, albæ, & mucidæ, Junck.  
13. Alberti, pag. 248.

Proctalgia intertriginosa, Macb. p. 541.

2. Hæmorrhoids ( *procidens* ) externa a procidentia ani.

Hæmorrhoids ab exania, S. sp. 4. Med. Ess. Liter.  
& Phys. II. 27. Morgag. de caus. Ep. XXXIII.

3. Hæmorrhoids ( *fluens* ) interna absque tumore externo, vel procidentia ani. \*

4. Hæ-

---

\* STAHLIUS, & ejus sequaces distinxerunt hæmorrhoides in internas, quæ sanguinem ex ramis venæ portarum, & externas, quæ sanguinem ex ramis venæ cavæ profundunt; sed, quantum video, icaturigo sanguinis profusi nullo modo dignosci queat. Huic itaque distinctioni nullus locus esse videtur, nec, si esset, quicquid

4. Hæmorrhoids ( *cæca* ) cum dolore & tumore ani, sine profusione sanguinis.

Hæmorrhoides cæcæ. *Junck.* 12. *Alberti*, pag. 274. \*

Proctalgia inflammatoria, *Macb.* p. 540.

### G. XXXIX. MENORRHAGIA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruorum copiosior, vel sanguinis e vagina præter ordinem fluxus.

Menorrhagia, *S. G.* 244. *L.* 202. *V.* 96.

Metrorrhagia, *Sag.* *G.* 179.

Uteri hæmorrhagia, *Hoffm.* II. 224.

Hæmorrhagia uterina, *Junck.* 14.

Leucorrhœa, *S. G.* 267. *L.* 201. *V.* 119. *Sag.* *G.* 202.

Cachexia uterina, sive fluor albus, *Hoffm.* III.

348.

Fluor albus, *Junck.* 133. \*\*

G. 3

Abor.

ad distinguendam morbi naturam; vel effectum, conferre posset; nam arteriæ & venæ, ad inferiorem intestini recti partem pertinentes, ortu utcumque diversæ, tam frequenter inter se invicem communicantur & conjunguntur, ut uniuscujusvis affectio ad alteram statim communicari, & utriusvis effectus fere idem semper esse oporteat. Non ideo hæmorrhoidem internam & externam ad mentem Stahlianorum distinximus, sed prout scaturigo sanguinis profluentis magis intra vel extra anum fuerit.

\* Hæmorrhoids sæpe corporis universi morbus est, sive a quodam universi corporis statu pendens; sed sæpe etiam morbus est mere localis. Non tamen hujusmodi species ad morbos locales referre volui; quoniam hæmorrhoids quævis, etiamsi initio mere localis sit, si sæpius, ut solet, redierit; tandem, sicut hæmorrhagia alia quævis sæpe rediens, necessario fit universi corporis morbus. Affines itaque separare nolui, & hæmorrhoidem quidem omnem hic inter morbos universales esse recensendam censui.

\*\* Leucorrhœam, sive fluorem album *auctorum*, hic ad menorrhagiæ genus retuli, & leucorrhœam sine vitio locali

Abortus, S. G. 245. L. 204. Sag. G. 180. Junck.

92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, Boerb. 303.

Convulsio uteri, sive abortus, Hoffm. III. 176.

Species sunt,

1. Menorrhagia ( *rubra* ) cruenta in non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 3. a *Pasta*. Diff. sopra i mestruj.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 2.

2. Menorrhagia ( *abortus* ) cruenta in gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. sp. 6. *Pasta* intorno al flusso di sangue dall'utero nelle gravide.

Abortus effluxio, S. sp. 1.

a. Abortus subtrimestris.

b. Abortus subsemestris.

c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

3. Menorrhagia ( *lochialis* ) cruenta in puerperis.

Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. *Pasta* diff. supra citat.

4. Menorrhagia ( *vitiorum* ) cruenta ex vitio locali.

Menorrhagia ex hysteroptosi, S. sp. 5.

Menorrhagia ulcerosa, S. sp. 9.

5. Me-

---

cali omnem huc omnino referendam esse censeo. Plerumque enim, & fere semper, leucorrhœa vel cum menor-  
rhagia conjuncta est, vel eam mox secuta, & a temporibus quando apparet leucorrhœa serum sub hac effusum ab  
iisdem vasis, quæ menses profundunt, provenire, & sæpe  
leucorrhœam ab iisdem causis ac menorrhagiam rubram  
oriri, satis verisimile est.



5. Menorrhagia ( *alba* ) serosa sine vitio locali in non gravidis. \*

Leucorrhoea, G. ut supra.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.

Leucorrhoea Americana, S. sp. 5.

Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.

6. Menorrhagia ( *Nabothi* ) serosa in gravidis.

Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.

Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8.

Menorrhagiam serosam, five leucorrhoeam ex vitio locali, ad morbos locales referendam esse cenleo.

Hæmorrhagiæ sequentes plerumque, si non semper, symptomaticæ sunt.

STOMACACE, S. G. 241. L. 175. V. 85. Sag. G. 176.

Vel scorbuti, vel vitii oris, vel injuriæ externæ, symptoma est. Cum autem species SAU-  
G. 4 VA-

\* Hic fortassis lector eruditus mirari possit, quod ad clariss. medici Parisensis RAULIN, de fluore albo librum, *Traité de fleurs blanches*, neque studiosus relegaverim, neque species fluoris albi varias ab illustri auctore indicatas ipse recensuerim. Recte an secus fecerim, peritis dijudicandum relinquo; sed quod non fecerim hæc causa fuit. Plura in libro illo ingenioso subtilius, quam verius dicta, mihi videntur; & vel quomodo fluor albus, ab aliarum præter uteri partium affectione oriri possit, non intelligo, vel quod revera oriantur, ex meis saltem observationibus, forsan paucioribus, mihi nequaquam constat. Lectores itaque nostros potius ad auctorem ipsum relegare, quam doctrinam ejus male intellectam, & forsan minus recte traditam, hic exhibere velim.

VAGESII fere omnes reeensere idoneum dūco,  
nunc sequenti serie recensitas velim.

Hæmatemesis plethorica, S. sp. 1.  
catamenialis, S. sp. 5.  
hæmorrhoidalis,  
ex splene, S. sp. 7.  
ex hepate, S. sp. 13.  
ex pancreate, S. sp. 6.

Hæmatemesis atra, S. sp. 12.  
scorbutica, S. sp. 8.  
ex aneurysmate, S. sp. 2.  
carnosis cruenta, S. sp. 11.  
traumatica, S. sp. 3.  
ab hirudine, S. sp. 4.  
cholericæ, S. sp. 9.  
a veneno, S. sp. 14.  
Simulata, S. sp. 10.

Apud SAUVAGESIUM species sunt,

1. Stomacacæ scorbutica.
2. Stomacacæ universalis.
3. Stomacacæ ab hæmorrhoo.
4. Stomacacæ purulenta.

HÆMATEMESIS, S. G. 242. L. 184. V. 89. G.  
177.

Plerumque hæmorrhagiæ solitæ vicaria est, vel  
vitii ventriculi localis, vel morbi nigri,  
vel denique vis externæ, symptomata est.

1. Hæmatemesis plethorica.
2. Hæmatemesis ex aneurysmate.
3. Hæmatemesis traumatica.
4. Hæmatemesis ab hirudine.
5. Hæmatemesis catamenialis.
6. Hæmatemesis ex pancreate.
7. Hæmatemesis ex splene.
8. Hæmatemesis scorbutica.
9. Hæmatemesis cholericæ.
10. Hæmatemesis simulata.
11. Hæmatemesis carnofo-cruenta.

12. Hæmatemesis atra.
13. Hematemesis ab hepate.
14. Hæmatemesis a veneno.

HÆMATURIA, S. G. 243. L. 198. V. 92. Sag. G.  
178.

Ed nb. Eff. V. 72.

Plerumque calculi renalis, aliquando febrium  
putridarum symptoma est.

Species secundum SAUVAGESIUM sunt.

Hæmaturia spontanea, S. sp. 1.

catamenialis, S. sp. 12.

calculosa, S. sp. 5.

nigra, S. sp. 11.

purulenta, S. sp. 4.

violenta, S. sp. 2.

traumatica, S. sp. 14.

hæmorrhoidalis, S. sp. 9.

ejaculatoria, S. sp. 7.

Hæmaturia stilliticia, S. sp. 8.

in exanthematicis, S. sp. 6.

Spuria, S. sp. 10.

deceptiva, S. sp. 3.

a transfusione, S. sp. 13.

a verme, S. sp. 15.

CYSTIRRHAGIA, V. 93.

Plerumque calculi vesicalis, rarius alius mor-  
bi vesicæ, symptoma.

## O. V. PROFLUVIA. \*

Pyrexia cum excretionē aucta, naturaliter non  
sanguinea.

Pr.

---

\* Ob eandem rationem qua hæmorrhagias, profluvia  
etiam febrilia quædam hic in classe pyrexiarum colloca-  
vi. Catarrhus quidem, pyrexia & diathesi phlogistica,  
phlegmasiis maxime affinis est: & dysenteria non solum  
pyrexiam semper comitatur, sed in multis etiam a fluxi-  
bus aliis quibusvis differt.

Profluvia, V. Gl. II.

G. XL.

CATARRHUS.

**Pyrexia** sæpe contagiosa; muci, ex glandulis membranæ narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98. *Sag.* G. 145.Coryza, L. 174. V. 100. *Sag.* G. 196.Rheuma, S. G. 149. *Sag.* G. 255.Tussis, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Sag.* G. 249.*Junck.* 30.Tussis catarrhalis & rheumatica, *Hoffm.* III. 109.

**Genera sequentia ad hunc titulum referenda, plerumque symptomatica sunt.**

Anacatharsis, S. G. 262. *Sag.* 198.

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

### Sp. I. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.

Catarrhus pectoreus, S. sp. 6.

Coryza catarrhalis, S. sp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.* obs. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de sed. XIV. 21.

Coryza tebricosa, S. sp. 6.

Tussis catarrhalis, S. sp. 1. N. *Rosen* Diff. apud *Haller*, disput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. sp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Febris remittens catarrhalis, *Mach.* p. 359.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

### Sp. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.

Rheuma epidemicum, S. sp. 2.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.



## Hujus exempla sunt.

- Anno 1323. Chronica meteorologica della Toscana, apud *Targioni Tozzetti* Osservaz. Med. Raccolta I. pag. 175.
1328. Ibid.
1358. Ibid.
1387. Ibid.
- Valescus de Taranta* apud *Morgagn.* de sedibus XIII. 4.
- Marchesi* ibid.
1510. *Valleriola*, append. ad loc. com. c. 2.
1575. *Valleriola* ibid.
- Riverii* Obs. in biblioth. ver. repert. obs. IX.
- Foresti*, L. VI. obs. 1.
1580. *Henischius* in *Aretaum*, pag. 315. 396.
- Wieri*, Obs. L. II.
- P. Sal. Diversus*, de febre pestilenti, cap. XI.
- Forestus*, L. VI. obs. 3.
- Riverii* Obs. in biblioth. ver. repert. obs. X.
- Sennertus* de febre, L. IV. cap. 17.
1591. *Sennertus*, ibid.
- Pechlin*, L. II. Obs. 17.
1658. *Willis* de febribus, cap. 16.
1675. *Sydenham*, Sect. V. cap. 5.
- Raygerus* in *Ephem. Germ. D. I. A. VI.* & VII. obs. 213.
- P. de Sorbair.*
1679. *Sydenham*, Ep. resp. ad *R. Brady.*
- Zod. med. Gall. A. I. Decemb.* obs. 6.
1708. *Schroeckius* in *Ephem. Germ. Cent. I.* & II. in append. pag. 14.
1709. *Hoffm.* II. 47.
1712. *Camerarius* in *Ephem. Germ. Cent. III.* & IV. obs. 58.
- Schroeckius*, ibid. in append. p. 26.
1729. & 1730. *Hoffm.* II. 109.
- C. Fr. Loew.* in append. ad *A. N. C.* vol. III.

Schen.

# GENERA MORBORUM

- Scheuchzer*, Obs. meteorol. in app. ad A. N. C. vol. IV.
- Morgagni* de sed. & caus. XIII. 3. 4.
- Beccarius*, A. N. C. III. obs. 48. p. 142.
- Hillary* on vveather and diseases, p. 35.
- Wintringham*, Comm. Nosolog. p. 319.
- Ruty's* hist. of vveather, pag. 17.
- Perkin's* Soc. Royale I. Hist. p. 209.
1732. & 1733. *Commerc. lit. Norimb.* 1733. pag. 6. 52. 108. 267.
- Detharding* de febr. Eyderostad. apud *Halleri* disput. pract. vol. V.
- Edin. Med. Ess.* vol. II. art. 2.
- Hillary* of vveather, &c. pag. 47.
1732. & 1733. *Wintringham*, Comm. Nosolog. p. 354.
- Huxham* de aere, &c. 1733. M. Febr.
- Rutty's* hist. of vveather, pag. 30.
1737. Jan. *Rutty*, ibid. 60.
- Octob. *Rutty*, ibid. 60.
- Julio. *Comm. lit. Norimb.* 1737. p. 347.
1742. 1743. *Comm. lit. Norimb.* 1743. p. 106.
188. 313. 336.
- Juch & Zuberabuler* de febre catarrhali, apud *Haller. Disp. pract. tom. V.*
- Huxham* de aere, 1753. M. April.
- Rutty*, hist. of vveather, p. 99.
- Targioni Tozzetti*. Raccolt. I. di osservaz. Med. pag. 176.
1748. *Cleghorn*, Minorca, p. 132.
- Perkin's* Soc. Royale I. Hist. p. 210. & suivans.
1758. *Putty*, hist. of vveather, pag. 211.
- Whytt*, Lond. Med. Obs. vol. II. art. 13.
1762. *Baker* de catarrho, Lond. 1764.
- Monro*, Dis. of mil. hosp. pag. 137.
- Mach.* p. 333.
1767. *Heberden*, Med. transact. I. art. 18.
- Macb.* p. 334.
1775. Lond. Med. Obs. VI. 30.

Inter catarrhi, coryzæ, & tussis species apud  
 SAUVAGESIUM, symptomaticæ sunt,

- Catarrhus rubeolofus, S. sp. 5.
- Tussis exanthematica, S. sp. 20.
- Coryza variolosa, S. sp. 4.
- Coryza virulenta, S. sp. 3.
- Coryza purulenta, S. sp. 5.
- Tussis accidentalis, S. sp. 4.
- Tussis gutturalis, S. sp. 8.
- Tussis xerolaryngea, S. sp. 23.
- Tussis verminosa, S. sp. 21.
- Tussis sicca, S. sp. 3.
- Tussis calculosa, S. sp. 22.
- Tussis phthifica, S. sp. 17.
- Tussis hæmoptoica, S. sp. 15.
- Tussis a polypo, S. sp. 16.
- Tussis a dentitione, S. sp. 12.
- Tussis stomachalis humida, S. sp. 6.
- Tussis stomachalis sicca, S. sp. 7.
- Tussis hylterica, S. sp. 2.
- Tussis gravidarum, S. sp. 14.
- Tussis hepatica, S. sp. 9.
- Tussis rheumatica, S. sp. 18.
- Tussis arthritica, S. sp. 19.
- Tussis metallicorum, S. sp. 4.

#### G. XLI. DYSENTERIA.

Pyrexia contagiosa ; dejectiones frequentes ;  
 mucosæ, vel sanguinolentæ, retentis plerum-  
 que sæcibus alvinis ; tormina ; tenesmus :

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. Sag. 183.  
 Hoffm. III. 151. Junck. 76.

Non nisi speciem unicam novi, cujus nomi-  
 na apud SAUVAGESIUM sunt,

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. Sydenham, sect. IV.  
 cap. 3. Helvvich. in hist. morb. Wratislav. ann.

1699. *Degner*. de Dysenteria Neomagensi 1736.  
*Huxham*, de aere, &c. ad ann. 1743. *Clegorn's*  
 Minorca, chap. 5. *Grimm*. hist. dysenteriae ma-  
 lign. 1759, &c. in append. ad A. Nov. N. C. vol.  
 III. *Baker* de catarrho & dysenteria, Lond. 1762.  
*Akenside* de dysenteria, Lond. 1762. *Stark*, Hist.  
 & sectiones dysenteric. diss. inaug. L. B. 1706.  
*Zimmerman* von der Ruhr. Zurich. 1767. Soc.  
 Royale III. Mem. p. 32.  
 Dysenteria castrensis, S. sp. 7. *Rammazini* de morb.  
 artific. cap. 40. Illust. *Pringle*, Dis. of the ar-  
 my, pag. 224. *Cl. Monro*, Dis. of mil. hospitals,  
 pag. 57.  
 Dysenteria æquinoctialis, S. sp. 14. *Bont.* de med.  
 Ind. cap. 3.

### Variat

#### 1. Vermibus comitata.

- Dysenteria verminosa, S. sp. 15. *Huxham* de aere,  
 &c. ad ann. 1743. *M. Majo*. III. *Pringle*, pag.  
 225. *Monro*, pag. 62.

#### 2. Rejēctis moleculis carnosis, vel sebaceis.

- Dysenteria carnosa, S. sp. 16.  
 Diarrhœa carnosa, S. sp. 5. *Vvedelius* Ephem. Germ.  
 D. II. A. II. obs. 182. *VVagner*, ibid. D. II. A.  
 III. obs. 187. cum scholio *Schroeckii*. *Morgagn.* de  
 fed. Ep. XXXI. 17—14. Ill. *Pringle*, pag. 237.  
*Monro*, pag. 62.

#### 3. Febre intermittente comitata.

- Dysenteria intermittens, S. sp. 17. *Morton* in ap-  
 pend. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, p. 236.  
*Lautter*. hist. med. bienn. cas. 17. 20.

#### 4. Sine sanguine.

- Dysenteria alba, S. sp. 10. *VWillis*, Pharm. rat. P.  
 Sect. III. cap. 3. *Sydenham*, Ed. Leid. pag. 179.  
*Morgagn.* de fed. Ep. XXXI. 11. Ill. *Pringle*,  
 pag. 245. *Cl. Monro*, pag. 61. *Roederer* de mor-  
 bo mucoso, Gotting. 1762.



## 5. Miliaria comitata.

Dysenteria miliaris Gruberi, S. sp. 2. Febris exanthematico-dysenterica Tiguri epidemica, 1747.

## Symptomata sunt,

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 8.  
 Dysenteria catamenialis, S. sp. 2.  
 Dysenteria gravidarum, S. sp. 4.  
 Dysenteria atrabiliaria, S. sp. 5.  
 Dysenteria syphilitica, S. sp. 13.  
 Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.  
 Dysenteria Polonica, S. sp. 19.  
 Dysenteria mesenterii vomica, S. sp. 11.

## Ad diarrhoeam pertinent,

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.  
 Dysenteria a catharticis, S. sp. 12.

## CL. II. NEUROSES. \*

Sensus & motus læsi, sine pyrexia idiopathica,  
 & sine morbo locali.

## O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum sopore, sive  
 sensuum feriatiōe.

Co-

---

\* A tempore celebris quondam apud Anglos medici THOMÆ VVILIS, morbos quosdam ab aliis quibusvis, sub nomine Nervosorum, distinxerunt Britanni: sed, ni fallor, parum accurate, dum affectiones hystericas & hypochondriacas fere solas sub nomine Nervosorum indigitarunt. Quantum ego quidem video, motus morborum fere omnes a motibus in systemate nervorum ita pendent, ut morbi fere omnes quodammodo Nervosi dici queant. Inter eos tamen distinctionem satis commode adhibere licet, & morbi isti qui nervorum systema fere solum, vel saltem primario, neque simul vel sanguinis circuitum, vel

Comata, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* Cl. IX. O. V.  
 Soporosi, L. Cl. VI. O. II.  
 Adynamia, V. Cl. VI.  
 Nervorum resolutiones, *Hoffm.* III. 194.  
 Affectus soporosi, *Hoffm.* III. 209.  
 Mortuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

## G. XLII. A P O P L E X I A.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum  
 sopore \*, plus minus profundo, superstito  
 motu cordis & arteriarum.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerb.* 1007.  
*Junck.* 117. *Sag.* G. 288. *Wepfer.* hist. apoplecti-  
 corum.

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerb.* 1045.  
*Sag.* G. 287. *Macb.* p. 561. †

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerb.* 1048.  
*Sag.* G. 286.

Coma, V. 232. *Boerb.* 1048.

Hæmorrhag a cerebri, *Hoffm.* II. 240.

Ad hoc genus pertinere mihi videntur.

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Sag.* G. 281  
*Boerb.* 1036. *Junck.* 44.

Affectus cerebri spasmotico-ecstaticus, *Hoffm.* III.  
 44.

Ecstasis, S. G. 177. V. 333. *Sag.* G. 283.

Sym-

vel humorum naturam, nisi secundario afficiunt, Ner-  
 vosi a nobis dicendi sunt. Classem itaque tam a classe  
 pyrexiarum, quam a classe cachexiarum diversam, sub  
 nomine Neurosium recte instituisse mihi videor.

\* Apud LINNÆUM vocabulum Sopor, tam pro mo-  
 tuum, quam pro sensuum feriatiōe ponitur; sed sensu  
 vulgari, tantum pro somno, vel pro statu somno simili,  
 eodem utimur.

† Cum genera *carus*, &c. hic subijuncta non nisi apo-  
 plexiæ leviores esse videntur, nec vel respiratione vel ex-  
 citatione satis accurate distinguenda sint, ad unum genus  
 omnia referenda esse censui.

Symptomata esse videntur:

Typhomania, S. G. 178. L. 97. VI. 23. Sag. G. 284.

Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 12. Sag. G. 285.

Apoplexiæ idiopathicæ species sunt,

I. Apoplexia ( sanguinea ) cum signis plethoræ universalis, & præcipue capitis.

Apoplexia sanguinea, S. sp. 1. Morgagn. de causis, &c. II. III. LX. Preyinger, sp. 1.

Cæcus spontaneus, S. sp. 2. Boerb. 1045.

Asphyxia \* spinalis, Du Hamel, Hist. Acad. ann. 1668. cap. 2. Boerb. Prælect. ad Instit. 401. Morgagn. de caus. &c. III. 3.

Cataphora coma, S. sp. 2.

Tom. II.

H

2. Apo

\* Genus asphyxiæ ad syncopen olim retuli, & ejusdem species quasdam non nisi gradu a syncope differre, adhuc censeo. Plures vero asphyxiæ species ad apoplexiæ genus pertinere olim & nunc etiam persuasum habeo; ideoque eas hic recensui. Asphyxia spinalis quidem hic apposita, utpote signis nullis externis dignoscenda, male inter species recensetur; si vero ad causas internas unquam respicere liceret, certe inter apoplexiæ species recensenda esset. Cum autem ad causas externas & evidentes omnino respicere liceat, ab his satis perspectis plures asphyxiæ species a SAUVAGESIO recensitas inter apoplexiæ species enumeravi; nec huic ob stare velim quod, in quibusdam asphyxiæ speciebus, tum pulsus arteriarum tum respiratio, vita etiam superstita, tandem penitus cessant; nam in harum plerisque sub initio, cum motus & sensus fere penitus abolentur, superest adhuc motus quidam tum cordis tum pulmonum; & si tandem omnino cessant, idem aliquando apoplecticis ante mortem accidit. In apoplexia porro cerebrum, in syncope autem cor, primario affectum esse opinor; & asphyxiæ species itaque, prout cerebrum vel cor primario afficiant, quatenus id fieri, ex causis earum externis, conjicere liceat, ad apoplexias vel syncopes genus refero.

2. Apoplexia (*serosa*) in corpore, plerumque senum, leucophlegmatico.

Apoplexia pituitosa, S. sp. 7. Apoplexia serosa, *Preysinger*, S. sp. 4. *Morg.* de causis, &c. IV. LX.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.

Cataphora somnolenta, S. sp. 1.

Lethargus literatorum, S. sp. 7. *Van Swieten* in aph. 1010. 2 y. & 3 x.

3. Apoplexia (*hydrocephalica* \*) paulatim adoriens, infantes & impuberes, primum lassitudine, febricula & dolore capitis, dein pulsu tardiore, pupillæ dilatatione, & somnolentia afficiens.

Hydrocephalus interior, S. sp. 1.

Hydrocephalus internus, *Whytt's Works*, p. 125.

*Lond. Med. Observ.* Vol. IV. art. 3. 6. and. 25. VI.

6. 7. 8. *Gaudelius* de hydrocephalo, apud *Sandisfort*

*Thesaur.* Vol. II. Ed. Med. Ess. II. 18. III. 23.

*Soc. Royale III. Mem.* p. 194.

Hydrocephalus acutus, *Quin*, *Diff. de hydrocephalo*. *Edinb.* 1779.

Asthénia a hydrocephalo, S. sp. 3.

4. Apoplexia (*atrabiliaria*) in corpore melancholico.

Apoplexia atrabiliaria, S. sp. 12. *Preysinger*, sp. 6.

Ca.

---

\* In opere nosologico, morbos qui sub suo decursu variam induunt formam, rite collocare, ideoque apoplexiæ hydrocephalicæ locum maxime idoneum assignare, difficile est. Hunc morbum autem sub apoplexiæ potius quam hydrocephali titulo ponere vellem; primo, quia hydrocephalus, qui hoc subest, nequaquam sensibus evidens est; dein quia hic morbus symptomatis ab hydrocephalo evidente plurimum differt; denique, quia causa proxima & tandem symptomatis, apoplexiæ quam maxime affinis est.



Carus traumaticus, S. sp. 5.

5. Apoplexia (*traumatica*) a vi externa mechanica, capiti illata.

Apoplexia traumatica, S. sp. 2. Ed. Ess. V. 52.

6. Apoplexia (*venenata*) a potentiis sedantibus interne vel externe adhibitis.

Apoplexia temulenta, S. sp. 3.

Carus a narcoticis, S. sp. 14.

Lethargus a narcoticis, S. sp. 3.

Carus a plumbagine, S. sp. 10.

Apoplexia mephitica, S. sp. 14. Ed. Ess. V. 55.

Asphyxia a mephitide, S. sp. 9.

Asphyxia a multo, S. sp. 3.

Cataleptis a fumo, S. sp. 3.

Asphyxia a fumis, S. sp. 2.

Asphyxia a carbone, S. sp. 16.

Asphyxia foricariorum, S. sp. 11.

Asphyxia fideratorum, S. sp. 10.

Carus ab insolatione, S. sp. 12.

Carus a frigore, S. sp. 15.

Lethargus a frigore, S. sp. 6.

Asphyxia congelatorum, S. sp. 5.

7. Apoplexia (*mentalis*) a pathemate mentis.

Carus a pathemate, S. sp. 11.

Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Ecstasis catoche, S. sp. 1.

Ecstasis resoluta, S. sp. 2.

8. Apoplexia (*cataleptica*\*) musculis, sub artuum a vi externa motu, contractilibus.

H 2

Ca.

---

\* Catalepsin nisi simulatam ipse nunquam vidi, & ab aliis visam frequenter simulatam fuisse credo. De morbo itaque rarius viso, varie descripto, & sæpe prorsus simulato, pro certo statuere mihi vix liceret; sed genere ab apoplexia neutiquam diversum esse, bene persuasus sum; ideoque hic inter apoplexiæ species collocavi.

Catalepsis. S. G. 176. L. 129. V. 230. Sag. G. 281.  
Boerb. 1036. Junck. 44.

**Species apud SAUVAGESIUM sunt.**

- Catalepsis hysterica, S. sp. 1.
- verminosa, S. sp. 2.
- a fumo, S. sp. 3.
- a menostasia, S. sp. 4.
- melancholica, S. sp. 5.
- delirans, S. sp. 6.

**9. Apoplexia (*suffocata*) a potentia externa suffocante.**

- Asphyxia suspenforum, S. sp. 4.
- Asphyxia immerforum, S. sp. 1. M. Donel de submersis, Edin. 1784.
- Asphyxia flatulenta, S. sp. 12. ad apoplexiæ genus pertinet, si a signis externis dignosci possit.

**Apoplexia sæpe symptomatica est,**

**1. Febris intermittens.**

- Apoplexia febricosa, S. sp. 9.
- Carus febricosus, S. sp. 3.
- Cataphora timor, S. sp. 8.
- Typhomania febricosa, S. sp. 1.
- Catalepsis quartanaria, S. sp. 7.

**2. Febris continuæ.**

- Carus febrilis, S. sp. 2.
- Typhomania continua, S. sp. 2.
- Typhomania agrypnocoma, S. sp. 3.
- Lethargus a febre, S. sp. 1.

**3. Phlegmasiæ.**

- Apoplexia inflammatoria, S. sp. 13.
- Lethargus cephaliticus, S. sp. 4.
- Lethargus pulmonicus, S. sp. 2.

**4. Exanthematis.**

- Carus variolosus, S. sp. 8.
- Apoplexia metastatica, S. sp. 6.

*Carus exanthematicus*, S. sp. 18.

*Cataphora exanthematica*, S. sp. 5.

### 5. *Hysteriæ*.

*Apoplexia hysterica*, S. sp. 4.

*Carus hystericus*, S. sp. 9.

*Asphyxia hysterica*, S. sp. 8.

*Carus myltagmus*, S. sp. 17.

*Carus hypochondriacus*, S. sp. 13.

### 6. *Epilepsiæ*.

*Apoplexia epileptica*, S. sp. 8.

*Apoplexia suspiriosa*, S. sp. 10.

### 7. *Podagriæ*.

*Apoplexia arthritica*, S. sp. 5.

*Carus arthriticus*, S. sp. 6.

*Cataphora arthritica*, S. sp. 4.

*Lethargus arthriticus*, S. sp. 5.

### 8. *Vermium*.

*Apoplexia verminosa*, S. sp. 15.

*Carus verminosus*, S. sp. 7.

*Typhomania verminosa*, S. sp. 4.

### 9. *Ischuriæ*.

*Carus Ischuriosus*, S. sp. 4.

### 10. *Scorbuti*.

*Cataphora scorbutica*, S. sp. 3.

## G. XLIII.

## P A R A L Y S I S.

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti,  
sæpe cum sopore.

*Paralysis*, Boerh. 1057.

*Hemiplegia*, S. G. 170. L. 103. V. 228.

*Paraplexia*, S. G. 171.

*Paraplegia*, L. 102. V. 227.

*Paralysis*, S. sp. 169. L. 104. V. 226. Junck. 115.

*Atonia*, L. 120.

## 1. Species idiopathicae sunt,

i. Paralyſis (*partialis*) quorundam muscutorum tantum.Paralyſis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.

Paralyſis plethorica, S. sp. 1.

Paralyſis ſeroſa, S. sp. 12.

Paralyſis nervea, S. sp. 11.

Muritas a glioſolyſi, S. sp. 1.

Aphonia paralytica, S. sp. 8.

2. Paralyſis (*hemiplegica*) alterius corporis lateris.Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228. *Sag. G.* 276.

## Variat ratione habitus corporis.

## a. Hemiplegia in habitu plethorico.

Hemiplegia ex apoplexia, S. sp. 7.

Hemiplegia ſpaſmodica, S. sp. 2.

## b. Hemiplegia in habitu leucophlegmatico.

Hemiplegia ſeroſa, S. sp. 10.

## Male recenſetur.

Hemiplegia apoſtematodes, S. sp. 11.

## Quæ ſignis externis dignoſci non poteſt, &amp;

Hemiplegia ex epilepſia, S. sp. 12.

## Recenſeri vix meretur.

3. Paralyſis (*paraplegica*) dimidii corporis tranſverſi ſumpti.Paraplexia, S. G. 171. *Sag. G.* 277.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paraplexia ſanguinea, S. sp. 2.

Paraplexia a ſpina bifida, S. sp. 3.

Paraplexia rheumatica, S. sp. 1.



4. Paralysis ( *venenata* ) a potentiis sedantibus  
externe vel interne adhibitis.

Paralysis metallariorum, S. sp. 22.

Hemiplegia saturnina, S. sp. 14.

II. Species symptomaticæ sunt.

Hemiplegia intermittens, S. sp. 8.

Paraplegia intermittens, S. sp. 6.

Paralysis febrilis, S. sp. 8.

Hemiplegia exanthematica, S. sp. 6.

Paralysis rheumatica, S. sp. 3.

Hemiplegia arthritica, S. sp. 5.

Paralysis rachialgica, S. sp. 2.

Paraplegia rachialgica, S. sp. 5.

Paralysis biliosa, S. sp. 9.

Hemiplegia transversa, S. sp. 1.

Paralysis scorbutica, S. sp. 6.

Paralysis scrophulosa, S. sp. 5.

Hemiplegia scrophulosa, S. sp. 4.

Hemiplegia syphilitica, S. sp. 3.

Paraplegia syphilitica, S. sp. 7.

Paralysis Polonica, S. sp. 7.

Paralysis a vomica, S. sp. 10.

Paralysis traumatica, S. sp. 4.

Hemiplegia traumatica, S. sp. 9.

Paraplegia traumatica, S. sp. 4.

Tremorem, utpote semper symptomaticum;  
in numerum generum recipere nollem; spe-  
cies autem a SAUVAGESIO recensitas, prout  
mihi vel Astheniæ vel Paralysis, vel con-  
vulsionis symptomata esse videntur, hic sub-  
jungam.

T R E M O R.

Artus alterna per itus & reditus frequentes  
motitatio.

Tremor, S. G. 129. L. 139. V. 184. Sag. 236.

## 1. Species asthenicæ.

Tremor a debilitate, S. sp. 1.

Tremor senilis, S. sp. 2.

Tremor a coffea, S. sp. 4.

Tremor a pathemate, metu, ira, gaudio, libidine  
S. sp. 14.

Tremor typhodes, S. sp. 19.

## 2. Species paraliticæ.

Tremor paralytodes, S. sp. 11.

Tremor vertiginosus, S. sp. 7.

Tremor a plethora, S. sp. 13.

Tremor a saburra, S. sp. 12.

Tremor a hydrocephalo, S. sp. 8.

Tremor scorbuticus, S. sp. 10.

Tremor rheumatismalis, S. sp. 18.

Tremor temulentus, S. sp. 3.

Tremor metallurgorum, S. sp. 5.

Tremor traumaticus, S. sp. 17.

## 3. Species convulsivæ.

Tremor coactus, S. sp. 6.

Tremor tendinum, S. sp. 9.

Tremor palpitans, S. sp. 16.

## O. II. ADYNAMIÆ.

Motus involuntarii, five vitales five naturales,  
imminuti.

Adynamia, V. Cl. VI.

Defectivi, L. Cl. VI. O. I.

Leipopsychia, S. Cl. VI. O. IV. Sag. Cl. IX. O.  
IV.

## G. XLIV. SYNCOPÆ.

Motus cordis imminutus, vel aliquandiu quies-  
cens.Syncope, S. G. 174. S. 94. V. 274. Sag. 280. Junck.  
119.

Lei-

Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273. Sag. 279.  
 Asphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275. Sag. 281.  
 Virium lapsus & animi deliquia, Hoffm. III. 267.

## I. Idiopathica.

1. Synope ( *cardiaca* ) sine causa manifesta sæpe rediens, cum palpitatione cordis vehementi in intervallis: *Ex vitio cordis vel vasorum vicinorum.*

Syncope plethorica, S. sp. 5. Senac, Tr. de coeur, p. 540.

Syncope a cordiogmo, S. sp. 7. Senac, de coeur, 414. Morgagn. de sed XXV. 2. 3. 10.

Syncope a polypo, S. sp. 8. Senac, p. 471.

Syncope ab hydrocardia, S. sp. 12. Senac, 533. Schreiber Almag. I. III. §. 196.

Syncope Lanzoni, S. sp. 18. Lanzan. Op. II. pag. 462.

Asphyxia Valsalviana, S. sp. 13.

2. Syncope ( *occasionalis* ) a causa manifesta oriens: *Ex affectione totius systematis.*

Leipothymia a pathemate, S. sp. 1. Senac, pag. 544.

Syncope pathetica, S. sp. 21.

Asphyxiæ a pathemate, S. sp. 7.

Syncope ab antipathia, S. sp. 9. Senac, p. 554.

Syncope a veneno, S. sp. 10. Senac, p. 546.

Syncope ab apostematis, S. sp. 11. Senac, pag. 554.

Syncope a sphacelo, S. sp. 14. Senac, p. 553.

Syncope ab inanitione, S. sp. 1. Senac, p. 536.

Syncope a phlebotomia, S. sp. 4.

Syncope a dolore, S. sp. 2. Senac, p. 543.

Asphyxia traumatica, S. sp. 14.

Asphyxia neophytorum, S. sp. 17.

II. Symptomaticæ, sive symptomata morborum vel totius systematis, vel aliarum præter cor partium.

Syncope febrilis, S. sp. 3. Senac, p. 548.

Syn-

Syncope febricola, S. sp. 17. *Torti Terap. spec.* L. III. cap. 1.

Syncope exanthematica, S. sp. 19.

Syncope metastatica, S. sp. 20.

Leipothymia stomachica, S. sp. 2.

Syncope stomachica, S. sp. 13. *Senac*, p. 545.

Syncope hysterica, S. sp. 6. *Senac*, p. 547.

Syncope arthritica, S. sp. 16. *Musgrave de arthr. anomala*, cap. 8.

Syncope scorbutica, S. sp. 15. *Lind. Dreat. on scurvey*.

P. II. chap. 11. *Senac*, p. 552.

## G. XLV. DYSPEPSIA.

Anorexia, nausea, vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, pauciora saltem vel plura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium morbo.

Dyspepsia, V. 377. *Lond. Med. Obs.* VI. 11.

Apepsia, V. 276.

Diaphora, V. 278.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. *Sag. G.* 268.

Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157. *Sag. G.* 160.

Gastrodynia, S. G. 203. *Sag. G.* 161.

Soda, L. 47. V. 161.

Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159. *Sag. G.* 185.

Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214. *Sag. G.* 186.

Flatulentia, S. G. 271. L. 165. V. 127. *Sag. G.* 207.

### I. Idiopathica.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Anorexia a saburra, S. sp. 9.

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia paralytica, S. sp. 1.

Nausea ex cacochylia, S. sp. 11.

Vomitus pituitosus, S. sp. 26.

Vomitus ruminatio, S. sp. 6.



- Vomitus a saburra, S. sp. 2.  
 Vomitus a crapula, S. sp. 1.  
 Vomitus lacteus, S. sp. 3.  
 Flatulentia infantilis, S. sp. 5.  
 Flatulentia acidā, S. sp. 1.  
 Flatulentia nidorosa, S. sp. 2.  
 Cardialgia bradypeptā, S. sp. 9.  
 Cardialgia a saburra, S. sp. 2.  
 Cardialgia lactantium, S. sp. 11.  
 Cardialgia flatulenta, S. sp. 3.  
 Cardialgia paralytica, S. sp. 7.  
 Gastrodynia saburrālis, S. sp. 1.  
 Gastrodynia flatulenta, S. sp. 2.  
 Gastrodynia periodynia, S. sp. 7.  
 Gastrodynia astringens, S. sp. 9.  
 Gastrodynia atterens, S. sp. 10.  
 Gastrodynia a frigore, S. sp. 18.

## II. Symptomata,

### I. A morbo ipsius ventriculi.

- Cardialgia scirrhusa, S. sp. 6.  
 Vomitus a pyloro calloso, S. sp. 8.  
 Vomitus a steatomate ventriculi, S. sp. 11.  
 Nausea ab apostemate circa cardiam, S. sp. 9.  
 Gastrodynia ulcerosa, S. sp. 5.  
 Vomitus ab ulcere ventriculi, S. sp. 10.  
 Cardialgia a veneno, S. sp. 2.  
 Gastrodynia a veneno, S. sp. 4.  
 Vomitus a veneno, S. sp. 7.  
 Flatulentia accidentalis, S. sp. 4.  
 Gastrodynia a peregrinis, S. sp. 11.  
 Anorexia biliosa, S. sp. 6.  
 Nausea biliosa, S. sp. 6.  
 Gastrodynia biliosa, S. sp. 3.  
 Vomitus urinosus, S. sp. 27.  
 Gastrodynia calculosa, S. sp. 8.  
 Vomitus bezoarticus, S. sp. 13.  
 Cardialgia verminosa, S. sp. 10.  
 Nausea a tænia, S. sp. 1.

- Vomitus verminosus, S. sp. 5.  
 Gastrodynia a xiphoide, S. sp. 12.  
 Gastrodynia Americana, S. sp. 6.  
 Nausea ex compresso ventriculo, S. sp. 5.  
 Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. sp. 21.  
 Vomitus ab oesophago obstructo, S. sp. 21.  
 Gastrodynia gastrocelica, S. sp. 20.  
 Nausea ex gastrocele, S. sp. 4.  
 Vomitus gastrocelicus, S. sp. 18.  
 Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.  
 Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13.  
 Nausea ex gastritide, S. G. 10.  
 Vomitus gastriticus, S. sp. 19.

## 2. A Morbo aliarum partium vel totius corporis.

- Vomitus cephalalgicus, S. sp. 13.  
 Vomitus a dentitione, S. sp. 4.  
 Vomitus iliacus, S. sp. 24.  
 Nausea ex pancreatis scirrhus, S. sp. 3.  
 Vomitus a pancreate, S. sp. 17.  
 Vomitus ab hepate obstructo, S. sp. 16.  
 Anorexia melancholica, S. sp. 5.  
 Gastrodynia hypochondriaca, S. sp. 16.  
 Flatulentia hypochondriaca, S. sp. 3.  
 Flatulentia convulsiva, S. sp. 7.  
 Vomitus hypochondriacus, S. sp. 6.  
 Vomitus atrabiliaris, S. sp. 15.  
 Anorexia mirabilis, S. sp. 10.  
 Gastrodynia hysterica, S. sp. 14.  
 Gastrodynia pulsatilis, S. sp. 13.  
 Gastrodynia chlorotica, S. sp. 15.  
 Nausea a semine corrupto, S. sp. 8.  
 Nausea gravidarum, S. sp. 2.  
 Vomitus gravidarum, S. sp. 13.  
 Flatulentia lochialis, S. sp. 6.  
 Anorexia arthritica, S. sp. 12.  
 Cardialgia arthritica, S. sp. 8.  
 Nausea nephritica, S. sp. 7.  
 Vomitus nephriticus, S. sp. 20.

*Aronexia Stewartiana*, S. sp. 13.

*Cardialgia a cardiogmo*, S. sp. 12.

*Anorexia plethorica*, S. sp. 3.

*Anorexia cachectarum*, S. sp. 7.

*Anorexia febrilis*, S. sp. 4.

*Cardialgia febricosa*, S. sp. 4.

*Gastrodynia febricosa*, S. sp. 17.

*Vomitus febricosus*, S. sp. 29.

*Vomitus rabiosus*, S. sp. 14.

*Vomitus hæmorrhagicus*, S. sp. 28.

*Gastrodynia metastatica*, S. sp. 19.

*Nausea marina*, S. sp. 12.

*Vomitus marinus*, S. sp. 25.

*Anorexia neophytorum*, S. sp. 11.

## G. XLVI. HYPOCHONDRIASIS.

*Dyspepsia cum languore, moestitia, & metu*,  
ex causis non æquis, in temperamento me-  
lancholico.

*Hypochondriasis*, S. G. 220. L. 76. V. 218. *Sag.*  
332.

*Morbus hypochondriacus*, *Boerb.* 1098.

*Malum hypochondriacum*, *Hoffm.* III. 64. *Junck.*  
36.

*Speciem idiopathicam unicam tantum novi.*

*Hypochondriasis melancholica*, S. sp. 3.

*De Hypochondriasi algida*, S. sp. 10. mihi  
non liquet.

*Species sequentes ex FRÆCASSINO, ex theoria*  
*parum certa consistæ mihi videntur.*

*Hypochondriasis biliosa*, S. sp. 1.

*Hypochondriasis sanguinea*, S. sp. 2.

*Hypochondriasis pituitosa*, S. sp. 4.

*Symptomaticæ sunt.*

*Hypochondriasis hysterica*, S. sp. 5.

*Hypochondriasis phthifica*, S. sp. 6.

*Hypochondriasis asthmatica*, S. sp. 7.

Hypo-

Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.

Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

G. XLVII. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentæ desiderium ;  
cutis pallor vel decoloratio ; venæ minus  
plenæ, corporis tumor mollis ; asthenia ;  
palpitatio, menstruorum \* retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 405. Sag. G. 135.

Boerb. 1285. Hoffm. III. 311. Junck. 86.

Chloroseos unicam speciem veram agnoscimus ;  
scilicet,

Chlorosis virginea, S. sp. 1.

a. Chlorosis amatoria.

Cæteræ SAUVAGESII species spuria, five deco-  
lorationes, symptomaticæ sunt.

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.

Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlorosis infantum, S. sp. 4.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.

Chlorosis viridis, S. sp. 6.

Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.

Chlorosis maculosa, S. sp. 8.

Chlorosis Carthagenica, S. sp. 10.

Chlorosis Bengualensis, S. sp. 11.

Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.

O. III.

\* In hoc caractere antea dixi menstruorum sæpe re-  
tentio ; quasi species chlorosis esset, in qua menses rite  
fluxerunt, & cogitavi de specie quadam cachexiæ huc re-  
ferenda. Sed nunc dubito an species cachexiæ quævis sub  
titulo Chlorosis, vel sub caractere hic dato, recte poni  
possit ; & nullam chlorosis speciem veram, præter illam  
quæ retentionem menstruorum comitatur, agnoscere vel-  
lem. Hinc vocabulum sæpe in caractere nunc omis-  
sum est ; sed simul fateri cogor, chlorosin ideo hic minus re-  
cte pro genere recensitam esse, cum pro symptomate a-  
menorrhoeæ semper haberi possit.



O. III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus  
abnormes. \*

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. V. *Sag.* Cl. VII.

Motorii, L. Cl. VII.

Morbi spasmodici & convulsivi, *Hoffm.* III. 9.

Spasmi & convulsiones, *Junc.* 45 54.

Epilepsia, *Boerh.* 1071. 1088.

SECT. I. In functionibus animalibus.

G. XLVIII. TETANUS.

Plurium musculorum rigiditas spastica.

Variat gradu.

I. Tetanus.

Dimidium vel totum corpus spasmis affe-  
ctum.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180. *Sag.* G. 228.

Catochus \*, S. G. 123. L. 128. V. 183. *Sag.* G.  
229.

Opisthotonos, V. 181.

Opisthotonos, V. 182.

Hujus species, ut solet, plures recensuit SAU-  
VA-

\* Morus abnormes sunt qui ex causa præternaturali oriuntur, & qui violentia, frequentia, vel diuturnitate contractionis præter modum fiunt; & nullus dubito quin hujusmodi motus, in morbis omnibus sub hoc ordine a nobis collocatis, revera fiunt; plures licet morbi sint, quam sub eodem ordine ab aliis nosologis recensiti fuerunt.

\* Catochus apud SAUVAGESIUM genus est minime naturale, cum genus illud conjunxerit species natura prorsus diversas; ideoque ejusmodi genus omisi, sed species sub eo recensitas, quæ a rigiditate spastica pendeant, ad tetani genus huc retuli.

**VAGESIUS**; sed omnes, quæ idiopathice dici queunt, ad unam, ni fallor, referri possunt, & ejus forma præcipua apud **SAUVAGESIUM** appellatur,

Tetanus Indicus, S. sp. 5. de quo plura haberi possunt apud *Hillary*, Barbadoes, p. 219. *Chalmers*, Lond. Med. Obs. Vol. I. Art. 12. De *Monro* Edinb. Phys. & Liter. Essays, Vol. III. Art. 30. *A. Monro*, Art. 31. & sub nomine spasmi apud *Bontium* de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Nec alius morbus est,

Convulsio Indica, S. sp. 9.

Variat autem Tetanus ratione causæ remotæ, quatenus nimirum vel a causa interna, vel a frigore, vel a vulnere oriatur. A vulnere, varietas frequentissima apud **SAUVAGESIUM** appellatur.

Tetanus traumaticus, S. sp. 11.

Variat etiam quavis causa ortus Tetanus ratione partis corporis affectæ; hinc

Tetanus tonicus, S. sp. 1.

Tetanus holotonicus. S. sp. 4.

Catochus holotonicus, S. sp. 1. *M. Febr.* in *Ephem. German.* D. II. A. I. Obs. 1.

Catochus cervinus, S. sp. 2. *Stork.* Ann. Méd. 1758. *M. Julio*.

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.

Tetani species symptomaticæ sunt,

Tetanus febricofus, S. sp. 10. *Stork.* Ann. Medic. 759. p. 166.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Te

# CULLENI. CL. I.

129

Tetanus lateralis\*, S. sp. 6. Morgagn. de caus. & sed. X. 2. & 3.

Pleurosthotonos Strack.

Tetanus syphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminosus, S. sp. 8.

Tetanus hystericus, S. sp. 12.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus diurnus, S. sp. 6.

G. XLIX,

TRISMUS.

Præcipue maxillæ inferioris Spastica rigiditas.

Trismus, S. G. 117. L. 124. Sag. G. 223.

Capistrum, V. 208.

I. Species veræ sunt,

I. Trismus (*nascentium*) infantes intra duas primas a nativitate septimanas corripiciens.

Trismus nascentium, S. sp. 1. Gallis Americanis mal de machoire. Heister. Com. med. pract. cap. XV.

§. 10. Clegorn's Minorca, Introd. p. 33. Hofer. in Act. Helvet. tom. I. p. 65. Macb. p. 459.

2. Trismus (*traumaticus*) omnium ætatum, a vulnere vel frigore.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. Lond. Med. Obs. Vol.

I. Art. I. 7, Vol. II. & 34. Vol. III. 31. Vol. IV.

7. VI. 13. Med. Transf. II. 4.

Angina spasmodica, S. sp. 18. Zwingeri act. Helvet, tom. III. p. 319.

Convulsio a nervi punctura, S. sp. 2.

Tom. II.

I.

Tri-

\* In exemplo Tetani lateralis quod profert SAUVAGESIUS, adfuit in eodem ægro alterius lateris paralyfis; ideoque hic mox post Tetanum hemiplegicum posui; sed si Tetani lateralis exemplum a MORGAGNIO allatum, sine alterius lateris paralyfi fuit, de quo tamen mihi non constat, idem inter varietates idiopathicas recenseri potuisset. Interim, donec hæc res certius determinaretur, post Tetanum lateralem posui Pseurosthoton Strakii.

Trismus catarrhalis, S. sp. 15. *Hillary's Barbadoes*,  
221. Lond. Med. Obs. Vol. IV. 7.

II. Sequentes apud SAUVAGESIUM Trismi species, spurias, vel falsas dicimus; vel quod non a spasmo, sed ab alio musculorum vitio pendeant, vel quod convulsivæ potius quam spasmodicæ sint, vel denique, quod faciei potius quam maxillæ inferioris, musculorum affectiones sint.

Trismus inflammatorius, S. sp. 3.

Trismus scorbuticus, S. sp. 4.

Trismus capistratus, S. sp. 11.

Trismus arthriticus, S. sp. 9.

Trismus verminosus, S. sp. 5.

Trismus hypochondriacus, S. sp. 8.

Trismus febrilis, S. sp. 10.

Trismus crepitans, S. sp. 7.

Trismus occipitalis, S. sp. 12.

Trismus maxillaris, S. sp. 23.

Trismus dolorificus, S. sp. 14.

Trismus cynicus, S. sp. 16.

Trismus cynogelos, S. sp. 17.

Trismus sardonicus, S. sp. 18.

Trismus diastrophe, S. sp. 19.

## G. L. CONVULSIO.

Musculorum contractio clonica, abnormis, citra soporem.

Convulsio, S. G. 128. L. 142. V. 191. *Sag. G.* 235.

### I. Idiopathicæ.

Convulsio universalis, S. sp. 11.

Hieranosos, L. 144. V. 190.

Convulsio habitualis, S. sp. 12.

Convulsio intermittens, S. sp. 16.

Convulsio hemitonus, S. sp. 15.

Convulsio abdominis, S. sp. 10.

Convulsio ab inanitione, S. sp. 1.

Convulsio ab inanismo, S. sp. 13.



Scelotyrbe festinans, S. sp. 2.

## II. Symptomaticæ

Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4.

Convulsio nephralgica, S. sp. 6.

Convulsio gravidarum, S. sp. 14.

Scelotyrbe verminosa, S. sp. 5.

Convulsio febrilis, S. sp. 3.

G. LI.

CHOREA.\*

Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum & decimum quartum ætatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiorum & manuum motu, histrionum gesticulationes referentes; in gressu, pedem alterum sæpius trahentes quam attollentes.

Scelotyrbe, S. G. 136. Sag. G. 243.

Chorea, L. 139.

Speciem unam tantum videre mihi contigit, quæ apud SAUVAGESIUM audit.

Scelotyrbe chorea Viti, S. sp. 1.

Chorea St. Viti Sydenham. Sched. monitoria.

Nec alia est

Scelotyrbe instabilis, S. sp. 3. & fortassis

Scelotyrbe intermittens, S. sp. 4.

Hieronosis Macb. 358.

I 2

G. LII.

---

\* In priore hujus libri editione, Choream pro convulsionis specie habui; cum autem ratione ætatis quam adoritur, tum motuum quos exhibet, a quavis alia convulsionis specie plurimum differat, hic pro genere diverso posui.

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, peridico.

Raphania, L. 145. V. 193 Linn. Amoen. acad. Vol. VI.

Convulsiva raphania, S. sp. 7.

Germanis DER KRIEBEL KRANKHEIT.

Eclampsia typhodes, S. sp. 1. Sennert. de febr. L. IV. cap. 16. Gregor. Horst. oper. tom. II. L. VIII. Obs. 22. Willis de Morb. convuls. Muller apud Haller, disp. tom. I. Walfschmied apud Haller, disp. tom. VII. Wedel, ibid. Hoffm. tom. I. 231. Kannigieser, A. N. C. tom. VII. Brunner in Ephem. Germ. D. III. A. II. obs. 224. Willisch. ibid. Cent. VII. obs. 13. Wepfer de affect. cap. obs. 120. Breslauver Sammlung 1717. Julio, Septembri, & Decembri. Ibid. 1723. Januar. A. N. C. Vol. VII. Obs. 41. Bruckmann. Comm. Norim. 1743. pag. 50. Soc. Royale, I. Mem. p. 303. II. Mem. pag. 587. Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

An Convulsio Soloniensis vel Necrosis ustilaginea sit idem morbus?

Vide Salerne in Memoires presentés a l'acad. des sciences, tom. II.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. Sag. G. 24. Boerb. 1771. Hoffm. III. 9. Junck. 54. Lond. Med. Obs. VI. 9.

Eclampsia \*, S. G. 133. V. 189. Sag. G. 240.

Spe-

---

\* Eclampsiam quasi morbum acutum, ab epilepsia, quam pro chronico habent, distinguere, & pro diverso genere ponere, voluerunt SAUVAGESIUS & VOGELIUS,

Species idiopathicae sunt ,

1. Epilepsia (*cerebralis*) sine causa manifesta subito adoriens ; prægressa nulla sensatione molesta, nisi fortassis vertiginis vel Scotomiae alicujus.

Epilepsia plethorica, S. sp. 1.

Eclampsia plethorica, S. sp. 7.

Epilepsia cachectica\*\*, S. sp. 2.

Epilepsia a terróre, Macb. p. 556.

2. Epilepsia (*sympatica*) sine causa manifesta, sed prægressa sensatione autæ cujusdam a parte corporis quadam versus caput assurgentis.

Epilepsia sympathica, S. sp. 8.

Epilepsia pedisympomatica, S. sp. 6.

3. Epilepsia (*occasionalis*) ab irritatione manifesta oriens, & ablata irritatione cessans. Variat pro diversitate irritamenti, & hinc Ab injuria capiti illata.

I 3

Epi-

LIUS ; sed, cum inter morbos acutos & chronicos limites accuratos ponere ubique difficile sit, & cum eclampsia SAUVAGESII tum causis tum phænomenis plerumque cum epilepsia exacte congruat, illam genere ab epilepsia diversam esse nequaquam habere possum. Ejusmodi genus prorsus omisit LINNÆUS, & quæ plura ad eclampsiam ab epilepsia distinguendam protulit SAGARUS, speciem tantum non genus distinguere possunt.

\*\* Epilepsia, apud SAUVAGESIUM *cachetica* dicta, revera duarum specierum esse videtur. Primo enim hanc *cacheticam* cum *serosa* HOFFMANNI & PISONIS eandem esse auctor statuit, deinceps, utpote acriter pulso orta, eadem esse cum specie sua undecima, nimirum *exanthematica*, statui potest. Hinc est quod epilepsiam cacheticam utroque loco posui, sed dubius, & aliis dijudicandus relinquens.

Epilepsia traumatica, S. sp. 13.

Eclampsia traumatica, S. sp. 9.

### **A dolore.**

Epilepsia a dolore, S. sp. 10. Ed. Ess. V: 61.

Epilepsia rachialgica, S. sp. 14.

Eclampsia a doloribus, S. sp. 4.

a. Rachialgica.

b. Ab otalgia.

c. A dentitione.

Eclampsia parturientium, S. sp. 3.

### **A vermibus.**

Eclampsia verminosa, S. sp. 2.

### **A veneno.**

Eclampsia ab atropa, S. sp. 11.

Eclampsia ab oenanthe, S. sp. 12.

Eclampsia a cicuta, S. sp. 13.

Eclampsia a coriaria, S. sp. 14.

### **A scabie, vel alia acris humoris effusione, retropulsa.**

Epilepsia exanthematica, S. sp. 11.

Epilepsia cachectica, S. sp. 2.

### **A cruditate ventriculi.**

Epilepsia stomachica, S. sp. 3.

Eclampsia a saburra, S. sp. 5.

### **A pathemate mentis.**

Epilepsia a pathemate, S. sp. 7.

### **Ab hæmorrhagia nimia.**

Eclampsia ab inanitione, S. sp. 8.

### **A debilitate.**

Eclampsia neophytorum, S. sp. 15.

### **Epilepsiæ symptomaticæ sunt.**

Epilepsia febricosa, S. sp. 9.

Eclampsia febricosa, S. sp. 17.

Eclam-



Eclampsia exanthematica, S. sp. 16.

Epilepsia uterina, S. sp. 4.

Epilepsia syphilitica, S. sp. 12.

Eclampsia ab hydrocephalo, S. sp. 16.

Eclampsia ab ischuria, S. sp. 6.

## SECT. II. In functionibus vitalibus.

### A. In actione cordis.

#### G. LIV. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. Sag. 257.

Hoffm. III. 83. Junck. 33. Mach. 569.

Si palpitationis causæ variæ externis signis dignosci possent, plures ejus species cum SAUVAGESIO pro diversitate causæ statuere potuissimus; sed causæ diversæ nullo modo, quantum novimus, distingui queunt; non nisi speciem unicam idiopathicam statuere possum, & quam caractere sequenti insigniri vellem.

Palpitatio ( *cardiaca* ) fere constans, saltem sæpe rediens, sine alio morbo evidente.

Pro synonymis sequentes SAUVAGESII species recensere placet.

Palpitatio ab aneurysmate cordis, S. sp. 1. Senac, Mal. de coeur. p. 284. Lancisi de aneurysm.

Palpitatio tremula, S. sp. 4. Senac de coeur, p. 504.

Palpitatio apostematosa, S. sp. 7. Lancisi de aneurysmate, lib. 1. prop. 5. Senac de coeur, 485.

Palpitatio a corde ossificato, S. sp. 2. Senac. de coeur, pag. 484. Morgagn. de Sed. Ep. [XXIV.

17.

Palpitatio calculosa, S. sp. 3.

Palpitatio a polypo, S. sp. 5. Senac de coeur. lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polyposa, S. sp. 6.

Palpitatio ex aortæ aneurysmate, S. sp. 8.

Palpitatio ex aortæ angustia, S. sp. 9. *Lancisi* de aneurysm. prop. 53. *Senac*, 484.

Palpitationis species symptomaticæ sunt,

B. In actione pulmonum,

Palpitatio a pancreate, S. sp. 10. *Storck*. Ann. med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. sp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. sp. 12.

Palpitatio hysterica, S. sp. 13.

Palpitatio melancholica, S. sp. 14. *Lancisi* de aneurysm. prop. 44.

Palpitatio febricosa, S. sp. 15. *Storck*, Ann. med. I. p. 75.

B. In actione pulmonum.

G. LV.

A S T H M A.

Spirandi difficultas per intervalla subiens; cum angustia in pectore sensu, & respiratione cum sibilo strepente; tussis sub initio paroxysmi difficilis, vel nulla, versus finem libera, cum sputo mucis sæpe copioso.

Asthma, S. G. 145. L. 161. V. 268. *Sag.* G. 252.

Asthma convulsivum & spasmodico flatulentum, *Hoffm.* III. 94.

Asthma spasticum, *Junck.* tab. 51.

Species idiopathicae sunt,

1. Asthma (*Spontaneum*) sine causa manifesta, vel alio morbo comitante.

Asthma humidum, S. sp. 1. flatulentum, *Floyer* on the asthma, chap. 1.

Asthma convulsivum, S. sp. 2. *Willis*, Pharm. rat. p. 2. Sect. 1. cap. 12. Med. Tr. I. 7.

Asthma hystericum, S. sp. 3. *Floyer* on the asthma, chap. 1.

Asthma stomachicum, S. sp. 8. *Floyer*, Scheme of the

the species of asthma. Periodic asthma, 6.

Orthopnoea spasmodica, S. sp. 3.

Orthopnoea hysterica, S. sp. 4.

2. Asthma ( *exanthematicum* ) a scabiei vel alia  
acris effusione retropulsa.

Asthma exanthematicum, S. sp. 11.

Asthma cachecticum, S. sp. 13.

3. Asthma ( *plethoricum* ) a suppressa evacuatio-  
ne sanguinis antea solita vel a plethora spon-  
tanea.

Asthma plethoricum, S. sp. 14.

Species asthmatis symptomaticæ sunt;

Asthma hypochondriacum, S. sp. 4.

Asthma arthriticum, S. sp. 5.

Asthma venereum, S. sp. 14. *Junc.* tab. 32.

G. LVI. D Y S P N O E A.

Spirandi difficultas perpetua, sine angustia, &  
potius cum repletionis & infarctus in pe-  
ctore sensu. Tussis per totum morbi decur-  
sum frequens.

Dyspnoea S. G. 144. L. 160. V. 267. *Sag.* 251.  
*Junc.* 32.

Orthopnoea S. G. 146. L. 162. V. 269. *Sag.* G.  
153. M. 574.

Species idiopathicae sunt,

1. Dyspnoea ( *catarrhalis* ) cum tussi frequen-  
te, mucum viscidum copiosum ejiciente.

Asthma catarrhale, S. sp. 16.

Asthma pneumonicum, *Villis*, Pharm. rat. P. II.  
sect. v. cap. 12.

Asthma pituitosum, *Hoffm.* III. sect. II. cap. II.  
§. 3.

Asthma pneumodes, S. sp. 17. Ed. Ess. III. 25.

2. Dys-

2. Dyspnoea ( *sicca* ) cum tussi plerumque sicca.

Hujus causæ variæ haud facile dignoscendæ sunt ; sequentes autem SAUVAGESII species huc referri possunt.

Dyspnoea a tuberculis, S. sp. 2.

Dyspnoea a steatomatis, S. sp. 5.

Orthopnoea a lipomate, S. sp. 18.

Dyspnoea a hydatidibus, S. sp. 4.

Dyspnoea polyposa, S. sp. 20.

3. Dyspnoea ( *aerea* ) a minima quavis tempestatum mutatione aucta.

Dyspnoea a pneumatia, S. sp. 12.

4. Dyspnoea ( *terrea* ) cum tussi materiem terream vel calculosam ejiciente.

Dyspnoea calculosa, M. 574.

5. Dyspnoea ( *aquosa* ) cum urina parca & oedemate pedum, sine fluctuatione in pectore, vel aliis characteristicis hydrothoracis signis.

Dyspnoea pituitosa, S. sp. 1.

Orthopnoea ab hydropneumonia, S. sp. 12.

6. Dyspnoea ( *pinguedinosa* ) in hominibus valde obesis.

Orthopnoea a pinguedine, S. sp. 6.

7. Dyspnoea ( *thoracica* ) a partibus thoracem cingentibus læsis, vel male conformatis,

Dyspnoea traumatica, S. sp. 15.

Orthopnoea traumatica, S. sp. 14.

Dyspnoea Galenica, S. sp. 16.

Dyspnoea rachitica, S. sp. 10.

Asthma a gibbo, S. sp. 9.

8. Dyf-



### 8. Dyspnoea ( *extrinseca* ) a causis externis manifestis ,

Asthma pulverulentorum, S. sp. 7.

Asthma metallicum, S. sp. 12.

Orthopnoea a vaporibus, S. sp. 16.

Orthopnoea a deglutitis, S. sp. 9.

Orthopnoea a fungis, S. sp. 25.

Orthopnoea ab antipathia, S. sp. 15.

Orthopnoea a bronchocele, S. sp. 10.

### Dyspnoeæ species symptomaticæ sunt symptomata,

#### 1. Morborum cordis, vel vasorum majorum.

Dyspnoea a corde, S. sp. 11.

Asthma a polypo cordis, S. sp. 6.

Orthopnoea polypola, S. sp. 26.

Orthopnoea cardiaca, S. sp. 2.

Dyspnoea ab aortæ angustia, S. sp. 22.

#### 2. Tumoris abdominalis.

Dyspnoea a physconia, S. sp. 7.

Dyspnoea a graviditate, S. sp. 8.

Dyspnoea tympanitica, S. sp. 9.

Dyspnoea a liene, S. sp. 14.

Dyspnoea a stomacho, S. sp. 13.

Dyspnoea a gastrocele, S. sp. 17.

Orthopnoea a gastrocele, S. sp. 11.

#### 3. Variorum morborum.

Asthma febricosum, S. sp. 18.

Orthopnoea febricola, S. sp. 20.

Orthopnoea peripneumonica, S. sp. 1.

Orthopnoea pseudo-peripneumonica, S. sp. 21.

Orthopnoea variolosa, S. sp. 24.

Dyspnoea scorbutica, S. sp. 18.

Orthopnoea scorbutica, S. sp. 22.

Orthopnoea a hydrothorace, S. sp. 5.

Orthopnoea ab empyemate, S. sp. 13.

Orthopnoea a vomica, S. sp. 7.

Dyspnoea a vomica, S. sp. 6.

Or-

Orthopnoea a hydrocephalo, S. sp. 23.

Orthopnoea a vermibus, S. sp. 17.

### G. LVII. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, strans-  
gulans, cum inspiratione sonora, iterata;  
sæpe vomitus.

Pertussis *Sydenham.* Ed. Leid. p. 200. 311. 312.

*Huxham* de aere, ad ann. 1732. Lond. Med. Obs.

III. 28. 30. Soc. Royale III. Hist. pag. 268.

Tussis convulsiva, sive ferina, *Hoffm.* III. 111.

Tussis ferina, S. sp. 10. *Sag.* sp. 10.

Tussis convulsiva, S. sp. 11. *Sag.* sp. 11.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

### III. In functionibus naturalibus,

### G. LVIII. PYROSIS.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris  
aquei, plerumque insipidi, aliquando acris  
eructata.

Pyrosis, S. G. 200. *Sag.* G. 158.

Soda, L. 47. V. 154.

SCHOTIS, the WATER-BRASH.

Species unica vera,

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5. *Macb.* pag. 515.

Cæteræ SAUVAGESII species symptomaticæ  
sunt,

Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.

Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.

Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

### G. LIX. COLICA.

Dolor abdominis, præcipue circa umbilicum  
torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. L. 50. V. 160. Sag. G. 162. Junck.  
106.

Colica spasmodica & flatulenta, Hoffm. II. 284.  
Macb. p. 519.

Rachialgia, S. G. 211. Sag. G. 168.

Ileus, S. G. 252. V. 162. Sag. G. 187. Iliaca, L.  
185.

Dolor & spasmus iliacus, Hoffm. II. 263.

Passio iliaca, Junck. 107.

Species idiopathicae sunt,

1. Colica ( *spasmodica* ) cum retractione umbilici & spasmis musculorum abdominalium.

Colica spasmodica, S. sp. 7.

Colica flatulenta, S. sp. 1.

Ileus physodes, S. sp. 9.

Colica biliosa, S. sp. 5. \*. Edin. Med. Ess. III.

27.  
Colica pituitosa, S. sp. 2. \*\*.

Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.

Ileus Indicus, S. sp. 8.

Variat symptomatis superadditis; hinc

2. Colica cum vomitu stercoris, vel rerum per anum injectarum.

Ileus spasmodicus, S. sp. 3. \*\*\*. Lond. Med. Obs.

IV. 17. Edinb. Phys. Ess. II. 27. 28.

Ileus

---

\* Cum vomitus quivis vehemens & saepe repetitus bilem plerumque eliciat, *colicam* quam, ex vomitu bilis solo, *biliosam* appellarunt medici, omnino *spasmodicam* esse cenfeo.

\*\* Pituita in parte quadam intestinorum congesta non nisi a spasmu obstruente fieri videtur; ideoque tum *colicam pituitosam*, tum *ileum a colo pituita infarcto*, hic apposui.

\*\*\* *Ileus* gradu tantum, nequaquam natura, a *colica* differre mihi videtur; ideoque *ileum* pro varietate *colicae* tantum hic recensui. Multi quidem medici *ileum*

Ileus volvulus, S. sp. 7.

b. Colica cum inflammatione superveniente.

Ileus inflammatorius, S. sp. 1.

Colica phlogistica, S. sp. 6.

2. Colica ( *pictonum* ) præeunte ponderis vel molestiæ in abdomine, præcipue circa umbilicum, sensu; accedente dolore colico, primum levi, non continuo, & præcipue post pastum aucto; tandem graviore & fere perpetuo; cum dolore brachiorum, & dorsi, in paralyfin demum abeunte.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1. \*

Colica pictonum *Citessii* & succedentium *Auctorum*.

Med. Trans. I. 12. 13. 14. 15. 20. Edinb. Phys.

Ess. lib. 22. *Calmer's* Carolina, p. 187.

Colica nervosa, *Macb.* p. 524.

Variat ratione causæ remotæ; & hinc

a. A veneno metallico.

Ra-

omnem inflammatorium esse putarunt. Dolorem autem abdominis, sive colicam, cum vomitu stercoris, sine inflammatione adesse, ipse aliquoties vidi. Sin autem inflammatio aliquando adsit, si eadem *colicæ* supervenerit, *colicam phlogisticam* dari recte monuit SAUVAGESIUS; nec ideo epigenomeno genus mutari; & si quidem cum dolore abdominis & vomitu ab initio adfuerit inflammatio, morbum pro *enteritide* habere vellem. Denique, quovis modo dari *ileum* genus a *colica* diversum concedere non possum.

\* *Rachialgia* a *colica* genere diversam esse nequaquam video. Symptomata enim *colicæ* essentialia in utroque morbo semper adsunt; & si forte alteri quædam superaddita sint, hæc speciem non genus diversum constituere possunt. Ut medici igitur nuperi fere omnes, ita ego quam *rachialgium* appellarunt ASTRUCIUS & SAUVAGESIUS, pro specie *colicæ* habui ac recensui.



Rachialgia metallica, S. sp. 3.

Colica pictorum *Tronchin*. Sp. sive a causa remota  
2da.

**b. Ab acidis ingestis.**

Rachialgia pictorum, S. sp. 1. *Tronchin*. sp. 3.

**c. A frigore.**

Rachialgia ab adiapneusti, *Tronchin*. sp. 5.

**d. A contusione dorsi.**

Rachialgia traumatica, S. sp. 7.

**3. Colica ( *stercorea* ) in hominibus alvi tarda, post diuturnam alvi obstipationem.**

Colica stercorea, S. sp. 3.

Ileus a fecibus induratis, S. sp. 2.

**4. Colica ( *accidentalis* ) a materie acri ingesta.**

Colica accidentalis, S. sp. 18.

Colica Japonica, S. sp. 10.

Colica lactentium, S. sp. 20.

Ileus a veneno, S. sp. 14.

Cholera sicca auriginosa a fungis venenatis, S. sp. 2.

**5. Colica ( *meconialis* ) neophytorum a meconio retento.**

Colica meconialis, S. sp. 19.

**6. Colica ( *callosa* ) cum sensu in quadam intestinorum parte stricture, & sæpe antecam collecti flatus cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim transiens evanescit, alvo tarda, & tandem non nisi faeces paucas liquidas egerente.**

Ileus a callosa coli stricture, S. sp. 11. *Edin. Med.*

*Ess. IV. 31.*

**7. Colica ( *calculosa* ) cum duritie in quadam**

par-

parte abdominis fixa; calculis quondam per anum dejectis.

Colica calculosa, S. sp. Edinb. Med. Ess. I. 32.  
Edinb. Phys. Ess. II. 26.

Ileus calculosus, S. sp. 10.

Colicæ symptomaticæ sunt.

Colica febricosa, S. sp. 21.

Rachialgia febricosa, S. sp. 2. *Tronchin.* sp. 5.

Colica hysterica, S. sp. 17.

Colica gravidarum, S. sp. 16.

Colica verminosa, S. sp. 4.

Ileus verminosus, S. sp. 13.

Colica Lapponica, S. sp. 9.

Rachialgia arthritica, S. sp. 4. *Tronchin.* sp.

Rachialgia scorbutica, S. sp. 6.

Ileus herniosus, S. sp. 6.

Colica enterocelica, S. sp. 22.

Ileus ab intestino compresso, S. sp. 4.

Colica serhirosa, S. sp. 12.

Colica pancreatica, S. sp. 13.

Colica mesenterica, S. sp. 11.

Rachialgia ab osteofarcoli, S. sp. 8.

Colica plethorica, S. sp. 8.

a. Hæmorrhoidalis.

b. Catamenialis.

Colica pulsatilis, S. sp. 14.

Ileus imperforatorum, S. sp. 12.

## G. LX. CHOLERA.

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul dejectionis frequens; anxietas; tormina; furarum spasmodica.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. *Sag.* G. 188. *Hofm.* II. 165.

Diarrhœa cholica, *Junc.* 112.

Species idiopathicæ sunt,

1. Cholera ( *spontanea* ) tempestate calida, sine causa manifesta oboriens.

Cho-

Cholera spontanea, S. sp. 1. Sydenh. sect. IV. cap.

2. Cleghorn's Diseases of Minorca.

Cholera Indica, S. sp. 7.

2. Cholera ( *accidentalis* ) a rebus acribus ingestis.

Cholera crapulosa, S. sp. 11.

Cholera a venenis fossilibus, S. sp. 4.

Cholera a veneno animali, S. sp. 5.

Cholera symptomatica sunt,

Cholera intermittens, S. sp. 6.

Cholera inflammatoria, S. sp. 8.

Cholera arthritica, S. sp. 10.

Cholera verminosa, S. sp. 9.

G. LXI. DIARRHŒA.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhœa, S. G. 253. L. 187. V. 105. Sag. G. 189. Junck. 112.

Hepatirrhœa, S. G. 246.

Cholerica, L. 190.

Cœliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109. Sag. G. 199.

Lienteria, S. G. 256. 188. v. 108. Sag. G. 191.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhœis, V. 112.

Lambisma ventris fluxus multiplex. Amist. 1756.

Species idiopathicae sunt,

1. Diarrhœa ( *crapulosa* ) qua stercora naturalibus liquidiora & majori copia dejiciuntur.

Diarrhœa stercorosa, S. sp. 1.

Diarrhœa vulgaris, S. sp. 2.

2. Diarrhœa ( *biliosa* ) qua faeces flavæ magna copia dejiciuntur.

Diarrhœa biliosa, S. sp. 8.

3. Diarrhœa ( *mucosa* ) qua vel ab acribus ingestis, vel a frigore, præcipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.

Diarrhœa, S. sp. 19.

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Diarrhœa ab hypercatharsi, S. sp. 16.

Dysenteria cathartica, S. sp. 12.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhœis, V. 112.

Diarrhœa pituitosa, S. sp. 4.

Cœliaca mucosa, S. sp. 3.

Diarrhœa serosa, S. sp. 10.

a. Diarrhœa urinosa.

4. Diarrhœa ( *cœliaca* ) qua humor lacteus specie chyli dejicitur.

Cœliaca chylosa, S. sp. 1.

Cœliaca lactea, S. sp. 4.

5. Diarrhœa ( *lienteria* ) qua ingesta parum mutata celeriter dejiciuntur.

Lienteria spontanea, S. sp. 2.

6. Diarrhœa ( *hepatirrhœa* ) qua materies seroso-cruenta sine dolore dejicitur.

Hæpatirrhœa intestinalis, S. sp. 2.

## II. Symptomaticæ.

Diarrhœa febrilis, S. sp. 3.

Diarrhœa febricola, S. sp. 20.

Hepatirrhœa intermittens, S. sp. 7.

Diarrhœa variolosa, S. sp. 6.

Diarrhœa pleuriticorum, S. sp. 21.

Diarrhœa arthritica, S. sp. 9.

Diarrhœa colliquativa, S. sp. 13.

Diarrhœa choleriodes, S. sp. 17.

Hepatirrhœa vera, S. sp. 1.

Hepatirrhœa a vulnere, S. sp. 3.

Hepatirrhœa mesenterica, S. sp. 4.

Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.

Diarrhœa



- Diarrhœa purulenta, S. sp. 11.  
 Cœliaca purulenta, S. sp. 2.  
 Hepatirrhœa scorbutica, S. sp. 5.  
 Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.  
 Lienteria scorbutica, S. sp. 3.  
 Lienteria ex ulcere ventriculi, S. sp. 1.  
 Lienteria aphthosa, S. sp. 4.  
 Lienteria secundaria, S. sp. 5.  
 Diarrhœa verminosa, S. sp. 14.  
 Diarrhœa a dentitione, S. sp. 15.  
 Diarrhœa chilensis, S. sp. 12.  
 Diarrhœa acrasia, S. sp. 7.

## G. LXII. D I A B E T E S.

Urinæ plerumque præternaturalis, copia immodica, profusio chronica.

Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. *Sag.* G. 199.  
*Junck.* 99. *Dobson*, Lond. Med. Observations,  
 Vol. V. Art. 27. *Home's* Clinical Experiments,  
 sect. xvi.

Diuresis, V. 114.

Species idiopathicae sunt,

I. Diabetes ( *mellitus* ) cum urinæ odoris, coloris, & saporis mellei.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead.* on poisons.  
 Essay 1. *Ejusdem* Monita Med. Cap. IX. sect. 2.  
 Lond. Med. Obs. III. 26. *Dobson*, in Lond. Obs.  
 Vol. V. Art. 27. *Myers*, Diss. inaug. de Diabete,  
 Edinb. 1779.

Diabetes febricosus, S. sp. 7. *Sydenh.* Epist. resp.  
 ad R. *Brady* \*.

K 2

II.

\* Quæri potest, an diabetes febricosus SYDENHAMI  
 ad diabetem mellitum, non ad insipidum referri debeat?  
 Et simul quæri potest, an urinæ in diabete hysterico vel  
 arthritico sit mellita; an insipida; cum SYDENHAMUS  
 ipse nullibi de sapore urinæ; in diabete quovis,  
 quicquid dixerit? Ad posterius respondere possum, quod,  
 ex propria observatione, novi, urinam in diabete hyste-

## II. Diabetes ( *insipidus* ) cum urina limpida non dulci. \*

*M. Lister* Exerc. medicin. II. de Diabete.

Diabetes legitimus, S. sp. 1. *Aretæus* de Morb. diuturn. L. II. cap. 2.

Diabetes ex vino, S. sp. 5. *Ephem. Germ.* D. I. A. II. Obs. 122.

Symptomata sunt;

Dia-

---

rico & arthritico nequaquam dulcem, & fere prorsus inspidam esse, & diabete febricosum SYDENHAMI ad diabete mellitum ideo retuli, quod in simili senis, post diuturnam febrem, diabete, urinam omnino dulcem inveni.

\* An hujusmodi diabetis species sit frequens, incertum est. In omnibus exemplis, iisque non paucis, quæ viderat VVILLISIUS, urinam mellitam semper invenit; & observationes nuperæ frequentes fere omnes ejusmodi urinam exhibuerunt; ita ut dubium sit, an alia diabetis idiopathica & permanentis species revera detur. Affirmat autem LISTERUS; & ego ipse inter plures mellitas unicam inspidam observavi. Ejusmodi itaque speciem dari concedo, ideoque recensui; sed, an recte legitima dici queat, vel an diabetes ARETÆI & plurium auctorum ejusmodi fuissent, multum dubito. Ante VVILLISIUM quidem, vel prioris ævi, vel extra Angliam, medicorum nemo urinam dulcem annotaverat; sed ejusmodi urinam temporibus VVILLISII primo & in Anglia tantum comparuisse, minus verisimile est; omnesque ante VVILLISIUM de urina in diabete dulci prorsus siluisse, potius observationi perfunctoriæ, vel omnino neglectæ, imputarem. Quod observatores, quibus diabetis exempla antea occurrebant, vel negligentes vel male fidei fuissent suspicor; cum plurimi eorum tam incredibilia de potu in diabeticis per renes transeunte prorsus immutato narrant. SYDENHAMUM autem ipsum, adeo perspicacem & diligentem, de statu urinæ nihil movisse, mirum videtur: sed, cum scripta VVILLISII, SYDENHAMO satis nota, urinam semper esse dulcem afferuerint, si diversam invenisset SYDENHAMUS, quin id indicasset, nullus dubito.

Diabetes hystericus, S. sp. 3. *Sydenh.* diff. epist. ad G. Cole.

Diabetes arthriticus, S. sp. 6. *Sydenh.* de podagra.

Diabetes artificialis, S. sp. 4. *Malpigh.* de liene.

### G. LXIII. H Y S T E R I A.

Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum & fauces ascendentis; ibique strangulantis; sopor; convulsiones; urinæ limpidæ copia profusa; animus, nec sponte, varius & mutabilis.\*

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219. *Sag.* G. 242.

Malum hystericum, *Hoffm.* III. 50. *Junck.* 36.

Affectio hysterica, *Willis* de morb. convulsiv. cap. 5.

10. 11. *Sydenh.* diff. epist. ad G. Cole. *Whytt* on nervous disorders.

Quatenus specie differat hysteria idiopathica; dicere non possum, nec, ut opinor, recte dixit SAUVAGESIUS. Species enim ab eo recensitæ non, nisi ratione causæ remotæ, varietates esse mihi videntur. Ita habet,

#### A. Ab emanatione mensium,

Hysteria chlorotica, S. sp. 2. *Raubin.* cap. 13.

K 3

B. A

\* Novit quisque, in Nosologia & in Medicina facienda quadantenus exercitatus; quam difficile sit inter dyspepsiam; hypochondriam; & hysteriam semper accurate distinguere. Genera autem vera, & satis a se invicem distincta; indicasse mihi videor: recte autem, an fecerim, aliis dijudicandum relinquo. Morbos affines facile inter se misceri probe novi; & in quocunque casu, quicumque eorum pro primario sit habendus, per characteres nosologicos indicare, mihi difficillimum fore agnosco. Posterius, ut spero, hanc rem luculentius expositam dabunt.

**B. A menorrhagia cruenta.**

*Hysteria a menorrhagia*, S. sp. 3. *Raulin. Sydenh.*  
*Diil. epist. ad G. Cole.*

**C. A menorrhagia serosa, five fluore albo.**

*Hysteria a leucorrhœa*, S. sp. 4. *Raulin*, cap. 14.

**D. A viscerum obstructione.**

*Hysteria emphrastica*, S. sp. 5. *Raulen*, cap. 5.

**E. A vitio stomachi.**

*Hysteria stomachica*, S. sp. 7. *Raulin*, cap. 4.

**F. A salacitate nimia.**

*Hysteria libidinosa*, S. sp. 6.\*

**Manifesto symptomaticæ sunt.**

*Hysteria verminosa*, S. sp. 1. *Delii Amœnit. Academ.*

*Hysteria febricosa*, S. sp. 8. *wedel in Ephem. Germ.*

*D. I. A. H. Obs.* 193.

**G. LXIV. H Y D R O P H O B I A.**

**Potionis cujuslibet, utpote convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium & horror; plerumque e morfu animalis rabidi.**

*Hydrophobia*, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Sag. G.* 343

*Boerb.* 1138. *Junck.* 124. *Mead on poisons.* *De-*

*sault sur la rage. Sauvages diss. sur la rage. Ja-*  
*mes*

\* In speciebus hysteriæ recensendis, egregius SAUVAGESIUS RAULINUM, theoriæ subtili & fallaci, potius quam observationi, innitentem, secutus fuisse videtur. Nec quidem inter cæteras hysteriæ species indicasse videtur SAUVAGESIUS illam, quam maxime exquisitam & frequentissimam censeo, illam scilicet, quæ foeminas adultas, laute viventes, sanguineas, plethoricas, valentiores, & a morbo alio quovis immunes, sæpe ex pathemate mentis solo adoritur.



mes on canine madness. Dalby, Virtus of cinna-  
ber and musk against the bite of a mad dog. Nugent on  
the hydrophobia. Choisel, Nouvelle methode pour  
le traitement de la rage, Jourral de Medecine,  
passim. Lond. Med. Obs. and Inquir. Vol. III. Art.  
34. Vol. V. Art. 19. 26. and. App. Lond. Med.  
Transf. Vol. II. Art. 5. 12. and. 15. Edinb. Med.  
Ess. V. Art. 51. Heysham, Diss. Inaug. de rab.  
canin. Edinb. 1777. Parry, Diss. inaug. de rat.  
contagios. sive canin. Edinb. 1778. Soc. Royale I.  
Mem. p. 105. 146. Andry, Recherches sur la rage,  
1780. Soc. Royale II. Hist. p. 229. 230. 456. III.  
Hist. p. 167. Vaughan, Cases of hydrophobia, se-  
cond. edit. 1778.

Species sunt,

I. Hydrophobia (*rabiosa*) cum mordendi cupi-  
ditate ex morfu animalis rabidi.

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.

II. Hydrophobia (*simplex*) sine rabie, vel mor-  
dendi cupiditate.

Hydrophobia spontanea, S. sp. 2. Edinb. Med. Ess.  
I. 29.

#### O. IV. VESANIAE. \*

Mentis \*\* judicantis functiones laesae sine pyre-  
xia vel comate.

K 4

Pa-

\* *Vesaniarum* ordinem hic instituere velim, quæ cum  
classe VOGELII nona, *Paranoie* inscripta, eadem o-  
mnino sit; sed a classe *Vesaniarum* SAUVAGESII &  
SAGARI in eo diversa, quod horum auctorum ordines  
*Hallucinationum* & *Morositatum* prorsus excludat; iti-  
demque a classe *Mentalium* apud LINNÆUM diversa,  
quod hujus auctoris ordines *Imaginariorum* & *Pathetico-*  
*rum* etiam omittat.

A classe *Vesaniarum* autem tum *Hallucinationes*, tum  
*Morositates* exclusas esse velim; quia neque causis, ne-  
que

Paranoia, V. Cl. IX.

Deliria, S. Cl. VIII. O. III. Sag. CL. XI. O. III.

Ideales, L. Cl. V. O. I.

G. LXV.

## A M E N T I A.

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines rerum relationes vel non percipiunt, vel non reminiscuntur.

Amentia, S. G. 233. V. 337. Sag. G. 346.

Morosis, L. 106.

Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.

Amnesia\*, S. G. 237. Sag. G. 347.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Memoriæ debilitas, Junck. 120.

Species sunt.

## I. Amen-

que symptomatis cum *Vesaniis* fricte diutis ullo modo congruant. Quis enim *Syrigium* vel *Bulimiam*, vel aliam *Hallucinationem* sive *Morositatem*, quæ a mentis judicio non pendeat, *Vesaniam* appellare vellet? Verum quidem est, tum hallucinationes, tum morositates, cum *vesaniis* aliquando conjunctas esse, sed simul adfunt alia *vesania* indicia, quæ ejusmodi hallucinationes & morositates affectionis magis generalis symptomata tantum esse ostendunt. Ob has rationes, hallucinationes SAUVAGESII & imaginarios LINNÆI ad morbos locales olim detuli; & nunc morositates SAUVAGESII & patheticos LINNÆI; antea a nobis omnino omissos, ad locales etiam deferendos esse censui.

\*\* In priore Nosologiæ nostræ editione has functiones simpliciter mentis esse dixi; minus autem recte; nam perceptio falsa sive *hallucinatio*, & appetitus erroneus sive *morositas*, quodammodo ad mentis functiones pertinent; cum vero utrasque ab hac classe exclusas esse velim, oportebat classis characterem nunc mutare, & mentis judicantis functiones dicere.

\* Amnesiam cum amentia ad unum genus retuli, tum quia plerumque conjungantur, tum quia ab iisdem causis plerumque oriantur, & amnesia ingravescent ad amentiam semper ducat.

I. Amentia (*congenita*) a nativitate constans.

Amentia morosis, S. sp. 8.

Amentia mitrocephala, S. sp. 6.

II. Amentia (*senilis*) ex perceptione & memoria, ingravescente ætate, imminutis.

Amentia senilis, S. sp. 1.

Amnesia senilis, S. sp. 2.

III. Amentia (*acquisita*) a causis externis evidentibus, in hominibus sanæ mentis superveniens.

Amnesia febrile, S. sp. 8.

Amentia quartana, S. sp. 11.

Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.

Amnesia plethorica, S. sp. 4.

Amentia rachialgica, S. sp. 10.

Amnesia a venere, S. sp. 1.

Amnesia a pathemate, S. sp. 5.

Amentia a venenis, S. sp. 3.

Amentia a temulentia, S. sp. 7.

Amentia ab ictu, S. sp. 9.

Amnesia traumatica, S. sp. 3.

Sequentes SAUVAGESII species in Nosologia methodica nequaquam recenseri debent, cum causæ internæ a quibus characteres desumuntur, per signa externa nequaquam dignosci possint.

Amentia serosa, S. sp. 2.

Amentia a tumore, S. sp. 4.

Amentia a hydatidibus, S. sp. 5.

Amentia a siccitate, S. sp. 7.

Amentia calculosa, S. sp. 12.

**Infania \* partialis sine dyspepsia. \*\***

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Sag. G. 347.*  
*Boerb. 1089. Junck. 121.*

Demonomania, S. G. 236. *Sag. 348.*

Dæmonia, L. 69.

Vesania, L. 70.

Panophobia, L. 75.

Athymia, V. 329.

Delirium melancholicum, *Hoffm. III. 251.*

Erotomania, L. 82.

Nostalgia, S. G. 226. L. 83. *Sag. G. 338. Junck. 125.*

Melancholia nervea, Cl. *Lorry de melancholia, P. I.*

**Variat pro varietate rerum, de quibus homo delirat. Ita est**

**1. Cum hallucinatione de statu corporis sui a levibus causis periculoso, vel de statu rerum suarum tristi metuendo.**

Melancholia vulgaris, S. sp. 1.

Melancholia argantis, S. sp. 4.

Panophobia phrontis, S. sp. 3.

**2. Cum hallucinatione de statu rerum suarum jucundo,**

Melancholia moria, S. sp. 5.

Melancholia enthusiastica, S. sp. 13.

Melancholia saltans, S. sp. 8.

**3. Cum amore vehementi sine satyriasi, vel nymphomania.**

Me-

---

\* Infaniam adesse dicimus, quando rerum relationes omnino falsæ mente concipiuntur, ita ut hominis vel pathemata vel actiones præter rationem excitentur.

\*\* Hypochondriasis & melancholia non semper distingui possunt. Si quando autem possint, nullo alio signo quam per dyspepsiam in hypochondriasi semper præsentem, in melancholia sæpe absentem rite, quantum video, distinguendi sunt.



Melancholia amatoria, S. sp. 5.

Erotomania, L. 82.

4. Cum superstitioso futurorum metu.

Melancholia religiosa, S. sp. 3.

5. Cum aversatione motus & omnium vitæ officiorum,

Melancholia attonita, S. sp. 6.

6. Cum inquietudine & status cujusvis impatentia.

Melancholia errabunda, S. sp. 7.

7. Cum tædio vitæ.

Melancholia Anglica\*, S. sp. 11.

Melancholia phrontis, S. sp. 14.

8. Cum hallucinatione de sua speciei natura.

Melancholia zoantropica, S. sp. 12.

Melancholia lippantropica, S. sp. 9.

Melancholia scytharum, S. sp. 10.

DÆMONOMANIAM nullam veram esse censeo\*\*,  
& nostra sententia species sub hoc titulo  
SAUVAGESIO recensitæ sunt, vel,

1. Species melancholicæ sive manicæ, uti

Dæmonomania fanatica, S. sp. 5.

Dæmonomania Indica, S. sp. 7.

Vel, 2do, Morbi ab adstantibus ad dæmonum  
potentiam falso relati, uti

Dæmonomania a vermibus, S. sp. 4.

Dæ-

---

\* Apud Anglos fortassis tædium vitæ non semper a morbo pendet.

\*\* Ita censeo, quia dæmonum in nostra corpora vel hisce temporibus in mentes nostras potentiam ullam esse pauci jam credunt.

Dæmonomania Polonica, S. sp. 8.

Dæmonomania cardiogmo, S. sp. 9.

**Vel, 3tio, Morbi omnino simulati, uti**

Dæmonomania sagarum, S. sp. 1.

Dæmonomania vampirismus, S. sp. 2.

Dæmonomania simulata, S. sp. 3.

**Vel, quarto, Morbi partim veri, ut No. 2.,  
partim simulati, ut 3tio, recensiti, uti**

Dæmonomania hysterica, S. sp. 6.

G. LXVII.

M A N I A.

**Insania universalis.**

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. Sag. G. 349.

Boerb. 1118. Junck. 122. Battie on madness.

Paraphrosyne, L. 66.

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, Hoffm. III. 251.

**1. Mania (mentalis) omnino a pathemate mentis.**

Mania a pathemate, S. sp. 1. Exempla inveniuntur  
ex melancholia apud *Preysingerum* de diagnosi mor-

borum capitis; ex terrore, apud *Locherum* de ma-

nia; ex amore apud *Ephem. Nat. Cur. Dec. II.*

A. X. Obf. 126.; ex ira apud *Hoffm. III. p. 263.*

**2. Mania (corporea) a vitio corporis evidente**

**Variat pro varietate vitii corporis; hinc**

Mania metastatica; S. sp. 4.

ab ulcere siccato *Amat. Lufitan. Cent. II. cur. 67.*

a resecta plica, *Hoffm. tom. III. p. 263. Ephem.*

*N. Cur. Cent. I. Obf. 35.*

a represso herpete, *Locher de mania.*

a menstruis retentis, *Schenck, Obf. p. 142.*

a semine retento, *Schenck. ibid.*

a repressa scabie, *Lorry de melancholia, tom. II.*

*P. II. cap. 3.*

a graviditate, *Lorry, P. I. cap. 7.*

a pat.

a pariori lactis & lochiorum fluxu, Puzos, 3.  
Mem.

- Mania lactea, S. sp. 2.
- Mania hysteralgica, S. sp. 8.
- Mania ab hemicrania, S. sp. 3.
- Mania a venenis, S. sp. 5.
- Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

2. Mania (*obscura*) progressu nullo vel pathemate mentis, vel vitio corporis evidente.

- Mania vulgaris, S. sp. 7.
- Phrenitis apyreta, S. sp. 10.
- Mania periodica, S. sp. 6.

Maniæ species symptomaticæ sunt,

PARAPHROSYNE, S. G. 232. Sag. G. 345.

1. Paraphrosyne a venenis,

- Paraphrosyne temulenta, S. sp. 1.
- Paraphrosyne a datura, S. sp. 2.
- Paraphrosyne ab opio, S. sp. 3.
- Paraphrosyne a conio, S. sp. 4.
- Paraphrosyne magica, S. sp. 5.

2. Paraphrosyne a pathemate, S. sp. 7.

- Paraphrosyne hysterica, S. sp. 12.

3. Paraphrosyne febrilis.

- Delirium, L. 65. V. 330.
- Paraphrosyne febricosa, S. sp. 10.
- Paraphrosyne critica, S. sp. 11.
- Paraphrosyne calentura, S. sp. 9.
- Paraphrosyne puerperarum, S. sp. 8.

G. LXVIII. ONEIRODYNIA.

In somno imaginatio vehementior vel molesta.

Somnium, V. 339.

Somnambulismus, S. G. 221. L. 77. Sag. G. 333.

Hypnobatasis, V. 340.

Noctambulatio, Junck. 124.

Ephial-

Ephialtes, S. G. 138. L. 163. Sag. 245.

Incubus, V. 211. Junck. 50.

1. Oneirodynia ( *activa* ) excitans ad ambulationem, & motus varios.

Somnambulismus vulgaris, S. sp. 1.

Somnambulismus catalepticus, S. sp. 2.

2. Oneirodynia ( *gravans* ) ex sensu ponderis alicujus incumbentis, & pectus præcipue comprimantis.

Ephialtes plethorica, S. sp. 1.

Ephialtes stomachica, S. sp. 2.

Ephialtes hypochondriaca, S. sp. 6.

Ephialtes tertianaria, S. sp. 5.

Ephialtes verminosa, S. sp. 4.

Ephialtes ex hydrocephalo \*, S. sp. 3.

CL. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnæ partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

Cachexiæ, S. Cl. X. V. Cl. VIII. Sag. Cl. III.

Deformes, L. Cl. X.

O. I.

\* Cum hydrocephalus per signa externa non semper dignosci possit, hæc species minus apte recensetur; sed ideo apposui, quod ephialtes in iis qui simul anasarca crurum, & hydrothorace vel ascite laborant, ad hydrocephalum utcumque referri possit.



## O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I. Sag. Cl. III. O. I.

Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

## G. LXIX. T A B E S :

Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309. Sag. G. 100.

Species sunt,

1. Tabes ( *purulenta* ) ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica.

Tabes a vomica, S. sp. 15.

Tabes ulcerosa, S. sp. 12.

Tabes apostematodes, S. sp. 3.

Variat sede; hinc

Tabes renalis, S. sp. 2.

Tabes hepatica, S. sp. 8.

Tabes a stomacho, S. sp. 14.

Tabes a pericardio, S. sp. 7.

Tabes catarrhalis \*, S. sp. 13.

2. Tabes ( *scrophulosa* ) in corporibus scrophulosis.

Tabes glandularis, S. sp. 10.

Tabes mesenterica, S. sp. 9.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

Atrophia infantilis, S. sp. 13.

Atrophia rachitica, S. sp. 8.

Tabes rachialgica, S. sp. 16.

3. Tabes ( *venenata* ) a veneno ingesto.

Tabes a veneno, S. sp. 17.

Atro-

---

\* Si cum catarrho diuturno adfuerit tabes cum pyrexia hectica, nihil dubitarem ejusmodi tabem catarrhalem ad purulentam referre.

**Atrophia** ( *febrifera* ), S. sp. 16. ad tabem purulentam, vel ad genus atrophiae, pertinet.

G. LXX. A T R O P H I A.

**Marcor & asthenia, sine pyrexia \* hectica.**

Atrophia; S. G. 277. L. 210. V. 308. *Sag. G.* 102.  
*Junck.* 41.

Marasmus; L. 211.

Species sunt,

1. **Atrophia** ( *inanitorum* ) ex evacuatione nimia.

Atrophia a ptyalismo, S. sp. 7.

Atrophia a vomitu, S. sp. 9.

Atrophia ab alvi fluxu, S. sp. 6.

Tabes nutricum, S. sp. 4.

Atrophia nutricum, S. sp. 5.

Atrophia a leucorrhœa, S. sp. 4.

Tabes dorsalis, \*\* S. sp. 1.

Tabes sudatoria, S. sp. 6.

Tabes a sanguifluxu, S. sp. 2.

Sanguinis inopia Ill. Lieutaud. *synops. univ. med.*  
vol. I. pag. 52.

2. **Atrophia** ( *famelicorum* ) a nutrimento deficiente.

Atrophia laetentium, S. sp. 3.

3. **Atrophia** ( *cacochymica* ) a nutrimento corrupto.

Atrophia scorbutica, S. sp. 12.

---

\* Atrophia fortassis nunquam sine pyrexia, saltem sin pulsu solito frequentiori, adest; sed absentia pyrexiae hectica, fere semper atrophiam a tabe distinguit.

\*\* An ad atrophiam inanitorum, an ad atrophiam debiliam, pertineat tabes dorsalis, dubium mihi videtur, & ad posteriorem referre mallet,

Tabes syphilitica, S. sp. 11.

Tabes a hydrope, S. sp. 5.

4. Atrophia ( *debilium* ) a nutritionis functione depravata, prægressa nulla vel evacuatione nimia, vel cacochymia.

Atrophia nervea, S. sp. 1.

Atrophia lateralis, S. sp. 15.

Atrophia senilis, S. sp. 11.

O. H. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum tumens.

Intumescentiæ, S. Cl. X. O. H. *Sag.* Cl. III. O. II.

Tumidosi, L. Cl. X. O. H.

Seçt. I. ADIPOSÆ.

G. LXXI. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescencia molesta.

Polyfarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540. *Sag.* G. 106.

Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyfarcia adiposa, S. sp. 1. Lond. Med. Obs. III. 9. V. 21. 22. Med. Transf. II. 18.

Seçt. II. FLATUOSÆ.

G. LXXII. PNEUMATOSIS.

Corporis intumescencia tensa, elastica, sub manu crepitans.

Pneumatosis, S. G. 280. V. 391. *Sag.* G. 107.

Emphysema, S. G. 13. L. 288. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

*Combalusier* de flatulentis corporis humani affectibus.

Species sunt,

Tom. II.

L

[1. Pneu-

1. Pneumatosis ( *spontanea* ) sine causa manifesta.

Emphysema spontaneum, S. sp. 1.

Pneumatosis febrilis, S. sp. aliquot. Lond. Med. Obs.

VI. 19.

2. Pneumatosis ( *traumatica* ) a vulnere thoracis.

Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2. Lond. Med. Obs.

II. 2. III. 4. 35. 36. *Cheston*, chap. 1.

Pneumatosis febrilis, S. sp. aliquot.

3. Pneumatosis ( *venenata* ) a veneno injecto vel applicato.

Pneumatosis a veneno, S. sp. 1.

4. Pneumatosis ( *hysterica* ) cum hysteria.

Pneumatosis hysterica, S. sp. 3.

#### G. LXXIII. TYMPANITES.

Abdominis intumescencia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; cæterarum partium macies.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. *Sag.* G.

118. *Boerb.* 226. *Junck.* 87.

Affectio tympanitica, *Hoffm.* III. 339.

Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt,

1. Tympanites ( *intestinalis* ) cum tumore abdominis sæpe inæquali, & cum rejectione aeris frequenti, tensionem & dolorem levante.

Tympanites intestinalis, S. sp. 1. Edinb. Med. Ess.

I. 31.

Tympanites enterophyodes, S. sp. 3.

Tympanites verminosus, S. sp. 7.

Tympanites spasmodicus, S. sp. 5.



Meteorismus ventriculi, S. sp. 1.

Meteorismus abdominis, S. sp. 2.

Meteorismus hystericus, S. sp. 3.

Meteorismus a manzanilla, S. sp. 4.

2. Tympanites ( *abdominalis* ) cum resonitu evidentiore , tumore magis æquabili , & emissione flatuum rariori & minus levante.

Tympanites abdominalis, S. sp. 2.

Tympanites asciticus, S. sp. 4.

Ascites flatulento-peritonæus, S. sp. 28.

Tympanites Stevvartii, S. sp. 6.

G. LXXIV. PHYSOMETRA.

Tumor levis , elasticus , in hypogastrio figuram & sedem uteri referens.

Physometra, S. G. 290. Sag. G. 117.

Hysterophyse. V. 317.

Species sunt;

Physometra sicca, S. sp. 1.

Tympanites uteri sicca, *Astruc*, aut les malad. des femmes, L. II. cap. 9.

Physometra humida, S. sp. 2.

Tympanites uteri humida, *Astruc*, loc. cit.

SECT. III. AQUOSÆ SIVE HYDROPEŚ.

G. LXXV. ANASARCA.

Corporis totius vel partis ejus intumescencia mollis, inelastica.

Anasarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. Sag. G. 108.

*Boerb.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87. *Monro* of the dropsy, 1765. *Milman*. Animadversiones de hydrope, 1776.

Plegmatia, S. G. 282.

Angina aquosa, *Boerb.* 791.

Species sunt:

1. Anasarca ( *serosa* ) a retento sero ob evacuationes solitas suppressas, vel ab aucto sero ob ingestam aquam nimiam.

Anasarca metastatica, S. sp. 1.

a. Anasarca periodica.

b. Anasarca ab adiapneustia.

Phlegmatia lactea, S. sp. 3.

Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.

Anasarca urinola, S. sp. 11.

Anasarca hydropotarum, S. sp. 10.

2. Anasarca ( *oppilata* ) a compressione venarum.

Anasarca gravidarum, S. sp. 5.

Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.

Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.

Angina Loveriana, S. sp. 2.

Angina oedematosa, Boerb. 791.

3. Anasarca ( *exanthematica* ) post exanthemata, & præcipue post erysipelas, suborta.

Anasarca exanthematica, S. sp. 3.

Plegmatia exanthematica, S. sp. 10.

Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.

Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.

Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.

Anasarca Americana, S. sp. 7.

4. Anasarca ( *anæmia* ) a tenuitate sanguinis per hæmorrhagiam producta.

Anasarca a fluxu, S. sp. 2.

5. Anasarca ( *debilium* ) in debilibus a morbis longis, vel ab aliis causis.

Plegmatia vulgaris, S. sp. 1.

Anasarca a febris, S. sp. 4.

Anasarca hysterica, S. sp. 2.

# CULLENI CL. III.

Anasarca rachialgica, S. sp. 8.

Phlegmatia Dehenfis, S. sp. 11.

Anasarca purulenta, S. sp. 9. vix ad anasar-  
cam referri potest.

## G. LXXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hian-  
tibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. Boerb. 1217.

Hydrocephalum, V. 384.

### Species unica,

Hydrocephalus exterior, S. sp. 2. \*, Lond. Med.

Obs. V. 13. Med. Transf. II. 18. Edinb. Med. Ess.

III. 12.

## G. LXXVII. HYDRORACHITIS.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis,  
exiguus, hiantibus vertebrae.

Hydrorachitis, S. G. 287. Morgagn. de sed. XII. 9.  
& seq.

Spinola. L. 289.

Spina bifida, V. 386.

## G. LXXVIII. HYDROTHORAX.

Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata;  
urina parca; decubitus difficilis; subita &  
spontanea ex somno cum palpitatione exci-  
tatio; aqua in pectore fluctuans.

L 3

Hy-

---

\* Hydrocephalum internum, antea hic recensitum, ad  
Apoplexiam, sub nomine Apoplexiæ hydrocephalicæ,  
jam supra retuli.

Hydrothorax, S. 150. V. 311. Boerh. 1219.

**Species sunt,**

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3.

Hydrothorax febrisequens, S. sp. 4.

Hydrothorax a scabie, S. sp. 9.

Sequentes minus recte recensentur, cum liquidi intus contenti neque natura, neque fons, neque sedes, per signa externa dignosci queat.

Hydrothorax chylosus, S. sp. 1. Willis, Pharm. rat. P. I. sect. 1. Cap. 13.

Hydrothorax hydatidosus, S. sp. 5. Morg. de sed. XVI. 33.

Hydrothorax mediastini, S. sp. 6.

Hydrothorax pleuræ, S. sp. 7. Hoffm. III. p. 337. Bergeron, diss. de hydrope pectoris.

Hydrothorax pericardii, S. sp. 8. Morgagn. de sed. XVI. 34. 36. Senac de coeur, tom. II. p. 349. Edimb. Med. Ess. V. 56. 58. 59.

**Minus recte a SAUVAGESIO hic recensetur**

Hydrothorax ab omento, S. sp. 1.

**G. LXXIX. ASCITES.**

Abdominis intumescencia tensa, vix elastica, sed fluctuosa.

Ascites, S. G. 288. L. 217. V. 314. Sag. G. 115. Boerh. 1226. Hoffm. III. p. 322. Junck. 87. D. Monro on the dropsy, 1765. Med. Trans. II. 17. Milman, Animadversiones de hydrope, 1779.

**Species sunt,**

I. Ascites ( *abdominalis* ) cum tumore totius abdominis æquali, & cum fluctuatione satis evidente.

Ascites vulgatiior, S. sp. 1.



Variat ratione causæ.

**A. Ab oppilatione viscerum.**

Ascites ab oppilatione, S. sp. 2.

Ascites ab hepate, S. sp. 3.

Ascites a liene, S. sp. 4.

Ascites scrophulofus, S. sp. 5.

Ascites artificialis, S. sp. 10.

**B. A debilitate.**

Ascites ab exanthematis, S. sp. 8.

Ascites arthriticus, S. sp. 9.

Ascites febrilis, S. sp. 12.

Ascites ex quartana, *Werlhof.*

Ascites scorbuticus, S. sp. 11.

**C. A tenuitate sanguinis.**

Ascites a sanguifluxibus, S. sp. 7.

**Variat etiam ratione liquidi effusi.**

Ascites purulentus, S. sp. 21. \*

Ascites urinosus, S. sp. 22.

Ascites chylosus, S. sp. 23.

Ascites oleosus, S. sp. 24.

**2. Ascites ( *saccatus* ) cum tumore abdominis, saltem initio, partiali & cum fluctuatione minus evidente.**

Ascites ab ovariis, S. sp. 6.

Ascites ovarii, S. sp. 19.

a. Ascites saccatus.

Hydrometra ovarii, S. sp. 6.

Ascites cruentus, S. sp. 20. Edinb. Med. Ess. V. 63.

Ascites stomachi, S. sp. 16.

Ascites omentalis, S. sp. 18.

L. 4. V. 1. V. 1. Ascites

---

\* De hisce & pluribus aliis ascitis speciebus recensitis idem notandum est, ac in pag. 279.

*Afcites intercus*, S. sp. 14.

*Afcites fanguineo-intercus*, S. sp. 26.

*Afcites fanguineo-peritonæus*, S. sp. 27.

*Afcites purulento-peritonæus*, S. sp. 29.

## G. LXXX.

## HYDROMETRA.

*Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; citra ischuriam & graviditatem.*

*Hydrometra*, S. G. 289. *Sag.* G. 116. *Boerb.* 1224.

*Species per externa signa distinguendæ vix dari possunt: sed frequentes ex SAUVAGESIO recensentur.*

*Hydrometra ascitica*, S. sp. 1.

*Hydrometra gravidarum*, S. sp. 2.

*Hydrometra hydatica*, S. sp. 5.

*Afcites uterinus*, S. sp. 13.

*Hydrometra sanguinea*, S. sp. 3.

*Afcites sanguineo-uterinus*, S. sp. 25.

*Hydrometra puriformis*, S. sp. 5.

## G. LXXXI.

## HYDROCELE.

*Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.*

*Oscheocele*, S. G. 41. V. 388.

*Oscheophyma*, *Sag.* G. 44.

*Hydrops scroti*, V. 389.

*Hydrops testium*, *Boerb.* 1227.

*Species sunt,*

*Oscheocele aquosa*, S. sp. 2. *Monro* in *Edinb. Med. Ess. Vol. V. Art. 21. Sharp's Operations and critical inquiry. Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele. *Le Dran*, *Operations de Chirurgie. Berivandi* in *Mem. de l' Acad. de chirurgie*, Vol. III.

*Oscheo-*

Ofcheocele hydatidosa, S. sp. 3.

Ofcheocele Malabarica, S. sp. 4. *Kamfer*, *Ainoen*.  
exot. fasc. III. obs. 7.

Seçt. IV. S O L I D Æ.

G. LXXXII. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum  
occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec  
fluctuans.

Physconia, S. G. 283. V. 325. *Sag.* G. 110.

Hypofarca, L. 218.

Species sunt \*,

Physconia hepatica, S. sp. 1.

Cl. *Cusson.* *Bonet.* Sepulchr. de graviditate falsa,  
obs. 3. num. 8. 9. 10. *Verduc* Patholog. du ra-  
chitis.

a. *Scirrhoudea*. G. *Segeri* M. Nat. Cur. D. I. Ann.  
IV. obs. 142.

b. *Calculosa* *Bonet* Sepulchr. de hypochondrii tumo-  
re, obs. 5.

c. *Hydatidosa* *Winckeri* Disp. de hydatidibus apud  
*Bonet.* Med. Septent. T. II. pag. 33.

Physconia splenica, S. sp. 2.

a. *Emphrastica* *Haller.* Disp. pathol. T. IV. Disp.  
109. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 30.

b. *Scirrhoudea* *Bonet.* Sepulchr. de ventris tumore,  
obs. 34. n. 3.

Physconia renalis, S. sp. 3.

Bo-

---

\* Species sequentes, nequaquam ad normam Nosologiæ  
methodicæ recensentur, sed accuratius physconix species  
indicare difficile foret, saltem plus exegisset. quam quo  
nunc fruor otii. Interim *Cussoni* doctissimi opus summæ  
ad pathologiam utilitatis repetere hic placuit.

*Bonet.* Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. n. 7.

a. *Calculosa Plater.* Obs. L. II. p. 449. *River*, cent. IV. obs. 34.

b. *Sarcomatico-cystica Haller.* Disp. pathol. Disp.

114.

### **Physconia uterina, S. sp. 4.**

*Bonet.* Sepulchret, de gravid. falsa, obs. 2. n. 5. 6. 7.

### **Physconia ab ovario, S. sp. 5.**

*Monro*, Edinb. Med. Ess. tom. VI. Art. 74. obs. 1.

### **Physconia mesenterica, S. sp. 6.**

a. *Hydatidosa Greg. Horstii*, Lib. 5. obs. 33. *Tulp.* obs. Lib. II. c. 34.

b. *Strumosa Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tumore, obs. X. n. 15. *Ambr. Pare*, L. VII. cap. 21. *Scultet.* Armam. chirurg. obs. 38.

c. *Scirrhoudea Marc. Donat.* Hist. med. mir. lib. VII. c. 15. *Claudin.* consult. Sect. II. consult. 134. *Trincavell.*, lib. III. conf. 22. *Riolan.* Anthropologr. lib. II. c. 26. *Morgagni* de sedib. ep. 39, n. 2.

d. *Sarcomatica Bonet.* Sepulchr. de falsa gravid. obs. 3. n. 1.

e. *Steatomatosa, Barth. Cabrol.* Obs. 33. & 35. *Tulp.* Obs. Lib. II. c. 32. 33. *J. Lecheii* apud *Bonet.* Med. sept. T. II. pag. 486. Idem Collect. acad. tom. III. pag. 585. *Hierne* Collect. Acad. tom. III. p. 226. Obs. 166.

f. *Fungosa, Bonet.* Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3.

### **Physconia intestinalis. S. sp. 7.**

a. *Concreto-glomerata, Morgagn.* de sedib. epist. 39. n. 21. 25.

b. *Sarcomatica, Fontan.* Obs. med. selectiores, obs. II.

### **Physconia omentalis, S. sp. 8.**

*Frid. Reebman* Diss. de omento.



**Physconia polysplachna, S. sp. 9.**

- a. *Scirrhodea*, *Fab. Hildani* cent. II. obs. 45.
- b. *Scirrhodea* & *sarcomatica*, *Huldenreich*, *Misc. Nat. C. D. I. ann. VI. & VII. pag. 321.*
- c. *Scirrhodea* & *adiposa* *T. Bartholin. cent. III. obs. 6.*
- d. *Hydatidosa*, *Volch. Coiter. Obs. anat. p. 117. Maur. Cordæi* comm. 5. ad lib. priorem, *Hippocr. de muliebr.*
- e. *Hydatidosa* & *scirrhodea*, *Halleri* *Disp. pathol. Tom. V. p. 256.*

**Physconia visceralis, S. sp. 10.**

*Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. Megalosplachnos Hippocrat. Marc. Donat. Hist. med. mir. lib. VI. c. 21. Schenck. ex Garnerio de liene, Lib. III. Obs. 9. Salmuth. cent. I. obs. 21. Bonet. Med. sept. Lib. VII. p. 487. Bianchi Hist. hepat. T. I. p. 130.*

**Physconia externa lupialis, S. sp. 11.**

*Graham Transf. philos. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.*

**Physconia externa scirrhodea, S. sp. 12.**

*Ger. Blas. Obs. med. VI.*

**Physconia externa hydatidosa, S. sp. 13.**

*Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. §. 2. 3. 4. 11. &c. Achotzii apud Schenkium, Lib. III. de hydropse, obs. 4. & apud Scholtzium conf. 339. Solenandri conf. 15. Sect. V. Riverii Obs. communicat. ultim.*

**Physconia ab adipe subcutaneo, S. sp. 14.**

- a. *Simplex*, *Cl. Lieutaud. Comp. med. J. Mich. Febr. apud Bonet. Med. sept. T. I. pag. 636.*
- b. *Syphilitica*, *obseruante celeb. Fizes.*

**Physconia ab excrementia, S. sp. 15.**

## G. LXXXIII. RACHITIS.

Caput magnum antèrius maxime tumens; genicula tumida; costæ depressæ; abdomen tumidum; cætera marcescentia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. Sag. G. 120. Boerb. 1480. Hoffm. III. 487. Zeviani della rachitide.

Variat,

## 1. Simplex sine alio morbo.

Rachitis nodosa, S. sp. 1.

Rachitis Britannica \*, S. sp. 2. Glisson de rachitide.

## 2. Aliis morbis conjuncta.

Rachitis strumosa, S. sp. 3.

Rachitis Polonica, S. sp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. sp. 6.

Neque rachitis calimucana, S. sp. 4. neque rachitis a castratione, S. sp. 7. pro morbo haberi potest.

## O. III. IMPETIGINES.

Cachexiæ, cutem & externum corpus præcipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V. Sag. Cl. III. O. V.

## G. LXXXIV.

---

\* Minus recte pro diversis speciebus ponuntur rachitis nodosa & Britannica, cum non differant aliter quam morbus incipiens & confirmatus.

## G. LXXXIV. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, præsertim in collo, tumores; labium superius & columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367. Sag. G. 121.

Struma, L. 284.

Species sunt,

1. Scrophula ( *vulgaris* ) simplex, externa, permanens.

Scrophula vulgaris, S. sp. 1.

2. Scrophula ( *mesenterica* ) simplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, & fœtore fœcum insolito.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

3. Scrophula ( *fugax* ) simplicissima, & tantum circa collum, plerumque a resorptione ex ulceribus capitis proveniens.

Scrophula fugax, S. sp. 2.

4. Scrophula ( *Americana* ) cum frambœsia conjuncta.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Neque scrophula *periodica*, S. sp. 6. neque scrophula *Moluccana*, S. sp. 8. ad genus scrophulæ pertinere mihi videtur.

## G. LXXXV. SYPHILIS.

Morbus contagiosus, post concubitum impurum & genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis; præsertim ad marginem capil-

pillitii, papulæ corymbosæ, in crustas & in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostioci & exostoses.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319. *Sag.* G. 126. Lues venerea, *Boer.* 1440. *Hoffm.* III. 413. *Junck.* 96. *Astruc* de lue venerea.

Species unica,

Syphilis venerea. S. sp. 6.

Syphilis *Polonica*, S. sp. 2. nequaquam ad hoc genus pertinet, & de Syphilide *Indica*, S. sp. 3. nobis non satis constat, ut pro diversa specie ponatur.

#### G. LXXXVI. SCORBUTUS.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente; asthenia; stomacace; in cute maculæ diversicolores, plerumque livescences, præsertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. IV. 318. *Sag.* G. 127. *Boerb.* 1148. *Hoffm.* II. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the scurvy. *Hulme* de scorbuto. *Rouppé* de morbis navigantium, *Med. Transf.* II. 18. 21. *Milman* on the Scurvy. *Ferris* de sanguinis per corpus vivum circulantis putredine, Ed. 1784.

Variat gradu.

a. Scorbutus incipiens.

b. Scorbutus crescens.

c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam symptomatibus.

d. Scorbutus lividus, *Nitzsch*, *Theoret. pract.* ab *Handl. des Scharbockes*, &c.

e. Scorbutus petechialis, *Nitzsch*, *ibid.*

f. Scor-



- f. *Scorbutus pallidus*, *Nitzsch*, *ibid.*  
 g. *Scorbutus ruber*, *Nitzsch*, *ibid.*  
 h. *Scorbutus calidus*, *Nitzsch*,

G. LXXXVII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus anæsthesia; facies tuberibus deformis; vox rauca & nasalis.

Elephantiasis, S. G. 302. V. 321. *Sag. G.* 128.  
 Elephantia Arabum, V. 322.

Varietates sunt,

- Elephantiasis Orientalis, S. sp. 1.  
 Elephantiasis legitima, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.*  
 Vol. I. Artic. 19. Soc. Royale I. mém. pag. 161.  
 Elephantiasis leonina, S. sp. 3.  
 Elephantiasis Tyria, S. sp. 4.  
 Elephantiasis Aleopecia, S. sp. 5.  
 Elephantiasis syphilitica, S. sp. 6.  
 Elephantiasis Javanensis, S. sp. 7.  
 Elephantiasis Indica, S. sp. 9. \*

G. LXXXVIII. LEPR A.

Cutis escharis albis, fursuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepra, S. G. 303. L. 262. *Sag. G.* 129.  
 Lepra Græcorum, V. 320.

Varietates sunt,

- Lepra Græcorum, S. sp. 1.  
 Lepra ichthyosis, S. sp. 2.  
 Lepra Indica, S. sp. 3.

Le-

---

\* De Elephantiasi, Lepra, Framboesia, & Trichomate, utpote morbis a meipso nunquam visis, amplius statuere non ausus sum,

Lepra Asuriensis, S. sp. 4.

Lepra herpetica, S. sp. 5.

Lepra malum mortuum, S. sp. 6.

### G. LXXXIX. FRAMBŒSIA.

Fungi, mori, vel rubi idæi fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Frambœsia, S. G. 229. *Sag.* G. 125.

Varietates sunt,

Frambœsia Guineensis, S. sp. 1. *Edinb. Essays*, Vol. VI. Art. 71.

Frambœsia Americana, S. sp. 2.

### G. XC. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in cirros & funiculos inextricabiles impliati.

Trichoma, S. G. 311. *Sag.* G. 137.

Plica, L. 313.

Plica sive Rhopalosis, V. 323.

Species sunt.

Trichoma cirrosum, S. sp. 1.

Trichoma villosum, S. sp. 2.

### G. XCI. ICTERUS.

Flavido cutis & oculorum; fæces albidæ; urina obscure rubra; immixta colore luteo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerb.* 918. *Junck.* 90.

Aurigo, S. G. 306. *Sag.* G. 132.

Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species idiopathicae sunt,

1. Icterus (*calculosus*) cum dolore in regione epigastrica acuto, post pastum aucto, & cum dejectione concretionum biliosarum.

Au-

# CULLENII CL. III.

Aurigo calculosa, S. sp. 9. Edinb. Med. Ess. I. 33.  
Il. 28. 29. Med. Trans. II. 10.

2. Icterus ( *spasmodicus* ) sine dolore ; post morbos spasmodicos & pathemata mentis.

Aurigo hysterica, S. sp. 13.

Species quædam, quæ a SAUVAGESIO sub titulo Auriginis a venenis, recensentur.

3. Icterus ( *hepaticus* ) sine dolore, post morbos hepatis.

Aurigo hepatica, S. sp. 11.

Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.

Aurigo purulenta, S. sp. 7.

4. Icterus ( *gravidarum* ) sub graviditate oriens, & post partum abiens. *Van-Swivet. ad Boerb. Aph. 950.*

Aurigo plethorica, S. sp. 5.

5. Icterus ( *infantum* ) in infantibus haud diu post natales oriens.

Aurigo neophytorum, S. sp. 12.

Icteri sequentes siquidem recte icteri dicantur \*, symptomaticæ sunt,

Aurigo febrilis, S. sp. 1.

Aurigo febricola, S. sp. 8.

Aurigo accidentalis, S. sp. 2.

Aurigo typhodes, S. sp. 10.

Tom. II.

M

Au.

\* Flavedo cutis oriri potest, vel a bile non, ut solet, excreta. sed in vasa sanguifera excepta, & inde subteo cuticulam effusa; vel a sero sanguinis sæpe flavescente, subter cuticulam, ut in ecchymosi, effuso. In quibusdam casibus, an flavedo cutis ab una vel altera illarum causarum oriatur, apud medicos non semper constat; sed, tantum ex prima icterum genuinum, & ab altera morbum, diversum; quique quantum fieri possit, distingui debet, oriri censemus.

Aurigo rachialgica, S. sp. 14.

Aurigo a venenis, S. sp. 4.

Aurigo Indica, S. sp. 3. five quarundam gentium color naturalis, nequaquam pro morbo haberi potest.

#### CL. IV. LOCALES. \*

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia \*\* S. CL. I. L. CL. XI. V. Cl. X. Sag.  
Cl. I.

Plagæ, S. Cl. I. O. VII. Sag. Cl. II.

Morbi organici *Auctorum*.

#### O. I. DYSÆSTESIÆ.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum externorum vitio. \*\*\*

Dysæsthesiæ, S. CL. VI. O. I. Sag. Cl. IX. O. I.

Hallucinationes, S. Cl. VIII. O. I. Sag. Cl. XIII.

O. I.

Privativi, L. Cl. VI. O. III.

#### G. XCII.

\* Fortassis aliquando ambiguum esse potest, utrum ad universales, vel ad locales, morbi quidam referri debent; de plerisque vero, utri classi referendi sint, satis obvium erit, & ex institutione hujus *Localium* classis, quamplurimos morbos rectius & facilius, quam in aliorum nosologorum systematibus, disponi posse contendimus.

\*\* *Vitia* hic dixi, utpote sub hac classe *Localium* comprehensa; morbos vero multo plures comprehendit hic classis, ita ut vox *vitia* pro hujus synonymo nequaquam haberi potest, & idem de *Plagis SAGARI* dictum velim.

\*\*\* Vereor ne in sequentibus aliquando species recenserim quæ characteri ordinis non prorsus respondeant, quasdam scilicet dysæsthesias, quæ ex organorum externorum vitio non pendeant. Hujusmodi species quidem aliquando recensui; sed paucæ omnino sunt, & feci, quia species affines, & hic loci expectandas, separare nolui.



## G. XCII. CALIGO.

Visus imminutus, vel prorsus abolitus, ob repagulum opacum, inter objecta & retinam, oculo ipso vel palpebris inhærens.

Caligo, S. G. 153. V. 288. S. sp. 259.

Cataracta, L. 109.

Species sunt,

1. Caligo ( *lentis* ) ob maculam opacam pone pupillam .

Cataracta \*, S. G. 152. L. 109. V. 239. Sag. 26.

Apud SAUVAGESIUM species sunt, veræ vel spurix.

Veræ varietates sunt:

Cataracta vera, S. sp. 1.

Glaucoma Woolhousii.

Cataracta antiglaucoma, S. sp. 2.

Cataracta glaucoma, S. sp. 3.

Glaucoma Maitre Jan. & St. Ives.

Spurix varietates sunt:

Cataracta membranacea, S. sp. 4.

Cataracta secundaria, S. sp. 5.

1. Caligo ( *corneæ* ) ob corneam opacam.

Achyls, V. 242.

Variat pro varietate morbi opacitatem facientis.

Caligo a nephelio, S. sp. 5.

Caligo a leucomate, S. sp. 6.

M. 2

Ca.

\* Non video quod, cum SAUVAGESIO, *Cataracta* pro diverso a *Caligine* genere haberi possit; & judicent periti, annon ideo recte *Caliginis* characterem mutaverim, & *cataractam* pro ejus specie posuerim.

Caligo ceratocele, S. sp. 10.

Caligo a staphylomate, S. sp. 11.

Caligo a pterygio, S. sp. 12.

Caligo hyposphagma, S. sp. 13.

3. Caligo ( *pupillæ* ) ob obstructam pupil-  
lam.

Varia pro varietate causæ.

Caligo ab eclasi, S. sp. 18.

Amaurosis a synchysi, S. sp. 6.

Amaurosis a myosi, S. sp. 7.

Caligo a synizesi, S. sp. 19.

Synizesis, V. 240.

4. Caligo ( *humorum* ) ob vitium vel defectum  
humoris aquei.

Glaucoma, V. 241.

Variat pro diverso humoris statu.

Caligo hypoæma, S. sp. 15.

Caligo lactea, S. sp. 16.

Caligo a rhytidosi, S. sp. 17.

Ampliyopia hydrophthalmica, S. sp. 7.

5. Caligo ( *palpebrarum* ) ob vitium palpebris  
inhærens.

Variat pro varietate vitii palpebrarum.

Caligo a symblepharosi, S. sp. 1.

Caligo ab ancyloblepharo, S. sp. 2.

Caligo a blepharoptosi, S. sp. 3.

Caligo a pacheablepharosi, S. sp. 4.

Caligo a lupia, S. sp. 7.

Caligo a sarcomate, S. sp. 8.

Caligo a cancro, S. sp. 9.

G. XCII. AMAUROSIS.

Visus imminutus vel prorsus abolitus, sine  
vitio oculi evidente; plerumque cum pupil-  
la dilatata & immobili.

# CULLENI. CL. IV.

181

Amaurosis, S. G. 155. L. 110. V. 238. *Sag. G.* 261.

Mydriasis, V. 237.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Species sunt.

1. Amaurosis ( *compressionis* ) post causas & cum signis congestionis in cerebro.

Variat pro varietate causæ remotæ.

- Amaurosis pituitosa, S. sp. 2.
- Amaurosis icrophulosa, S. sp. 3.
- Amaurosis plethorica, S. sp. 4.
- Amaurosis intermittens, S. sp. 13.
- Amaurosis exanthematica, S. sp. 11.
- Amaurosis venerea, S. sp. 10.
- Amaurosis traumatica, S. sp. 1.

2. Amaurosis ( *atonica* ) post causas & cum signis debilitatis.

- Amaurosis congenita, S. sp. 5.
- Amaurosis exhaustorum, S. sp. 16.
- Amaurosis rachialgica, S. sp. 14.
- Amaurosis arthritica, S. sp. 17.
- Amblyopia absoluta, S. sp. 6.

3. Amaurosis ( *spasmodica* ) post causas & cum signis spasmi.

- Amaurosis a spasmō, S. sp. 8.
- Amaurosis hysterica, S. sp. 15.

4. Amaurosis ( *venenata* ) a veneno ingesto vel applicato.

- Amaurosis a narcoticis, S. sp. 12.
- Amaurosis foricariorum, S. sp. 9.

## G. XCIV. DYSOPIA.\*

Visus depravatus, ita ut non nisi certa luce, vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clare videantur.

Amblyopia, S. G. 154. Sag. G. 258.

Species sunt :

1. Dysopia ( *tenebrarum* ) in qua non nisi in magna luce objecta videntur.

Amblyopia crepuscularis; S. sp. 1.

2. Dysopia ( *luminis* ) in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.

Amblyopia meridiana, S. sp. 2.

3. Dysopia ( *diffitorum* ) in qua longe distantia non videntur.

Amblyopia diffitorum, S. sp. 3.

Myopia, L. 309.

Myopialis, V. 515.

4. Dysopia ( *proximorum* ) in qua proxima non videntur.

Amblyopia proximorum, S. sp. 4.

Presbytia, L. 308.

5. Dysopia ( *lateralis* ) in qua non nisi oblique posita videntur.

Amblyopia luscorum, S. sp. 5.

G. XCV.

---

\* Verbum *Amblyopia*, quo pro hujus generis nomine utitur SAUVAGESIUS, alio sensu intelligunt tum veteres, tum LINNÆUS, & VOGELIUS; ideoque hujus generis nomen mutare necessarium duxi.



## G. XCV. PSEUDOBLEPSIS.

Vilus depravatus, ita ut quæ non existant homo se videre imaginatur; vel, quæ existunt, aliter videt ac revera se habeant.

Suffusio, S. G. 217. Sag. G. 329.

Phantasma, L. 73. V. 289.

Species sunt,

1. Pseudoblepsis (*imaginaria*) in qua, quæ non existunt, conspici videntur.

Variat pro varietate phantasmatis.

- a. Suffusio myodes, S. sp. 1.
- b. Suffusio reticularis, S. sp. 2.
- c. Suffusio scintillans, S. sp. 3.  
Marmarige, V. 290.
- d. Suffusio coloris, S. sp. 4.  
Hæmalopia, V. 239.

2. Pseudoblepsis (*mutans*) in qua objecta revera existentia aliquomodo mutata apparent.

Variat pro varia objectorum mutatione.

- a. Suffusio metamorphosis, S. sp. 5.
- b. Suffusio nutans, S. sp. 7.
- c. Suffusio dimidiens objecta, S. sp. 6.
- d. Suffusio multiplicans.  
Diplopia, S. G. 218. Sag. G. 330.  
Dysopia, V. 291.

Diplopia iterum variat pro varietate causæ remotæ.

- α. Diplopia pyretica, S. varietas 1.
- β. Diplopia a spasmo, S. Var. 2.
- γ. Diplopia a paralyfi, S. Var. 3.
- δ. Diplopia ab ancyloplepharo, S. Var. 4.
- ε. Diplopia a catarrho, S. Var. 5.
- ζ. Diplopia a debilitate, S. Var. 6.

# GENERA MORBORUM

- 1. Diplopia a contusione, S. Var. 8.
- 2. Diplopia a terrore, S. Var. 9.
- 3. Diplopia a temulentia, S. Var. 10.
- 4. Diplopia remotorum, S. sp. 7.

G. XCVI.

D Y S E C C Œ A.

Auditus imminutus vel abolitus:

- Dyscecœa, S. G. 158. V. 245. Sag. G. 264.
- Cophosis, S. G. 160. L. 112. Sag. G. 266.
- Surditas, V. 247.

Species sunt:

1. Dyscecœa ( *organica* ) ob vitium in organis  
sonos ad internam aurem transmittentibus.

Variat pro varietate vitii & partis affectæ.

- a. Dyscecœa monotonon seu malleorum, S. sp. 1.
- b. Dyscecœa a meatu obstructo, S. sp. 2.  
Cophosis a meatu, S. sp. 1.
- c. Dyscecœa a myringæ atonia, S. sp. 3.  
Cophosis a tympano, S. sp. 4.
- d. Dyscecœa a myringæ duritie, S. sp. 4.
- e. Dyscecœa a myringa perforata, S. sp. 5.
- f. Dyscecœa a timpani fistula, S. sp. 6.
- g. Dyscecœa a hydrotympano, S. sp. 7.
- h. Dyscecœa a tuba obstructa, S. sp. 3.  
Cophosis a tuba, S. sp. 3.
- i. Dyscecœa syphilitica.  
Cophosis syphilitica.  
Cophosis congenita, S. sp. 3.

2. Dyscecœa ( *atonica* ) sine organorum sonos  
transmittentium vitio evidente.

Variat pro varietate causæ.

- a. Cophosis critica, S. sp. 2.  
Dyscecœa febrilis.
- b. Cophosis a comate, S. sp. 7.
- c. Cophosis serosa, S. sp. 6.
- d. Cophosis a steatmate, S. sp. 9.

G. XCVII.

## G. XCVII. PARACUSIS.

## Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159. Sag. G. 265.

Syrigmus, S. G. 159. Sag. G. 265.

## Species sunt:

1. Paracusis ( *imperfecta* ) in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.

## Variat,

- a. Cum auditu gravi.

Paracusis barycœa, S. sp. 1.

- b. Cum auditu nimis sensibili.

Paracusis oxycœa, S. sp. 2.

- c. Cum sono unico externo a causis internis duplicato.

Paracusis duplicata, S. sp. 3.

- d. Soni quos homo audire velit, nisi sono alio vehementi simul excitato non audiuntur.

Paracusis Willifiana, S. sp. 4.

2. Paracusis ( *imaginaria* ) in qua soni extrinsecus non existentes ab internis causis excitantur.

Syrigmus, S. G. 219. Sag. G. 231.

Syringmos, L. 72.

Sufurrus, V. 292.

## Variat pro varietate soni percepti.

- a. Syrigmus sibilus, S. sp. 4.

- b. Syrigmus sufurrus, S. sp. 5.

- c. Syrigmus bombus, S. sp. 11.

## Variat etiam pro varietate causæ remotæ.

- d. Sy-

- d. Syrignus a debilitate, S. sp. 1.
- e. Syrignus criticus, S. sp. 2.
- f. Syrignus plethoricus, S. sp. 3.
- g. Syrignus vertiginosus, S. sp. 10.
- h. Syrignus cephalalgicus, S. sp. 6.
- i. Syrignus a ventriculo, S. sp. 7.
- k. Syrignus catarrhalis, S. sp. 8.
- l. Syrignus ab oxycœa, S. sp. 9.

## G. XCVIII. ANOSMIA.

Olfactus imminutus vel abolitus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248. Sag. 262.

Species sunt:

1. Anosmia ( *organica* ) ob vitium in membrana nares internas investiente.

Variat pro varietate vitii.

Anosmia catarrhalis, S. sp. 1.

Anosmia a siccitate, S. sp. 6.

Anosmia a polypo, S. sp. 3.

Anosmia ab ozæna, S. sp. 2.

Anosmia syphilitica, S. sp. 4.

Anosmia verminosa, S. sp. 5.

2. Anosmia ( *atonica* ) sine vitio membranæ narium evidente.

Anosmia paralytica, S. sp. 7.

## G. XCIX. AGHEUSTIA.

Gustus imminutus vel abolitus.

Agheustia, S. G. 157. Sag. G. 263.

Agheustia, L. 114.

Apogeusis, V. 449.

Species sunt,

1. Agheustia ( *organica* ) ob vitium in membrana linguæ, a nervis sapida arcens.

Agheustia febrilis, S. sp. 1.

2. Aghea.



2. Agheusia ( *atonica* ) sine vitio linguæ evidente.

Agheusia paralytica, S. sp. 2.

G. C. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel abolitus,

Anæsthesia, S. G. 161. L. 118. Sag. G. 267.

Anodynia, V. 274.

Sequentes species a SAUVAGESIO recensentur ;  
& , cum de iis mihi non satis liqueat, ni-  
hil mutare volui .

Anæsthesia a spina bifida, S. sp. 1.

Anæsthesia plethorica, S. sp. 2.

Anæsthesia nascentium, S. sp. 3.

Anæsthesia melancholica, S. sp. 4.

O. II. DYSOREXIÆ.\*

Appetitus erroneus vel deficiens.

Sect. I. APPETITUS ERRONEI.

Morositates, S. G. VIII. O. II. Sag. Cl. XIII. O.  
II.

Pathetici, L. Cl. V. O. II.

Hyperæstheses, V. Cl. VII.

G. Cl. BULIMIA.

Appetitus esculentorum majori copia , quam  
quæ digeri possit.

Bulimia, S. G. 223. L. 79. Sag. 335.

Bulimus, V. 296.

Ad-

---

\* *Morositates* SAUVAGESII minus recte ad *Ves-*  
*niarum* classem referri ; supra dixi ; & nunc ad locales  
detuli . Recte, ni fallor ; cum dysorexiæ fere omnes ma-  
nifesto partis singularis , potius quam totius corporis, af-  
fectiones sint . Nostalgia sola , si quidem revera morbus  
sit , minime pro locali haberi potest : sed morbum incer-  
tum a cæteris dysorexiis separare non bene potui .

Addephagia, V. 297.

Cynorexia, V. 298.

Species Idiopathicae sunt :

1. *Culimia* ( *belluonum* ), sine morbo ventriculi, cibi majorem solita copiam appetens.

*Bulimia esurigio*, S. sp. 4.

Addephagia, V. 297.

2. *Bulimia* ( *syncopalis* ) cibum frequenter appetens, ob sensum famis syncopem minitantis.

*Bulimia cardialgica*, S. sp. 2.

*Bulimus*, V. 296.

3. *Bulimia* ( *emetica* ) cibum magna copia appetens, & mox per vomitum rejiciens.

*Bulimia canina*, S. sp. 1.

Cynorexia, V. 298.

Species symptomaticae sunt,

*Bulimia verminosa*, S. sp. 3.

*Bulimia addephagia*, S. sp. 5.

*Bulimia convulforum*, S. sp. 6.

*Bulimia ab acidis*, S. sp. 7.

## G. CII. POLYDIPSIA.

Appetitus majoris solita copiae potulentorum :

Polydipsia, S. G. 224. L. 80. V. 275. Sag. G. 336.

Polydipsia fere semper symptomatica est, & variat tantum pro varietate morborum quos comitatur; hinc

Polydipsia febrilis, S. Var. 2.

Polydipsia hydropica, S. Var. b.

Polydipsia fluxuum, S. Var. c.

Polydipsia a venenis, S. Var. d.

## G. CHH. P I C A.

Desiderium non esculenti ingerendi.

Pica, S. G. 222. Sag. G. 334.

Citta, L. 78.

Allotriophagia, V. 299.

Malacia, V. 300.

Cum de speciebus *pica* mihi non satis liqueat;  
sequentes ex SAUVAGESIO recensco.

Pica infantilis, S. sp. 1.

Pica chlorosiantium, S. sp. 2.

Pica malacia, S. sp. 3.

Pica abscorbutorum, S. sp. 4.

Pica voluntaria, S. sp. 5.

## G. CIV. S A T Y R I A S I S.

In maribus effrænis veneris cupiditas.

Satyriasis, S. G. 228. L. 81. Sag. G. 340.

Satyriasm pro specie maniae habet VOGELIUS.

Species sunt :

Satyriasis ( *juvenilis* ) cum veneris cupiditate  
præter modum vehementi, corpore simul  
parum perturbato.

Satyriasis neogamorum, S. sp. 5.

2. Satyriasis ( *furens* ) cum veneris cupiditate  
effræni, corpore simul multum perturbato.

Satyriasis acuta, S. sp. 1. *Aretæi Cappad.* Acut. Lib.  
II. cap. 12.

Satyriasis chronica, S. sp. 2. ad priapismum  
pertinet; & Satyriasis venerea, S. sp. 3. nec  
non satyriasis hydrophobica, S. sp. 4. ma-  
nifesto symptomatica est.

## G. CV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effræne veneris desiderium.

Nymphomania, S. G. 229. Sag. G. 341.

Satyriasis. L. 81.

Furorem uterinum pro specie maniae habet VOGELIUS.

Nymphomania species unica est, & gradu tantum varians. hinc

Nymphomania salacitas, S. sp. 1.

Nymphomania furibunda, S. sp. 2.

Nymphomania fervor uteri, S. sp. 3.

Nymphomania pruriginosa, S. sp. 4.

## G. CVI. NOSTALGIA.

In absentibus a patria, vehemens eandem revisendi desiderium.

Nostalgia, S. G. 226. L. 83. Sag. G. 338.

Nostalgiam pro specie melancholiae habet VOGELIUS.

Species sunt:

1. Nostalgia (*simplex*) sine alio morbo.

Nostalgia simplex, S. sp. 1.

2. Nostalgia (*complicata*) aliis morbis comitata.

Nostalgia complicata, S. sp. 2.

## Sect. H. APPETITUS DEFICIENTES.

Anepithymiae, S. Cl. VI. O. H. Sag. IX. O. H.

Privativi, L. Cl. VI. O. III.

Adynamiae, V. Cl. VI.

## G. CVII. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum deficiens.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. V. 279. Sag. G. 268.



Omnis anorexia mihi symptomatica esse videtur, & variat tantum pro varietate morbi quem comitatur. Species quidem omnes, quotquot a SAUVAGESIO fuerant recensitæ, ad genus dyspepsiæ supra retuli; sed fortassis utile hic erit easdem seorsum, & rectius ordinatas, iterum recensere.

Species sunt,

1. Anorexia ( *humoralis* ) ab humore ventriculi gravante.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Anorexia biliosa, S. sp. 6.

Anorexia a saburra, S. sp. 9.

2. Anorexia ( *atonica* ) ob tonum fibrarum ventriculi amissum.

Anorexia paralytica, S. sp. 1.

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia melancholica, S. sp. 5.

Anorexia cachectarum, S. sp. 7.

Anorexia arthritica, S. sp. 12.

Anorexia febrilis, S. sp. 4.

Incertæ naturæ sunt,

Anorexia plethorica, S. sp. 3.

Anorexia mirabilis, S. sp. 10.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

Anorexia Stevvartiana, S. sp. 13.

G. CVIII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum suppressio, five sitis feriatio.

Adipsia, S. G. 163. L. 117. V. 281. Sag. G. 269.

Adipsiam sine alio morbo, qualis est

Adipsia primaria, S. sp. 1.

Pro morbo habere nollem; omnemque adipsam pro sympathica, sive symptomate morbi cujusdam, sensorium commune afficientis, habeo; ideoque non ad locales referendi.

G. CIX. ANAPHRODISIA.

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164. Sag. G. 270.

Atechnia, L. 119.

Agnesia, V. 283.

Species veræ sunt.

Anaphrodisia paralytica, S. sp. 1.

Anaphrodisia gonorrhoeica, S. sp. 2.

Species spurix, sive veneris rite exercendæ impedimenta, sunt:

Anaphrodisia a mariscis, S. sp. 4.

Anaphrodisia ab urethræ vitio, S. sp. 5. \*

Pro ficta & falsa habenda est

Anaphrodisia magica, S. sp. 3.

O. III. DYSCINESIÆ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

Dyscinesiæ, S. Cl. VI. O. III. Sag. Cl. IX. O. III.

G. CX. A P H O N I A.

Vocis plena suppressio, citra coma aut syncope.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253. Sag. G. 272.

Species sunt:

I. Apho-

---

\* Ad dyspermatismi genus pertinet.

1. Aphonia ( *gutturalis* ) a tumefactis faucibus & glottide.

Aphonia catarrhalis, S. sp. 4. Anginosa Morgagni.

2. Aphonia ( *trachealis* ) a compressa trachea.

Aphonia aneurysmatica, S. sp. 5.

Aphonia pulmonica, S. sp. 9.

3. Aphonia ( *atonica* ) a nervis laryngis resectis.

Aphonia traumatica, S. sp. 6.

Sequentes symptomaticæ esse videntur.

Aphonia melancholica, S. sp. 1.

Aphonia paralytica, S. sp. 8.

Aphonia temulentorum, S. sp. 3.

Aphonia hysterica, S. sp. 7.

Aphonia ab antipathia, S. sp. 2.

## G. CXI. MUTITAS.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. G. 185. V. 257. Sag. G. 271.

Species sunt,

1. Mutitas ( *organica* ) ex lingua ablata ve vitiata.

Mutitas elinguium, S. sp. 4.

Mutitas a siccitate, S. sp. 5.

2. Mutitas ( *atonica* ) ex nervis linguæ laxis.

Mutitas traumatica, S. sp. 2.

3. Mutitas ( *furdorum* ) ex surditate congenita, vel puerilibus annis aborta.

Mutitas furdorum, S. sp. 8.

Sequentes symptomaticæ sunt.

Mutitas a glossocèle, S. sp. 1.

Mutitas a narcoticis, S. sp. 3.

Mutitas spasmodica, S. sp. 6.

Mutitas proæretica, S. sp. 7.

## G. CXII. PARAPHONIA.

Vocis sonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.

Cacophonia, Sag. G. 274

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Asaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhenophonia, V. 256.

Species sunt,

1. Paraphonia ( *puberum* ) in qua, circa pubertatis tempus, vox ab acutiori & suavi in graviolem & ingratam mutatur.

Paraphonia puberum, S. sp. 1.

2. Paraphonia ( *rauca* ) in qua, ob siccitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca & scabra.

Paraphonia catarrhalis, S. sp. 3.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 250.

3. Paraphonia ( *resonans* ) in qua, ob obstru-ctas nares, vox fit rauca, cum sonitu per nares sibilante.

Paraphonia nasalís, S. sp. 2.

Paraphonia a polypo, S. sp. 8.

Rhenophonia, V. 256.

4. Paraphonia ( *palatina* ) in qua, ob deficientem vel divisam uvulam, plerumque cum la-



labio leporino, vox fit rauca, obscura, & ingrata.

Paraphonia gutturalis, S. sp. 5.

Asaphia, V. 250.

5. Paraphonia ( *clangens* ) in qua vox in acutam, clangentem, & exilem mutatur.

Paraphonia ulcerosa, S. sp. 4.

Paraphonia sibilans, S. sp. 7.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

6. Paraphonia ( *comatosa* ) in qua, ob laxatum velum palati & glottidem, sonus inter inspirandum editur.

Paraphonia stertens, S. sp. 6.

## G. CXIII. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. G. 167. L. 138. Sag. G. 273.

Psellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ischnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

Species sunt,

1. Psellismus ( *hesitans* ) in quo sermonis verba, præsertim prima, non facile proferuntur, & non nisi prima syllaba sæpius repetita.

Psellismus ischnophonia, S. sp. 1.

Ischnophonia, V. 201.

Battarismus, V. 261.

2. Psellismus ( *ringens* ) in quo sonus literæ R. semper aspiratur, & quasi geminatur.

Psellismus rottacismus, S. sp. 2.

Traulotis five, blæfitas, V. 258.

3. Psellismus ( *lallans* ) in quo sonus literæ L. fit liquidior, vel loco literæ R. pronuntiatur.

Psellismus lamdacismus, S. sp. 3.

4. Psellismus ( *emolliens* ) in quo literæ duræ in molliores mutantur, & litera S. multum usurpatur.

Psellismus traulotes, S. sp. 4.

3. Psellismus ( *balbutiens* ) in quo, ob linguam magnam vel tumefactam, literæ labiales magis audiuntur, & sæpe loco aliarum proferuntur.

Psellismus balbuties, S. sp. 5.

Psellismus a ranula, S. sp. 11.

6. Psellismus ( *acheilos* ) in quo literæ labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.

Psellismus mogilalia, S. sp. 6.

7. Psellismus ( *lagostomatum* ) in quo, ob divisum palatum, literæ gutturales minus recte pronunciantur.

Psellismus lagostomatum, S. sp. 10.

Psellismus cotacismus, S. sp. 8.

#### G. CXIV. STRABISMUS.

Oculorum axes optici non convergentes.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514. Sag. G. 222.

Species sunt,

1. Strabismus ( *habitualis* ) a consuetudine prava oculo tantum uno utendi.

Strabismus vulgaris, S. sp. 2.

1. Strab-

2. Strabismus ( *commodus* ) ab unius oculi præ altero debilitate vel mobilitate majori , adeo ut uterque oculus non commode adhibeatur .

Strabismus Buffonii , S. sp. 3.  
Strabismus spasmodicus , S. sp. 4.  
Strabismus paralyticus , S. sp. 5.  
Strabismus catarrhalis , S. sp. 6.

3. Strabismus ( *necessarius* ) ob mutatum situm vel figuram partium oculi .

Strabismus a luscitate , S. sp. 1.  
Strabismus caligantium , S. sp. 11.  
Strabismus a crystallino , S. sp. 12.  
Strabismus myopum , S. sp. 9.

De Strabismo æquinoctiali mihi non liquet .

Minus recte , ut mihi videtur , ad Strabismum referuntur sequentes .

Strabismus symptomaticus , S. sp. 7.  
Strabismus lagophthalmos , S. sp. 8.

# G. CXV, D Y S P H A G I A .

Molestia deglutionem impediens sine respirationis læsione vel phlegmasia .

Dysphagia , S. G. 199. Sag. G. 216.

Acatapolis , V. 149.

Species a SAUVAGESIO recensitæ sunt ,

1. Dysphagia spasmodica .

2. ——— hysterica .

3. ——— paralytica .

4. ——— pharyngea .

5. ——— œsophagea .

6. ——— lactentium .

7. ——— tussiculosa .

8. ——— hydrophobica .

9. ——— nauseosa .

- 10. ——— a deglutitis.
- 11. ——— a datura.
- 12. ——— a sarcomate.
- 13. ——— ab scirrho.
- 14. ——— canina.
- 15. ——— valsalviana.
- 16. ——— aneurysmatica.
- 17. ——— a labario.
- 18. ——— a siccitate.
- 19. ——— ab hypostaphyle.

## G. CXVI. CONTRACTURA.

Artus unius vel plurium contractio diuturna,  
rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299. Sag. G. 225.

Obstipitas, S. G. 11.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

Species sunt,

1. Contractura ( *primaria* ) a musculis contractis, rigidis.

2. A musculis ab inflammatione rigidis.

Contractura dolorifica, S. sp. 2.

Contractura arthritica, S. sp. 7.

Contractura catarrhalis, S. G. 8.

Obstipitas catarrhalis, S. sp. 3.

b. A musculis a spasmō rigidis.

Contractura spasmodica, S. sp. 11.

Obstipitas spasmodica, S. sp. 6.

Obstipitas renuens, S. sp. 1.

Obstipitas lateralis, S. sp. 5.

Contractura hypochondriaca, S. sp. 1.

c. A musculis, ob antagonistas paralyticos, contractis.

Contractura paralytica, S. sp. 4.

Contractura rachialgica, S. sp. 5.

Contractura Bohemica, S. sp. 6.



Obstipitas annuens. S. sp. 2.

d. A musculis ab acrimonia irritante contractis.

Contractura scorbutica, S. sp. 3.

2. Contractura (*articularis*) ob artus rigidos,

Contractura anchylosis, S. sp. 9.

Contractura syphilitica, S. sp. 10.

Obstipitas gibbosa, S. sp. 4.

#### O. IV. APOCENOSES.

Fluxus sive sanguis, aut humores alii, solito uberius profluens, sine pyrexia impetue fluidorum aucto.

Apocenoles, V. Cl. II. O. II.

Fluxus, S. Cl. IX. *Sag.* Cl. V.

Morbi evacuatorii, L. Cl. IX.

#### G. CXVII. PROFUSIO.

Fluxus sanguinis.

Profusio, L. 239.

Hæmorrhagia, V. 81. *Boerh.* 218.

Ex sanguifluxibus a SAUVAGESIO recensitis sequentes ad hunc locum pertinere videntur.

Hæmorrhagia passiva, S. sp. 1.

Hæmoptylis traumatica, S. sp. 12.

Hæmatemesis traumatica, S. sp. 3.

Hæmaturia traumatica, S. sp. 14.

Hæmaturia violenta, S. sp. 2.

Hæmorrhagia ab hirudine, S. sp. 7.

Hæmoptylis ab hirudine, S. sp. 13.

Hæmatemesis ab hirudine, S. sp. 4.

## G. CXVIII. EPHIDROSIS.\*

Sudoris præter naturam evacuatio.

5

Ephidrosis, S. G. 258. Sag. G. 194.

Sudor, L. 208.

Hydropedesis, V. 121.

Species idiopathicæ unica est

Ephidrosis spontanea, S. sp. 1.

Ephidroses symptomaticæ variant, pro varietate morbi quem comitantur, & simul pro varietate sudoris elicitæ, & quodammodo pro varietate partis maxime sudantis. Hinc

Ephidrosis febrilis, S. sp. 3.

Ephidrosis febricola, S. sp. 7.

Ephidrosis hectica, S. sp. 5.

Ephidrosis exanthematum, S. sp. 6.

Ephidrosis syncoptica, S. sp. 4.

Ephidrosis scorbutica, S. sp. 2.

Ephidrosis a saburra, S. sp. 18.

Ephidrosis lactea, S. sp. 9.

Ephidrosis mellea, S. sp. 10.

Ephidrosis vinosa, S. sp. 11.

Ephidrosis viridis, S. sp. 12.

Ephidrosis nigra, S. sp. 13.

Ephidrosis lutea, S. sp. 14.

Ephidrosis urinosa, S. sp. 15.

Ephidrosis cruenta, S. sp. 16.

Ephidrosis cærulea, S. sp. 17.

Ephidrosis acida, S. sp. 19.

Ephidrosis arenosa, S. sp. 20.

Ephidrosis lateralis, S. sp. 8.

G. CXIX.

---

\* Ephidrosin minus recte ad morbos locales relatam esse agnosco; cum autem huic morbo nullum in systemate nostro locum idoneum invenerim, ne prorsus omitteretur, hic cum aliis quodammodo affinis morbis evacuatoriis recensui.

## G. CXIX. EPIPHORA.

Fluxus humoris lacrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99. Sag. G. 195.

Ex speciebus a SAUVAGESIO recensitis nulla  
pro idiopathica haberi potest, nisi

Epiphora frigida, S. sp. 8.

Cæteræ omnes symptomaticæ sunt.

Epiphora a pathemate, S. sp. 1.

Epiphora ophthalmica, S. sp. 3.

Epiphora calida, S. sp. 9.

Epiphora ex variolis, S. sp. 4.

Epiphora arthritica, S. sp. 12.

Epiphora cruenta, S. sp. 10.

Epiphora ex rhyade, S. sp. 2.

Epiphora ex æglope, S. sp. 5.

Epiphora ab ectropio, S. sp. 6.

Epiphora ab anchylope, S. sp. 7.

Epiphora sebacea, S. sp. 11.

Epiphora lactea, S. sp. 13.

## G. CXX. PTYALISMUS.

Fluxus salivæ.

Ptyalismus, S. G. 261. L. 176. V. 103. Sag. G. 197.

Si quis ptyalismus idiopathicus fit, pro eo habere vellem.

Ptyalismum a laxitate, S. sp. 4.

Sequentes omnes symptomaticæ sunt,

Ptyalismus nauseosus, S. sp. 1.

Ptyalismus hypocondriacus, S. sp. 8.

Ptyalismus gravidarum, S. sp. 14.

Ptyalismus a pyrofi, S. sp. 2.

Ptyalismus Lapponicus, S. sp. 3.

Ptyalismus febrilis, S. sp. 18.

Ptyalismus variolosus, S. sp. 6.

Ptyalismus arthriticus, S. sp. 9.

Ptya-

Ptyalismus phthiricus, S. sp. 10.

Ptyalismus scorbuticus, S. sp. 7.

Ptyalismus catarrhalis, S. sp. 15.

Ptyalismus aphthosus, S. sp. 13.

Ptyalismus a carie, S. sp. 16.

Ptyalismus purulentus, S. sp. 12.

Ptyalismus a calculo, S. sp. 17.

Ptyalismus syphiliticus, S. sp. 19.

Ptyalismus viridis, S. sp. 11.

Ptyalismus urinosus, S. sp. 20.

Ptyalismus mercurialis, S. sp. 5.

### G. CXXI. ENURESIS.

Urinæ e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113. Sag. G. 200.

Species sunt,

I. Enuresis (*atonica*) post morbos sphincterem vesicæ lædentes.

Enuresis herniosorum, S. sp. 4.

Enuresis puerperarum, S. sp. 5.

Enuresis calculosa, S. sp. 7.

Enuresis a fistula, S. sp. 8.

2. Enuresis (*irritata*) a compressione vel irritatione vesicæ.

Enuresis gravidarum, S. sp. 4.

Enuresis catamenialis, S. sp. 6.

Enuresis a sparganosi, S. sp. 9.

Symptomatica est,

Enuresis paralytica, S. sp. 2.

Pro morbo non haberi potest

Enuresis infantum, S. sp. 1.

### G. CXXII. GONORRHOEA.

Humoris ex urethra in maribus, cum vel absque libidine, præter naturam fluxus.

Go-



Species sunt ,

1. Gonorrhœa (*pura*) in qua , prægresso concubitu impuro nullo , humor puriformis , sine dysuria vel libidine , ex urethra subinde fluit .

Gonorrhœa pura , S. sp. 1.

Gonorrhœa benigna *Auctorum* .

2. Gonorrhœa (*impura*) in qua , post concubitum impurum , humor puriformis cum dysuria ex uretra fluit .

Gonorrhœa syphilitica , S. sp. 4.

Gonorrhœa maligna *Auctorum* .

Hujus sequela est

Gonorrhœa (*mucosa*) , in qua post gonorrhœam impuram humor mucosus cum minima vel nulla dysuria ex urethra subinde fluit .

Anglis , a GLEET .

3. Gonorrhœa (*laxorum*) , in qua humor plerumque pellucidus , sine penis erectione , sed cum libidine , in vigilante , ex urethra subinde fluit .

Gonorrhœa libidinosa , S. sp. 1.

4. Gonorrhœa (*dormientium*) , in qua liquor seminalis cum erectione & libidine in dormientibus , ex somno libidinoso , ejicitur .

Gonorrhœa oneirogonos , S. sp. 3.

Species spurix , utpote in quibus ex urethra fluxus non sit .

Gonorrhœa spuria , S. sp. 5. *Astruc* , lib.3. c.3. §. 2.  
Go-

Gonorrhœa balani, S. sp. 6.

## O. V. EPISCHESES.

### Excernendorum suppressiones.

Epischeses, V. CL. III.

Suppressorii, L. Cl. VII. O. II.

Suppressiones, Sag. Cl. VI.

## G. CXXIII. OBSTIPATIO.

Dejectio fœcum nulla, vel solito rarior?

Obstipatio, L. 166. V. 128. Sag. G. 221.

Species sunt,

1. Obstipatio (*debilium*) in hominibus laxis, debilibus, & plerumque dyspepticis.
2. Obstipatio (*rigidorum*) in hominibus fibræ rigidæ sæpe hypochondriacis.
3. Obstipatio (*obstructorum*) cum symptomatis Colicæ 1mæ, 2dæ, 4tæ, vel 7mæ supra diætæ.

## G. CXXIV. ISCHURIA.

Urinæ suppressio absoluta.

Ischuria, S. G. 293. L. 167. V. 129. Sag. G. 212.  
*Home's Clinical experiments*, sect. XV. Lond.  
 Med. Obs. V. Append.

Species sunt,

1. Ischuria (*renalis*) prægresso renum morbo, cum dolore vel molesto gravitatis sensu in regione renum, & sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causæ: hinc \*

- a. *Nephritica*, a renum inflammatione, S. sp. 1.
  - b. *Nephrolithica*, a renum calculo, S. sp. 2. Edinb. Med. Ess. II. 31.
  - c. *Nephroplethorica*, a plethora, S. sp. 3.
  - d. *Lunatica*, *periodica*, S. sp. 4.
  - e. *Nephrospastica*, *spasmodica*, S. sp. 5.
  - f. *Nephrelmintica*, *verminosa*, S. sp. 6.
  - g. *Nephrothromboides*, a sanguine conglumato, S. sp. 7.
  - h. *Nephropyica*, a renum purulentia, S. sp. 8.
  - i. *Nephrophlegmatica*, *puititosa*, seu *mucosa*, S. sp. 9.
  - k. *Nephroplegica*, *paralytoda*, S. sp. 10.
  - l. *Suppleta*, ab alia evacuatione suppleta, S. sp. 11.
2. *Ischuria (ureterica)* prægresso renum morbo, cum doloris vel molestiæ sensu in quadam ureteris parte, & sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causæ: hinc

- a. *Ureteritica*, inflammatoria, S. sp. 12.
- b. *Ureterolithica*, calculosa, S. sp. 13.
- c. *Ureterothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 14.
- d. *Ureterophlegmatica*, a pituita, S. sp. 15.
- e. *Ureteropyica*, purulenta, S. sp. 16.
- f. *Ureterostomatica*, ab orificii ureterum inferioris clausura, S. sp. 17.

3. *Ischu*

---

\* Doctissimi CUSSONI Collectanea egregia de ischuria, licet ad leges nosologiæ methodicæ minus confecta, non prorsus omittenda putavi. Simul autem metuens, ne iis in hoc secundo tomo locus commodus esset, in tomo primo cum systemate SAUVAGESIANO inserui. Cum vero hic specierum ischuriæ characteres nosologicos dare volui, ut tota res sub uno conspectu appareret, species CUSSONI summatim hic repetere placuit. Loca autem auctorum, in quibus ischuriæ varia exempla inveniri possunt, ex primo tomo adhuc petenda sunt.

3. *Ischuria (vesicalis)* cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicæ, & frequenti ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causæ: hinc

- a. *Cystitica*, a vesicæ inflammatione, S. sp. 18.
- b. *Cystolithica*, a vesicæ calculo, S. sp. 19.
- c. *Cystospastica*, a sphincteris vesicæ spasmō, S. sp. 20.
- d. *Cystoplegica*, a vesicæ paralyfi, S. sp. 21.
- e. *Polyurica*, a vesica distenta lotio diutius cohibita. S. sp. 22.
- f. *Cystopyica*, purulenta, S. sp. 23.
- g. *Cystothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 24.
- h. *Cystophlegmatica*, a muco, S. sp. 25.
- i. *Ectocystica*, a vesicæ ectopia, S. sp. 26.
- k. *Cystoproctica*, ab intestino recto scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abcessu, hæmorrhoidibus, turgente, S. sp. 27.
- l. *Hystercystica*, ab utero, S. sp. 28.
- m. *Arretarum*, a menstruis in vagina retentis. S. sp. 29.
- n. *Paradoxa*, S. sp. 30.

4. *Ischuria (urethralis)* cum tumore hypogastrii, frequenti ad mingendum stimulo, & dolore in aliqua parte urethræ.

Variat pro varietate causæ; hinc

- a. *Perinæalis*, a perinæi tumore, S. sp. 31.
- b. *Urethrolithica*, a calculo urethræ impactō, S. sp. 32.
- c. *Urethrophlegmatica*, a muco urethram infarciēte, S. sp. 33.
- d. *Urethrothromboides*, a sanguinis grumo urethram opplente, S. sp. 34.
- e. *Urethropyica*, a pure urethram obstruente, S. sp. 35.
- f. *Urethrobymenodes*, a membrana in urethram impacta, S. sp. 36.
- g. *Urethrelmintica* verminosa, S. sp. 37.
- h. *Urethritica*, ab urethræ inflammatione, S. sp. 38.
- i. *Carunculosa*, a morbis ut vocant urethræ, S. sp. 39.
- k. *Hydrocelodes*, ab urethræ ruptura in scrotum hiantē. S. sp. 40.

l. *Cry-*

- l. *Cryptopyca*, a penis intra corpus retractione, S. sp. 41.
- m. *Peridesmica*, a vinculo strictiori peni injecto, S. sp. 42.
- n. *Phimofica*, a phimosi, S. sp. 42.
- o. *Aspadialis*, ab urethræ clausura, S. sp. 44.

G. CXXIV. DYSURIA.

Dolorifica & quodammodo impedita urinæ emissio.

Dysuria, S. G. 265. L. 57. V. 164. Sag. G. 213.  
Stranguria *Auctorum*.

Species sunt,

1. Dysuria (*ardens*) cum ardore urinæ sine morbo vesicæ evidente.

Dysuria primaria, S. sp. 5.

Dysuria a cantharidibus ingestis vel applicatis.

Dysuria arsuræ, S. sp. 7.

Dysuria neonympharum, S. sp. 14.

2. Dysuria (*spasmodica*) a spasmo ex aliis partibus cum vesica communicato.

Dysuria hysterica, S. sp. 1.

Dysuria rachialgica, S. sp. 11.

Dysuria diabética, S. sp. 17.)

Dysuria rachialgica, S. sp. 3.

3. Dysuria (*compressionis*) a vicinis partibus vesicam prementibus.

Dysuria gravidarum, S. sp. 13.

Dysuria a cystocele, S. sp. 8.

Dysuria ab hysterologia, S. sp. 10.

Dysuria atretarum, S. sp. 16.

4. Dysuria (*phlogistica*) a vicinis partibus inflammatis.

Dysuria ab hysteritide, S. sp. 9.

Dysuria hæmorrhoidalis, S. sp. 6.



Dysuria venerea, S. sp. 4.

Dysuria a caruncula, S. sp. 5.

5. Dysuria (*irritata*) cum signis calculi vesicalis.

Dysuria calculosa, S. sp. 12.

6. Dysuria (*mucosa*) cum excretionem muci copiosa.

Glus, L. 200.

Pyuria mucosâ, S. sp. 6.

Pyuria viscida, S. sp. 5.

Rarus vesicæ morbus, Hoffm. T. IV. consult. Med. Centor. II. cas. XCII.

Catarrhus vesicæ Lieutaud. Syn. p. 272.

Pyuria arthritica, S. sp. 9.

De dysuria ab infectis, S. sp. 15. mihi non satis liquet.

G. CXXV. DYSPERMATISMUS.

Seminis in actu venereo tarda, impedita, & ad generationem insufficiens emissio.

Dyspermatismus, S. G. 260.

Sterilitas, L. 171. Sag. G. 211.

Agenesia, V. 203.

Species sunt,

1. Dyspermatismus (*urethralis*) a morbis urethræ, S. sp. 1.

2. Dyspermatismus (*nodosus*) a nodis corporum cavernosorum, S. sp. 2.

3. Dyspermatismus (*præputialis*) ab angustiori præputii orificio, S. sp. 3.

4. Dyspermatismus (*mucosus*) a muco urethram infarciente, S. sp. 4.

5. Dys-

5. Dyspermatismus (*hypertonicus*) a validiori penis erectione, S. sp. 5. Edinb. Ess. I. 35.
  6. Dispermatismus (*epilepticus*) ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente, S. sp. 6.
  7. Dyspermatismus (*apractodes*) a genitalium ignavia, S. sp. 7.
  8. Dyspermatismus (*refluus*), in qua nulla feminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam, S. sp. 9.
- De dyspermatismo seroso, S. sp. 8. mihi non satis constat.

G. CXXVII. AMENORRHOEA.

Menses tempore quo fluere solent, vel solito parciore, vel non omnino fluentes, citra graviditatem.

Amenorrhœa, V. 130.

Dysmenorrhœa, L. 108. Sag. G. 218.

Species sunt,

1. Amenorrhœa (*emanationis*) in puberibus quibus post fluxus tempus solitum menses non jam prodierint, & cum simul variæ affectiones morbidæ adsint.
2. Amenorrhœa (*suppressionis*) in adultis, quibus menses, quæ jam fluere solebant, suppressæ sunt.
4. Amenorrhœa (*difficilis*), in qua menses parcius & cum dolore fluunt.

Menorrhagia difficilis, S. sp. 1.

O. VI. TUMORES.

Partis magnitudo aucta sine phlogosi.

Tomb. 11.

O

Tu-

Tumores protuberantes, L. Cl. X. O. V.

G. CXXVIII. ANEURYSMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurysma, S. G. 32. L. 282. V. 408. *Sag.* G. 35.

G. CXXIX. VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. L. 33. L. 282. V. 407. *Sag.* G. 36.

G. CXXX. ECCHYMOA.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451. *Sag.* G. 5.

Sugillatio, L. 230.

G. CXXXI. SCIRRHUS.

Partis plerumque glandulæ, tumor durus, non dolens, ægre suppurans.

Scirrhus, S. G. 14. L. 283. V. 374. *Sag.* G. 19.

*Boerb.* 392.

G. CXXXII. CANCER.

Tumor scirrhodeus dolens in ulcus mali moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerb.* 492. *Sag.* G. 25.

G. CXXXIII. BUBO.

Glandulæ conglobatæ tumor suppurans.

Bubo, L. 271.

Bubo, S. G. 16. V. 368. *Sag.* G. 21.

Parotis, S. G. 77. V. 370. *Sag.* G. 22.

G. CXXXIV. SARCOMA.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 73. L. 294. V. 376. *Sag.* G. 28.

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

G. CXXXV. V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426. *Sag.* G. 30.

G. CXXXVI. C L A V U S.

Cuticulæ crassities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus five Tylloma. V. 429.

G. CXXXVII. L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis, non dolens.

Lupia, S. G. 37. *Sag.* G. 40.

Atheroma, L. 285.

Encýstis, V. 420.

G. CXXXVIII. G A N G L I O N.

Extuberatio durior, mobilis, tendini insidens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. CXXXIX. H Y D A T I S.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34. *Sag.* G. 38.

Phlyctæna, L. 273. V. 442.

G. CXL. H Y D A R T H R U S.

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentissimus, & mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

Anglis, a WHITE SWELING.

Reimarus de fungo articulorum, Leid. 1757.

Cheston Path. Inq. Chap. V.

Edinb. Ess. IV. 18. 19. 20.

G. CXLI. E X O S T O S I S.

Tumor durus ossi insidens.

Exostosis, S. G. 29. L. 290. V. 417. *Sag.* G. 34.

Hyperostosis, V. 418.

O. VII. ECTOPIÆ\*

Pars ex sua sede dimota tumorem faciens,

Ectopiæ, S. Cl. I. O. VI. *Sag.* Cl. I. O. VI.

G. CXLII. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute & aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXIII. PROLAPSUS,

Partis mollis ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus & procidentia, *Gaub.* Pathol.

G. CXLIV. LUXATIO.

Os ex sua in juncturis sede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60. *Sag.* G. 67.

Dialtasis, S. 61. *Sag.* G. 68.

Luxatura, L. 237.

O. VIII. DYALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagæ, S. Cl. I. O. VII. *Sag.* Cl. II.

Vitia dialytica & solutiones continui, L. Cl. XI.

O. II.

Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.

Disolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXLV. VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro moto.

Val-

---

\* Ectopiarum genera & species quantum ad pathologiam pertinent, opera solertissimi CUSSONI, enumerata in primo hujus synopsis tomo, inveniri, & summo cum fructu perlegi possunt.



# CULLENI CL. IV.

213

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Sag. G. 78. Boerh. 145.*

Punctura, S. G. 74. L. 243. *Sag. G. 79.*

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. G. 70. L. 253. *Sag. G. 86.*

## G. CXLVI. ULCUS.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa,

Ulcus, S. G. 71. 249. *Sag. G. 89.*

Exulceratio, S. G. 72. *Sag. G. 90.*

Sinus, S. G. 73. V. 492. *Sag. G. 92.*

Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Sag. G. 91.*

*Boerh. 413.*

Cacoethes, L. 250. V. 485.

Phagedæna, V. 488.

Noma, L. 251. V. 489.

Carcinoma, L. 252. V. 847.

Ozæna, L. 253. V. 500.

Achor, L. 365. V. 494.

Crusta, V. 494.

Therioma, V. 486.

Sycosis, V. 390.

## G. CXLVII. HERPES.

Phlyctænæ vel ulcuscula plurima; gregalia, serpentina, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443. *Sag. G. 11.*

## G. CXLVIII. TINEA.

In cute capillata ad radices capillorum; ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497. *Sag. G. 131.*

## G. CXLIX. PSORA.

Pustulæ & ulcuscula pruriginosa, contagiosa; manus male habens.

Psora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444. *Sag. G. 130.*

G. CL.

FRACTURA.

Offis partes a cohesione in magna fragmenta  
vi solutæ.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Sag.* G. 98.  
*Boerb.* 339.

G. CLI.

CARIES.

Offis exulceratio.

Caries, S. G. 75. L. 235. V. 493. *Sag.* G. 94.

# I N D E X

215

## CLASSIUM & ORDINUM

*Numeri, post litteras S. L. V. Sag. & M. paginas tomi primi post C. paginas tomi secundi, indicant.*

**A**

**A** DYNAMJÆ V. 108. M. 215. C. 120. & 190.

Aerifluxus S. 34. *Sag.* 173.

Agitatorii, L. 63.

Alvi fluxus, S. 32. *Sag.* 169.

Alvi fluxus non sanguinolenti, S. 32. *Sag.* 170.

Alvi fluxus sanguinolenti, S. 32. *Sag.* 169.

Anepithymia, S. 23. *Sag.* 184. C. 190.

Anhelationes, S. 201. *Sag.* 181. M. 215.

Anhelationes oppressivæ, S. 20.

Anhelationes suppressivæ, *Sag.* 182.

Apocenosæ, V. 97. C. 199.

### C

Cachexiæ, S. 35. V. 114. *Sag.* 157. M. 216. C. 158.

Cachexiæ anomalæ, S. 44. *Sag.* 162.

Clonici generales, S. 19. *Sag.* 179.

Clonici partiales, S. 18. *Sag.* 178.

Comata, S. 24. *Sag.* 187. C. 111.

Continentes, L. 52. C. 32. 45.

Continuæ, S. 13. V. 89. *Sag.* 197. C. 32. 45.

Constrictorii, L. 66.

Critici, L. 52. C. 30.

Cyrtides, S. 4. *Sag.* 147.

### D

Debilitates, S. 22. *Sag.* 183.

Decolores, L. 71.

Defectivi, L. 59. C. 120.

Deformationes, L. 19.

Deformes, L. 70. C. 158.

Deformitates, V. 132. *Sag.* 152.

Deliria, S. 30. *Sag.* 202. C. 152.

Dialyses, C. 212.

Dialytica, L. 73.

Dissolutiones, V. 128. C. 212.

Dolores, S. 25. V. 101. *Sag.* 164. M. 212.

Dolorosi, L. 55.

Dolorosi extrinseci , L. 57.

Dolorosi intrinseci L. 55.

Dysæsthesiæ , S. 22. *Sag.* 183. C. 178.

Dyscinesiæ , S. 23. *Sag.* 185. C. 192.

Dyforexiæ , C. 187.

## E

Ectopiæ , S. 5. *Sag.* 148. C. 212.

Efflorescentiæ , S. 2. *Sag.* 143.

Emaciantes , L. 70. C. 159.

Epischeses , V. 100. C. 204.

Evacuatorii , L. 67. C. 199.

Exacerbantes , L. 52. C. 31.

Exanthemata , *Sag.* 188. C. 82.

Exanthematicæ , S. 14. V. 91. C. 83.

Exanthematici , L. 50. C. 83.

Excrescentiæ , S. 3. *Sag.* 146.

Extuberantiæ , V. 124.

Exulcerationes , L. 74. C. 212.

## F

Febres , S. 12. V. 88. *Sag.* 197. M. 207. C. 30.

Fluxus , S. 31. *Sag.* 168. M. 211. C. 199.

## H

Hæmorrhagiæ , V. 96. C. 95.

Hallucinationes , S. 28. *Sag.* 199.

Humoralia , L. 72.

Hydropes , C. 163.

Hydropes partiales , S. 36. *Sag.* 159.

Hyperæstheses , V. 112. C. 187.

## I

Ictericæ , S. 44. *Sag.* 162.

Ideales , L. 57. C. 152.

Imaginarii , L. 58.

Impetigines , S. 43. *Sag.* 161. C. 172.

Inflammationes , V. 118. M. 210.

Intermittentes , S. 14. V. 88. L. 52. *Sag.* 199. C. 30.

Intumescentiæ , S. 35. *Sag.* 158. C. 161.

## L

Leipopsychiæ , S. 24. *Sag.* 186. C. 120.

Locales , C. 178.

## M

Macies , S. 35. *Sag.* 157. C. 159.

Maculæ , S. 1. L. 80. V. 127. *Sag.* 143.

Marcores , C. 159.  
 Mentales , L. 57. M. 216.  
 Morositates , S. 29. *Sag.* 201. C. 187.  
 Motorii , L. 62. C. 127.

## N

Neuroses , C. 111.

## P

Paranoniæ , V. 116. C. 152.  
 Pathetici , L. 58. C. 187.  
 Phlegmasiæ , S. 14. *Sag.* 192. C. 54.  
 Phlogistici , L. 53. C. 41.  
 Phymata , S. 2. *Sag.* 145.  
 Plagæ , S. 11. *Sag.* 153. C. 178. & 212.  
 Privativi , L. 61. C. 190. & 178.  
 Procidentiæ , L. 78.  
 Profluvia , V. 96. C. 106.  
 Pustulæ & Papulæ , V. 126.  
 Pyrexia , C. 30.

## Q

Quietales , L. 59.

## R

Remittentes , S. 13. *Sag.* 198. C. 31.

## S

Sanguifluxus , S. 31. *Sag.* 168. C. 95.  
 Scabies , L. 75.  
 Serifluxus , S. 33. *Sag.* 171.  
 Solutiones , *Sag.* 153.  
 Soporosi , L. 60. C. 112.  
 Spasmi , S. 17. V. 104. *Sag.* 176. M. 214. C. 127.  
 Spastici , L. 62.  
 Suffocatorii , L. 64.  
 Suppressiones , *Sag.* 174.  
 Suppressorii , L. 64. C. 204.

## T

Tonici generales , S. 18. *Sag.* 177.  
 Tonici partiales , S. 17. *Sag.* 176.  
 Tubera , S. 42. *Sag.* 160.  
 Tumidosi , L. 70. C. 161.  
 Tumores , V. 118. C. 209.

## V

Vesaniæ , S. 28. *Sag.* 199. C. 151.  
 Vicia , S. 1. L. 72. V. 118. *Sag.* 143. C. 178. 212.



## I N D E X

## G E N E R U M.

*Numeri post litteram M. paginas tomi primi, & numeri post litteram C. paginas tomi secundi, indicant: numeri vero post litteras S. Sag. generibus respondent numeris arabicis in margine notatis: & illi, qui sunt post litteras L. V., romanis.*

## A

**A**BORTIO, V. 97. C. 102.

Abortus, S. 245. S. 205. Sag. 180. C. 102.

Abscessus, L. 233. V. 354. C. 57.

Acatapophsis, V. 149. C. 197.

Achlys, V. 242. C. 179.

Achor, L. 265. V. 494. C. 213.

Acrochordon, V. 426.

Acyefis, V. 282.

Addephagia, V. 297. C. 188.

Adiapneustia, Sag. 210.

Adipsia, S. 163. L. 117. V. 281. Sag. 269. C. 191.

Adynamia, V. 225.

Aedopsophia, S. 273. Sag. 208.

Aegilops, V. 499.

Aestus volaticus, V. 220.

Agalaxis, V. 133.

Agnesia, V. 283. C. 192. 208.

Ageustia, L. 114.

Agheustia, S. 157. Sag. 263. C. 186.

Aglactatio, L. 170. Sag. 214.

Aglutitio, L. 64.

Agomphyasis, V. 482.

Agrypnia, S. 238. L. 130. V. 286. Sag. 351.

Algor, S. 191. Sag. 150.

Allotriophagia, V. 299. C. 189.

Alopecia, S. 312. V. 315. Sag. 138.

Alvifluxus, M. 211.

Amatoria, V. 17.

Amaurosis, S. 155. L. 110. V. 238. Sag. 261. C. 180.

Am-

- Amblyopia, S. 154. L. 108. V. 236. *Sag.* 258. C. 181. 182.  
 Ambustio, *Sag.* 97.  
 Amenorrhoea, V. 130. C. 209.  
 Amentia, S. 233. L. 67. V. 337. *Sag.* 346. C. 152. 156.  
 Amnesia, S. 237. *Sag.* 349. C. 152.  
 Amphimerina, S. 84. L. 20. *Sag.* 321. C. 34.  
 Amputatio, *Sag.* 86.  
 Amputatura, S. 70. L. 242. C. 213.  
 Anacatharsis, S. 262. *Sag.* 198. C. 106.  
 Anaesthesia, S. 161. L. 118. *Sag.* 267. C. 187.  
 Anaphrodisia, S. 164. *Sag.* 270. C. 192.  
 Anapleuris, V. 478.  
 Analarca, S. 281. L. 216. V. 313. *Sag.* 108. C. 163.  
 Anatrope, V. 280.  
 Anchyloblepharon, V. 504.  
 Anchyloglossum, V. 507.  
 Anchylomerisma, *Sag.* 76.  
 Anchylops, V. 364.  
 Anchylosis, L. 287. V. 508.  
 Aneurysma, S. 32. L. 282. V. 408. *Sag.* 35. C. 210.  
 Angina, S. 147. L. 46. *Sag.* 217. C. 60.  
 — Convulsiva, V. 196.  
 Angone, V. 196.  
 Anhelatio, L. 157.  
 Anoia, V. 337.  
 Anodynia, V. 284. C. 187.  
 Anorexia, S. 162. L. 116. V. 279. *Sag.* 268. C. 122. 190.  
 Anosmia, S. 156. L. 113. V. 248. *Sag.* 262. C. 186.  
 Anthrax, S. 19. L. 273. V. 353. *Sag.* 24. C. 56.  
 Antipathia, S. 225. L. 88. V. 285. *Sag.* 337.  
 Anxietytas, S. 187. L. 89. V. 134. *Sag.* 146.  
 Apella, L. 312. V. 546. *Sag.* 73.  
 Apepsia, V. 276. C. 122.  
 Aphonia, S. 166. L. 115. V. 253. *Sag.* 272. C. 192.  
 Aphtha, S. 100. L. 9. V. 501. *Sag.* 298. C. 94.  
 Aphthosa, V. 44. C. 94.  
 Apnoea, V. 265.  
 Apogeusis, V. 249. C. 186.  
 Apogeusia, V. 294.  
 Apomyttolis, S. 127. *Sag.* 234.  
 Apoplexia, S. 182. L. 101. V. 229. *Sag.* 288. C. 112.  
 Apoplectica, V. 72.

- Apolltema, S. 39. *sag.* 42. C. 56.  
 Apofyrma, V. 477.  
 Aquula, V. 445.  
 Archoptoma, V. 395.  
 Arctura, L. 262.  
 Ardor, S. 192. *sag.* 151.  
 Argemon, V. 498.  
 Aridura, S. 278. L. 227. *sag.* 104.  
 Arteticus, V. 554.  
 Arthritis, S. 183. L. 60. V. 139. *sag.* 142. M. 212. C. 80.  
 Athrocace, S. 78. L. 257. *sag.* 95. C. 55.  
 Arthrodynia, C. 78.  
 Arthropnoſis, C. 81.  
 Afaphia, V. 250. C. 194.  
 Aſcites, S. 288. L. 218. V. 314. *sag.* 114. C. 166.  
 Afphyxia, S. 175. L. 95. V. 275. *sag.* 281. C. 121.  
 Afloides, V. 27.  
 Afthenia, S. 172. L. 92. V. 223. *sag.* 278.  
 Afthma, S. 145. L. 161. V. 268. *sag.* 252. M. 182. C. 136.  
 Atecniã, L. 119. C. 192.  
 Atheroma, L. 286. V. 420. C. 211.  
 Athymia, V. 329. C. 154.  
 Atochia, V. 172.  
 Atonia, L. 120. C. 117.  
 Atreta, L. 313. V. 549.  
 Atrophia, S. 277. L. 211. V. 308. *sag.* 102. M. 216. C. 160.  
 Attritio, V. 475.  
 Aurigo, S. 306. *sag.* 132. C. 176.

## B

- Bacchia, L. 271. *sag.* 9. C. 55.  
 Balbuties, V. 259.  
 Batrachus, V. 80.  
 Battarismus, V. 261. C. 195.  
 Beriberia, S. 137. L. 140. *sag.* 244.  
 Blaefitas, V. 258.  
 Blephatoptofis, S. 43. *sag.* 46.  
 Blepharotis, V. 342.  
 Bleſtrismus, V. 145.  
 Boa, V. 446.  
 Bombus, V. 302.  
 Borborigmus, L. 123.  
 Bronchocele, S. 28. V. 369.

- Bubo , S. 16. L. 272. V. 368. *sag.* 21. C. 210.  
 Bubonocoele , V. 396. *sag.* 58.  
 Bulimia , S. 223. L. 79. *sag.* 335. C. 187.  
 Bulimus , V. 296. C. 187.  
 Bullosa , V. 41. C. 93.  
 C  
 Cachexia , L. 221. V. 304.  
 Cacoethes , L. 151. V. 485. C. 213.  
 Cacophonia , *sag.* 274. C. 194.  
 Cacositria , L. 87.  
 Caligo , S. 153. V. 288. *sag.* 259. C. 179.  
 Callus , V. 429. C. 211.  
 Calvities , V. 529.  
 Cancer , S. 20. V. 375. *sag.* 25. M. 216. C. 210.  
 Canities , V. 525.  
 Capistrum , V. 208. C. 129.  
 Caput obstipum , V. 313. C. 198.  
 Carcinoma , S. 296. L. 253. V. 487. *sag.* 122. C. 213.  
 Cardialgia , S. 202. L. 48. V. 157. *sag.* 160. C. 122. 140.  
 Cardiognus , S. 201. V. 152. *sag.* 159.  
 Carditis , S. 111. V. 54. *sag.* 302. C. 69.  
 Carebaria , V. 144.  
 Caries , S. 77. L. 246. *sag.* 94. C. 214.  
 Carphologia , S. 125. L. 135. V. 330. *sag.* 231.  
 Carus , S. 81. L. 100. V. 231. *sag.* 287. C. 112.  
 Cataclasis , V. 202.  
 Catalepsis , S. 176. L. 129. V. 230. *sag.* 282. C. 112.  
 Cataphora , S. 180. L. 99. V. 232. *sag.* 286. C. 112.  
 Cataplexis , V. 137.  
 Cataracta , S. 152. L. 109. V. 239. *sag.* 260. C. 179.  
 Catarrhalis , V. 73.  
 Catarrhexis , V. 91.  
 Catarrhus , S. 186. V. 98. *sag.* 145. C. 106.  
 — Suffocativus , V. 270.  
 Catoche , V. 230.  
 Catochus , S. 123. L. 128. V. 183. *sag.* 229. M. 214. C. 127.  
 Caulos , V. 20. C. 37.  
 Cedma , V. 168.  
 Celfa , V. 303.  
 Cephalaea , S. 194. V. 141. *sag.* 153.  
 Cephalalgia , S. 193. L. 40. V. 140. *sag.* 152.  
 Cephalitis , S. 109. *sag.* 310. C. 49. 58.

- Cercosis, V. 535.  
 Cerion, V. 196.  
 Chemosis, V. 46. C. 57.  
 Chilon, V. 366.  
 Chiragra, V. 139.  
 Chlorosis, S. 309. L. 223. V. 305. *sag.* 135. C. 126.  
 Cholera, S. 253. L. 187. V. 110. *sag.* 188. C. 144.  
 Cholericæ, L. 191. V. 28. C. 145.  
 Choloris, V. 536.  
 Choreæ, L. 139. V. 193. C. 131.  
 Chylaria, V. 117.  
 Cicatrix, L. 318. V. 509.  
 Cillois, V. 203.  
 Cincleis, V. 201.  
 Cionis, V. 150.  
 Circocelle, V. 409.  
 Citra, L. 78. C. 189.  
 Clamor, V. 206.  
 Clangor, V. 251. C. 195.  
 Claudicatio, S. 131. *sag.* 238.  
 Clavus, L. 279. V. 142. 428. C. 211.  
 Clitorismus, L. 299.  
 Clunisia, V. 167. C. 55.  
 Cocytæ, L. 258.  
 Coeliaca, S. 255. L. 190. V. 109. *sag.* 190. C. 145.  
 Coilima, V. 373.  
 Colica, S. 204. L. 50. V. 160. *sag.* 162. M. 213. C. 140.  
 Colotoma, V. 534.  
 Colpocele, *sag.* 61.  
 Colpoptosis, *sag.* 53.  
 Coma, V. 232. M. 215. C. 112.  
 Combustio, C. 56.  
 Combustura, S. 246. C. 56.  
 Condyloma, S. 24. L. 294. V. 378. *sag.* 29.  
 Contractura, S. 119. L. 300. *sag.* 225. C. 98.  
 Contusio, S. 66. V. 480. *sag.* 83.  
 Contusura, L. 239.  
 Convulsio, S. 128. L. 242. V. 191. *sag.* 235. M. 214. C. 130.  
 Cophosis, S. 162. L. 112. *sag.* 266. C. 184.  
 Coryza, S. 260. L. 175. V. 100. *sag.* 196. C. 106.  
 Crampus, S. 120. V. 194. *sag.* 226.  
 Crepitus, L. 195.



- Cripforchis, V. 551.  
 Crithe, V. 434.  
 Crusta lactea, V. 495. C. 213.  
 Cyasma, V. 461.  
 Cynanche, S. 110. L. 33. sag. 300. C. 69.  
 Cynorexia, V. 298. C. 188.  
 Cyphosis, V. 512.  
 Cyrtoma, V. 405.  
 Cystitis, V. 71.  
 Cystirrhagia, V. 93. C. 105.  
 Cystitis, S. 108. L. 31. V. 66. sag. 309. C. 75.  
 Cystocele, S. 56. V. 404.  
 Cystoptosis, V. 394.  
 Dacryoma, V. 506.  
 Daetylion, V. 510.  
 Daemonia, L. 69. C. 154.  
 Daemonomania, S. 236. sag. 348. C. 154.  
 Decimana, V. 9. C. 42.  
 Delirium, M. 215.  
 Delirium, V. 330. L. 65.  
 Deuteria, V. 132.  
 Diabetes, S. 263. L. 198. V. 115. sag. 199. C. 147.  
 Diabrosis, V. 481.  
 Diachalasis, V. 474.  
 Diaphora, V. 278. C. 122.  
 Diaphragmitis, sag. 304. C. 66.  
 Diaria, L. 11. C. 46.  
 Diarrhoea, S. 254. L. 188. V. 105. sag. 189. C. 145.  
 Diastasis, S. 61. sag. 68. C. 212.  
 Digitium, L. 228. V. 221. sag. 173. C. 198.  
 Dionysiscus, V. 553.  
 Diplopia, S. 218. sag. 330. C. 183.  
 Distortio, L. 303.  
 Distrix, V. 526.  
 Diuresis, V. 114. C. 147.  
 Dolor capitis, M. 213.  
 — ventriculi, M. 213.  
 Duplicana, L. 18. C. 33.  
 Dysecocia, S. 158. V. 246. sag. 264. C. 183.  
 Dysenteria, S. 248. L. 192. V. 107. sag. 183. C. 109.  
 Dyslochia, L. 169. V. 131. sag. 215.

Dys-

- Dyshæmorrhœis, *sag.* 220.  
 Dysmenorrhœa, L. 168. V. 170. *sag.* 218. C. 209.  
 Dysodia, S. 274. V. 125. *sag.* 109.  
 Dysopia, V. 291. C. 182. 183.  
 Dyspepsia, V. 277. C. 122.  
 Dypermatismus, S. 269. C. 208.  
 Dysphagia, S. 199. *sag.* 216. C. 197.  
 Dyspnoea, S. 144. L. 160. V. 267. *sag.* 251. M. 215. C. 137.  
 Dystocia, S. 208. V. 171. *sag.* 219.  
 Dysuria, S. 265. L. 57. V. 164. *sag.* 213. C. 207.

## E

- Ecchymoma, S. 6. V. 451. *sag.* 5. C. 210.  
 Eclampsia, S. 133. V. 189. *sag.* 240. M. 215. C. 132.  
 Ecphyse V. 124.  
 Ecplexis, V. 304.  
 Ecstasis, S. 177. V. 333. *sag.* 283. C. 112.  
 Ecthlymma, V. 475.  
 Ecthymata, V. 360.  
 Ectropium, L. 297. V. 578.  
 Eilema, V. 161.  
 Elcolis, S. 313. *sag.* 139.  
 Elephantia Arabum, V. 322. C. 175.  
 Elephantiasis, S. 302. V. 321. *sag.* 128. C. 175.  
 Elodes, V. 21.  
 Elytrocele, V. 402.  
 Emphysema, S. 13. L. 229. V. 392. *sag.* 18. M. 216.  
 C. 161.  
 Empyema, S. 151. L. 159. V. 358. *sag.* 257. M. 215. C. 68.  
 Encanthis, V. 430.  
 Encauma, V. 450.  
 Encaufis, V. 158. 347. C. 56.  
 Encephalocèle, S. 57. V. 383. *sag.* 64.  
 Encystitis, V. 420. C. 211.  
 Enteritis, S. 103. L. 29. V. 57. *sag.* 307. C. 71.  
 Enterocèle, S. 50.  
 — ovularis, V. 400.  
 Enthusiasmus, V. 335.  
 Entropium, V. 519.  
 Enuresis, S. 296. L. 196. V. 113. *sag.* 200. C. 202.  
 Ephelis, S. 3. L. 226. V. 438. *sag.* 3.

Ephe-

# GENERUM.

229

- Ephemera , S. 79. C. 46. 42.  
 Ephialtes, S. 738. L. 163. *sag.* 245. C. 158.  
 Ephidrosis, S. 258. *sag.* 194. C. 200.  
 Epiala, V. 19.  
 Epidosis, *sag.* 75.  
 Epilepsia, S. 134. L. 143. V. 188. *sag.* 241. M. 215.  
 C. 132.  
 Epipyctis, S. 8. V. 441. *sag.* 12.  
 Epiphlogisma, V. 179.  
 Epiphora, S. 259. L. 173. V. 99. *sag.* 195. C. 201.  
 Epiplocele, S. 51.  
 Epiploitis, S. 106. *sag.* 308. C. 70.  
 Epistaxis, V. 82. C. 96.  
 Episthotonos, V. 182. C. 127.  
 Epulis, V. 363.  
 Erotomania, L. 82. C. 154.  
 Errana, L. 19.  
 Erratica, S. 90. *sag.* 327. C. 41.  
 Erysipelacea, V. 68. C. 89.  
 Erysipelas, S. 97. L. 10. V. 343. *Sag.* 296. C. 56. 88.  
 Erythema, S. 11. *Sag.* 16. C. 56.  
 Eschara, S. 76. L. 281. V. 483. *sag.* 93.  
 Eschê, V. 439.  
 Effera, S. 99. *sag.* 297.  
 Exania, S. 47. *sag.* 50.  
 Exarthrema, S. 60. *sag.* 67. C. 212.  
 Excoriatio, S. 65. *sag.* 82.  
 Excoriatura, L. 247.  
 Exoche, V. 440.  
 Exocyste, S. 48.  
 Exocystis, *sag.* 51.  
 Exomphalus, S. 40. *sag.* 43.  
 Exoneirosis, V. 120.  
 Exophthalmia, S. 42. *sag.* 45.  
 Exostosis, S. 29. L. 291. V. 417. *sag.* 34. C. 211.  
 Expectoratio, L. 179. C. 106.  
 Exulceratio, S. 72. *sag.* 90. C. 212.

## F

- Fatuitas, V. 336. C. 152.  
 Favus, V. 496.

Tom II.

P

Fe-

- Febris continua, M. 207.  
 — intermittens, M. 208.  
 — remittens, M. 209.  
 — exanthematica, M. 209.  
 — hectica, M. 210.  
 Fissura, S. 68. V. 469. *sag.* 99.  
 Fistula, S. 74. L. 255. L. 491. *sag.* 91. C. 213.  
 Flatulentia, S. 272. L. 165. V. 127. *sag.* 207. C. 122.  
 Flemen, V. 425.  
 Fletus, L. 149.  
 Fluxus humorales, M. 212.  
 Fractura, S. 67. L. 236. V. 468. *sag.* 98. C. 214.  
 Framboesia, S. 299. *sag.* 125. C. 176.  
 Frigeraria, *sag.* 318.  
 Frigus, V. 185.  
 Fungus, V. 423.  
 Furor uterinus, V. 331.  
 Furunculus, S. 18. V. 352. *sag.* 23. C. 55.

## G

- Galactia, L. 207. V. 122.  
 Galactirrhoea, S. 270. *sag.* 205.  
 Galbulus, V. 559.  
 Galiancon, V. 558.  
 Ganglion, L. 288. V. 379. C. 211.  
 Gangraena, S. 314. L. 234. V. 327. *sag.* 140. C. 57.  
 Gastritis, S. 104. L. 28. V. 56. *sag.* 306. C. 70.  
 Gastrocele, S. 52. V. 410. *sag.* 54.  
 Gastrodynia, S. 203. *sag.* 161. C. 122.  
 Gelasmus, V. 210.  
 Gibber, L. 301. V. 512.  
 Gibbositas, S. 30. *sag.* 70.  
 Glaucoma, V. 241. *sag.* 179.  
 Glossagra, V. 138.  
 Glossocoele, V. 197.  
 Glossocoma, V. 198.  
 Glus, 200. V. 117. C. 208.  
 Gonagra, V. 139.  
 Gongrona, V. 371.  
 Gonorrhoea, S. 268. L. 201. V. 118. *sag.* 204. C. 202.  
 Grando, V. 435.  
 Gravedo, L. 42. V. 116. C. 106.

# GENERUM.

223

Graviditas , S. 284. L. 221. *sag.* 111.

Gryposis , V. 537.

Gutta rosea , S. 4. C. 55.

— rosacea , V. 437. C. 55.

## H

Hæmalopia , V. 289. C. 183.

Hæmataporia , *Sag.* 103.

Hæmatemesis , S. 242. L. 185. V. 89. *Sag.* 177. C. 104.

Hæmatopedesis , V. 97.

Hæmaturia , S. 243. L. 199. V. 92. *Sag.* 178. C. 105.

Hæmeropathos , *Sag.* 13.

Hæmodia , V. 146.

Hæmoptoe , V. 83. C. 97.

Hæmoptysis , S. 240. L. 180. V. 84. *Sag.* 175. C. 97.

Hæmorrhagia , S. 239. L. 174. V. 81. *Sag.* 174. M.

211. C. 56. 199.

Hæmorrhoidalis , V. 75.

Hæmorrhoids , S. 247. L. 193. *Sag.* 182. C. 99.

Hætica , S. 83. L. 24. V. 80. *Sag.* 320. C. 53.

Hemalopia , V. 245.

Hemerolopia , V. 244.

Hemicrania , S. 195. L. 41. V. 143. *Sag.* 154.

Heimptegia , S. 170. L. 103. V. 228. *Sag.* 276. C. 118.

Hemitritæa , L. 23. C. 36.

Hepatalgia , S. 205. *Sag.* 163.

Hepatica , L. 51.

Heparrhoea , S. 246. V. 90. *sag.* 181. C. 145.

Heptiatis , S. 113. L. 35. V. 58. *sag.* 312. C. 72.

Hepatizon , L. 324.

Hepatocele , S. 539. V. 411.

Hermaphroditus , V. 552.

Hernia , L. 292. C. 212.

Herpes , S. 7. L. 269. V. 443. *sag.* 11. C. 213.

Hidroa , S. 10. V. 446.

Hieranosos , L. 144. V. 190. M. 215. C. 130.

Hieropyr , V. 344. C. 56.

Himantosis , V. 151.

Hippos , 137. V. 199.

Hirsuties , L. 315. V. 524. *sag.* 77.

Hordeolum , S. 27. L. 277. V. 434. *sag.* 32. C. 55.



- Horror , V. 186.  
 Humoraria , *sag.* 317.  
 Hyarthrus , S. 38. *sag.* 41. C. 211.  
 Hydatis , S. 34. *sag.* 38. C. 211.  
 Hydrenterocele , V. 406.  
 Hydroa , *sag.* 15.  
 Hydrocele , V. 388. C. 108.  
 Hydrocephalum , V. 384. C. 165.  
 Hydrocephalus , S. 285. L. 217. V. 384. *sag.* 112. C. 165.  
 Hydrocistis , V. 315.  
 Hydrometra , S. 289. *sag.* 116. C. 168.  
 Hydromphalos , V. 387.  
 Hydropedesis , V. 121. C. 200.  
 Hydrophobia , S. 231. L. 86. V. 30. *sag.* 343. M. 214.  
     C. 150.  
 Hydrophthalmia , V. 385.  
 Hydrops , M. 286.  
 — scroti , V. 389. C. 168.  
 Hydrorachitis , S. 287. *sag.* 114. C. 165.  
 Hydrothorax , S. 150. V. 311. *sag.* 256. M. 215. C. 165.  
 Hygrosirfocele , V. 414.  
 Hypercatharsis , V. 123.  
 Hyperartetiscus , V. 557.  
 Hyperostosis , V. 418. C. 212.  
 Hypnobatalis , V. 340. C. 157.  
 Hypogondriasis , S. 220. L. 76. V. 218. *sag.* 332. C. 125.  
 Hypogastrocele , V. 403.  
 Hypophasis , V. 234.  
 Hypopyon , V. 356.  
 Hypofarca , L. 219. C. 169.  
 Hypospydiaeos , V. 547.  
 Hypostaphyle , S. 44. *sag.* 47.  
 Hysteralgia , S. 209. L. 55. V. 169. *sag.* 166.  
 Hysteria , S. 135. L. 126. V. 219. *sag.* 166.  
 Hysteria , S. 135. L. 126. V. 219. *sag.* 242. C. 149.  
 Hysteritis , L. 38. V. 67. C. 75.  
 Hysterocele , S. 55. V. 413.  
 Hysteroloxia , S. 58. *sag.* 65.  
 Hysterophyse , V. 317. C. 163.  
 Hysteroptosis , S. 49. V. 393. *sag.* 52.

I

- Ictericodes*, C. 32.  
*Icterus*, L. 225. V. 306. M. 216. C. 176.  
*Ileus*, S. 252. V. 162. *Sag.* 187. C. 141.  
*Iliaca*, L. 186. C. 141.  
*Illofis*, V. 200.  
*Impetigo*, V. 462.  
*Incubus*, V. 211. C. 157.  
*Inflammatio*, L. 232. *sag.* 20. M. 210. C. 55.  
*Intertrigo*, L. 248. V. 502. C. 56.  
*Ionthos*, V. 436.  
*Ischias*, S. 213. V. 138. *sag.* 170. C. 76.  
*Ischiatocele*, V. 401.  
*Ischiocele*, *sag.* 60.  
*Ischnophonia*, V. 260. C. 195.  
*Ischnotis*, V. 541.  
*Ischuria*, S. 293. L. 167. V. 129. *sag.* 212. M. 214.  
     C. 204.  
*Indicatoria*, *sag.* 316.

L

- Labarium*, L. 310.  
*Labium*, leporinum, V. 322.  
*Laceratura*, L. 243. C. 213.  
*Lactea*, V. 76.  
*Lagocheilos*, V. 552.  
*Lagophthalmia*, L. 306. V. 516.  
*Lagophthalmus*, V. 516.  
*Lagostoma*, L. 311. *sag.* 72.  
*Languor*, L. 91.  
*Laparocele*, *sag.* 56.  
*Lassitudo*, S. 188. L. 90. V. 222. *sag.* 147.  
*Leiopedes*, V. 545.  
*Leipothymia*, S. 173. L. 93. V. 273. C. 121.  
*Leipyria*, V. 24.  
*Lenra*, L. 14. V. 79. C. 52.  
*Lentigo*, L. 325. V. 455.  
*Leontiasis*, S. 297. *sag.* 123.

- Lepra, S. 303. L. 263. *sag.* 129. C. 175.  
 — Arabum, V. 321.  
 — Græcorum, V. 320. C. 175.  
 Leptophonia, V. 254. C. 155.  
 Lethargus, S. 179. L. 98. V. 22. *sag.* 285. C. 113.  
 Leuce, V. 460.  
 Leucoma, S. 1. *sag.* 1.  
 Leucophlegmatia, L. 215. C. 161.  
 Leucorrhœa, S. 267. L. 202. V. 119. *sag.* 202.  
 C. 101.  
 Leucorrhœis, V. 112. C. 100. 145.  
 Lichen, V. 462.  
 Lienteria, S. 256. L. 189. V. 108. *sag.* 191. C. 145.  
 Lipothymia, *sag.* 279. L. 93.  
 Lippitudo, L. 267.  
 Lithiasis, V. 165. M. 214.  
 Lochiorrhœa, *sag.* 203.  
 Lordosis, S. 31. L. 302. V. 612. *Sag.* 71.  
 Loxarthrus, S. 62. *Sag.* 69.  
 Lues Venerea, M. 216.  
 Lumbago, S. 212. V. 138. *Sag.* 169. C. 76.  
 Lupia, S. 37. *Sag.* 40. C. 211.  
 Luxatio, V. 472. C. 212.  
 Luxatura, L. 237. C. 212.  
 Syngodes, V. 26.

## M

- Macropnoëa, V. 266.  
 Madarosis, V. 530.  
 Malacia, V. 300. C. 189.  
 Malacosteon, V. 523.  
 Maligna, C. 48.  
 Malis, S. 298. *sag.* 124.  
 Mania, S. 235. L. 68. V. 331. *Sag.* 349. C. 156.  
 Marasmus, L. 212. C. 160.  
 Marisca, S. 35. *Sag.* 37. C. 100.  
 Marmaryge, V. 290. C. 183.  
 Mastodynia, S. 210. V. 153. *Sag.* 167. C. 55.  
 Mediastina, V. 52. C. 67.  
 Melaena, S. 249. *sag.* 184.  
 Melanchlorus, V. 307.

# GENERUM.

231

- Melancholia , S. 234. L. 71. V. 332. *sag.* 347. C. 154.
- Melasiſterus , S. 307. *sag.* 133.
- Melaſma , L. 323. V. 451.
- Meliceris , V. 420.
- Menorrhagia , S. 244. L. 203. V. 96. C. 101.
- Menſtrua , V. 11.
- Meroccele , V. 399. *sag.* 57.
- Mefenteritis , V. 60. C. 70.
- Meteorifmus , S. 292. *sag.* 119. C. 162.
- Metritis , S. 107. *sag.* 315. C. 75.
- Metrorrhagia , *sag.* 179. C. 101.
- Miliaria , C. 90.
- Miliaris , S. 95. L. 7. V. 37. *sag.* 295. C. 49. 91.
- Mola , L. 206. V. 560.
- Monſtroſitas , V. 539.
- Morbili , V. 453. C. 85.
- Morbil loſa , V. 36. C. 85.
- Moroſis , L. 106. V. 336. C. 152.
- Morphoea , L. 320.
- Morſura , L. 245.
- Morſus , *sag.* 81.
- Morta , L. 1. C. 93.
- Mortificatio , M. 216.
- Mutitas , S. 165. V. 257. *sag.* 271. C. 193.
- Mydriafis , V. 237. C. 181.
- Myocoilitis , V. 63.
- Myopia , L. 309. C. 182.
- Myopiaſis , V. 515. C. 182.
- Myofitis , *sag.* 301. C. 76.
- Mirmaecium , L. 280. V. 426.

## N

- Naevus , S. 5. L. 319. V. 538. *sag.* 4.
- Natta , L. 289.
- Nausea , S. 250. L. 183. V. 159. *sag.* 185. C. 122.
- Nebula , V. 464.
- Necroſis , S. 315. *sag.* 141.
- Nefrendis , V. 555.
- Nephralgia , S. 207. *sag.* 165.
- Nephritica , S. 56.
- Nephritis , S. 115. L. 37. V. 65. *sag.* 314. C. 74.

- Noma, L. 252. V. 489. C. 213.  
 Nonana, V. 8. C. 42.  
 Nostalgia, S. 226. L. 83. V. 332. *Sag.* 338. C. 154. 190.  
 Nyctalopia, L. 307. V. 243.  
 Nymphomania, S. 229. *Sag.* 341. C. 190.  
 Nyctlagmus, S. 124. *sag.* 230.

## O

- Oblivio, L. 107. V. 338. C. 152.  
 Obstipatio, L. 166. V. 128. *Sag.* 221. C. 204.  
 Obstipitas, S. 118. *Sag.* 224. C. 198.  
 Octana, V. 7. C. 42.  
 Odaxismus, V. 147.  
 Odontalgia, S. 198. L. 45. V. 145. *sag.* 157. M. 213.  
 C. 78.  
 Odontirrhoea, V. 86.  
 Oedema, 12. L. 230. V. 382. *sag.* 17.  
 Oesophagismus, V. 217.  
 Omentitis, V. 61. C. 70.  
 Omphalocele, V. 398. *sag.* 55.  
 Oneirodynia, C. 157.  
 Onychia, V. 346.  
 Onyx, V. 355.  
 Operatio, *sag.* 85.  
 Ophiasis, V. 529.  
 Ophthalmia, S. 196. L. 43. V. 341. *sag.* 155. C. 57.  
 Ophthalmites, V. 47. C. 57.  
 Ophthalmorrhagia, V. 88.  
 Opisthotonos, V. 181. C. 127.  
 Opodeocele, *sag.* 59.  
 Orgasmus, L. 133.  
 Orthopnoea, S. 146. L. 162. V. 269. *Sag.* 253. M. 215.  
 C. 137.  
 Oscedo, S. 140. V. 263. *sag.* 247.  
 Oscheocele, S. 41. V. 397. C. 168.  
 Oscheophyma, *sag.* 44. C. 168.  
 Oscitans, V. 31.  
 Oscitatio, L. 151.  
 Osteocopus, V. 176.  
 Osteosarcosis, M. 286.



# GENERUM.

233

- Oftocopus , S. 184. L. 61. *Sag.* 143. M. 212.
- Otalgia , S. 197 L. 44. V. 148. *Sag.* 156. M. 213.  
C. 55.
- Otitis , V. 18.
- Otoplatos , V. 102.
- Otopuosis , V. 101.
- Otorrhoea , S. 271. L. 172. V. 87. *Sag.* 206.
- Oxyphonia , V. 255. C. 195.
- Ozaena , L. 254. V. 500. C. 213.

## P

- Paedarthrocace , V. 419. C. 55.
- Palpitatio , S. 130. L. 132. V. 213. *Sag.* 237. C. 135.
- Panaritit , V. 70.
- Pancreatica , V. 64.
- Pandiculatio , S. 126. L. 152. V. 264. *Sag.* 233.
- Panophobia , S. 227. L. 75. *Sag.* 339. C. 154.
- Papula , L. 276. *Sag.* 7. C. 55.
- Paracentesis , *Sag.* 88.
- Paracusis , S. 159. *Sag.* 265. C. 185.
- Paracyclis , V. 326.
- Paraglossa , S. 45. V. 365. *Sag.* 48.
- Paralysis , S. 169. L. 104. V. 266. *Sag.* 275. M. 215.  
C. 117.
- Paraphymosis , V. 349. C. 55.
- Paraphonia , S. 168. C. 194.
- Paraphrenesis , S. 102. L. 26. C. 66.
- Paraphrenitis , V. 55. C. 66.
- Paraphrosyne , S. 232. L. 66. V. 330. *Sag.* 345. C. 156.
- Paraplegia , L. 102. V. 227. C. 118.
- Paraplexia , S. 171. *Sag.* 277. C. 118.
- Paronychia , S. 21. L. 259. V. 345. *Sag.* 26. C. 55.
- Parorchidium , S. 59. *Sag.* 66.
- Parotis , S. 17. V. 370. *Sag.* 22. C. 210.
- Parturitio , L. 204.
- Parulis , V. 362. C. 55.
- Paro , V. 339.
- Pelada , V. 529.
- Pelioma , V. 451.
- Pemphygus , S. 93. *Sag.* 291. C. 92.
- Pemphingodes , V. 43.

- Periadynia , V. 155.  
 Pericarditis , V. 50. C. 69.  
 Perinaeoceale , *sag.* 62.  
 Peripneumonia , S. 112. L. 34. V. 51. *sag.* 311. C. 64.  
 Peritonitis , V. 62. C. 69.  
 Pertussis , C. 140.  
 Pestilentialis , V. 33. C. 87.  
 Pestis , S. 91. L. 2. *sag.* 289. C. 87.  
 Petechia , L. 5. V. 452. V. 95.  
 Petechialis , V. 38. C. 95.  
 Phagedaena , V. 488. C. 213.  
 Phalacrotis , V. 528.  
 Phalangosis , V. 533.  
 Phantasma , L. 73. V. 287. C. 183.  
 Phimosis , S. 22. L. 298. V. 348. *sag.* 27. C. 55.  
 Phlegmatia , S. 282. *sag.* 109. C. 163.  
 Phlegmone , S. 15. L. 39. V. 351. *sag.* 299. C. 55.  
 Phlogosis , V. 220. C. 54.  
 Phlyctaena , S. 2. L. 274. V. 442. *sag.* 8. C. 211.  
 Phlyxacion , V. 450.  
 Phœnigmus , S. 308. *sag.* 134.  
 Phoxos , V. 511.  
 Phrenismus , V. 45. C. 59.  
 Phrenitis , S. 101. L. 25. V. 18. *sag.* 303. C. 52. 58.  
 Phricasmus , *sag.* 239.  
 Phricodes , V. 25.  
 Phthiriasis , S. 310. V. 324. *sag.* 136.  
 Phthisis , S. 276. L. 209. V. 310. *sag.* 101. C. 98.  
 Phygethlon , V. 357.  
 Phyma , V. 359.  
 Physconia , S. 283. V. 325. *sag.* 110. M. 216. C. 169.  
 Physoceale , V. 416.  
 Physocephalus , S. 286. *sag.* 113.  
 Physometra , S. 290. *sag.* 117. C. 163.  
 Pica , S. 222. V. 301. *sag.* 334. C. 189.  
 Pinnula , V. 432.  
 Piptonychia , V. 484.  
 Pituitaria , V. 111. C. 145.  
 Pityriasis , V. 476.  
 Pladarotis , V. 431.  
 Plancus , V. 545.  
 Plautus , V. 545.

- Plethora, L. 226. *Sag.* 105.  
 Pleuritica, L. 53.  
 Pleuritis, S. 103. L. 27. V. 50. *sag.* 305. C. 66.  
 Pleurodyne, S. 148. V. 138. *sag.* 264. M. 213. C. 68. 76.  
 Plica, L. 314. V. 323. C. 176.  
 Plicatio, V. 470.  
 Pneumatosis, S. 280. V. 391. 156. *sag.* 107. C. 161.  
 Pneumonia, C. 63.  
 Pneumonica, L. 54.  
 Pnigma, V. 270.  
 Podagra, V. 175. C. 79.  
 Podagrica, V. 69. C. 80.  
 Polydipsia, S. 224. L. 80. V. 295. *sag.* 336. C. 188.  
 Polymerisma, *sag.* 74.  
 Polypus, V. 377. C. 210.  
 Polyfarcia, S. 279. L. 214. V. 540. *sag.* 106. M. 216.  
 C. 161.  
 Porrigo, V. 476.  
 Porrus, V. 427. C. 210.  
 Presbytia, L. 308. C. 182.  
 Pressura, L. 261.  
 Priapismus, S. 121. L. 122. V. 173. *sag.* 227.  
 Proctalgia, S. 214. *Sag.* 171. M. 214. C. 55.  
 Proctica, L. 59. V. 167.  
 Proctitis, L. 30. C. 55.  
 Proctorrhoea, *sag.* 193.  
 Profusio, L. 240. C. 199.  
 Prolapsus, L. 293. C. 212.  
 Proptoma, S. 46. *Sag.* 49.  
 Pruritus, S. 190. L. 64. V. 136. *Sag.* 149.  
 Psellismus, S. 167. L. 138. *sag.* 273. C. 195.  
 Psellotis, V. 259. C. 195.  
 Pseudoblephs, C. 183.  
 Psophos, V. 177.  
 Plora, L. 266. 320. C. 213.  
 Psoriasis, V. 174.  
 Psydrcia, S. 9. V. 442. *Sag.* 14.  
 Pterygium, S. 26. L. 296. V. 433. *Sag.* 31.  
 Ptilosis, V. 531.  
 Ptolis, V. 235.  
 Ptyalismus, S. 261. L. 177. V. 103. *Sag.* 197. C. 201.  
 Pudendagra, S. 215. L. 58. V. 168. *sag.* 172.

- Punctura , S. 64. L. 244. *sag.* 79. C. 213.  
 Puorrhœa , V. 106.  
 Puoturia , V. 116.  
 Purpura , S. 96. V. 449. *Sag.* 292. C. 95.  
 — scorbutica , V. 443.  
 Pustula , S. 6. L. 275. *sag.* 6. C. 57.  
 Pyrosis , S. 200. *Sag.* 158. C. 140.  
 Pyuria , S. 266. *sag.* 201.

## Q

- Quartana , S. 89. L. 17. V. 3. *sag.* 326. C. 39.  
 — Duplex , V. 13.  
 — Triplex , V. 14.  
 Quintana , V. 4. C. 41.  
 Quotidiana , S. 87. L. 15. V. 1. *sag.* 324. C. 42.  
 — continua , V. 15.

## R

- Rabies , L. 85. *sag.* 344.  
 Rachialgia , S. 211. *Sag.* 168. C. 141.  
 Rachitis , S. 294. L. 213. V. 312. *Sag.* 120. C. 172.  
 Rachosis , V. 503.  
 Ranula , V. 380.  
 Raphania , L. 135. V. 192. C. 132.  
 Raucedo , L. 146. C. 106. 194.  
 Raucitas , V. 252. C. 106. 194.  
 Renschus , V. 271.  
 Rhagas , L. 249. S. 75. V. 467. *sag.* 96.  
 Rhenophonia , V. 256. C. 194.  
 Rheuma , S. 149. *Sag.* 255. C. 106.  
 Rheumatica , V. 74.  
 Rheumatismus , S. 185. L. 62. V. 138. *Sag.* 144. M.  
 212. C. 76.  
 Rhicnosis , V. 542.  
 Rochmos , V. 272.  
 Rhœas , V. 520.  
 Rhopalosis , V. 323. C. 176.  
 Rhyssmata , V. 521.  
 Rigo , S. 132. L. 141. V. 187.  
 Rifus , L. 148.  
 — Sardonicus , V. 210.

Rodatio , V. 532.  
 Ronchus , V. 272.  
 Rubeola , S. 94. L. 4. *sag.* 293. C. 85.  
 Ructus , L. 182. V. 215.  
 Ruminatio , V. 216.  
 Ruptura , S. 69. L. 238. V. 466. *sag.* 84.

S

Saniodes , V. 550.  
 Sarcocoele , V. 415.  
 Sarcoma , S. 23. L. 295. V. 376. *sag.* 28. C. 210.  
 Sarcoctosis , M. 216.  
 Sardiasis , L. 125. V. 209.  
 Satyriasis , S. 228. L. 81. V. 331. *sag.* 340. C. 189.  
 Scabies , S. 304. L. 444. *sag.* 130. C. 213.  
 Scarlatæ , V. 454.  
 Scarlatina , S. 98. V. 39. *sag.* 294. C. 86. 92.  
 Scelotybre , S. 136. V. 195. *sag.* 243. C. 131.  
 Scirrhus , S. 14. L. 284. V. 374. *sag.* 19. C. 210.  
 Sclopetoplaga , *sag.* 80.  
 Scoliosis , V. 512.  
 Scorbutus , S. 301. L. 224. V. 318. *sag.* 127. M. 216.  
 C. 174.  
 Seotomia , L. 111.  
 Screatus , L. 178.  
 Scrophula , S. 295. V. 367. *sag.* 121. M. 216. C. 173.  
 Seifis , V. 512.  
 Seline , V. 463.  
 Septana , V. 6. C. 42.  
 Serpigo , L. 268. V. 443.  
 Sextana , V. 5.  
 Singultus , S. 141. L. 153. V. 212. *sag.* 248.  
 Sinus , S. 73. V. 492. *sag.* 92. C. 213.  
 Siriasis , S. 34. C. 58.  
 Soda , L. 47. V. 154. C. 122.  
 Somnambulismus , S. 221. L. 77. *sag.* 333. C. 157.  
 Somnium , V. 339. C. 157.  
 Somnolentia , L. 96. V. 233.  
 Spanopogon , V. 556.  
 Sparganosis , S. 372.  
 Spasma , V. 479.  
 Spasmus , L. 121.



- œsophagi, V. 217.
- cynicus, V. 209.
- maxillae inferioris, V. 208.
- Sphacelismus, L. 32. C. 59.
- Sphacelus, L. 235. V. 328. C. 57.
- Spina bifida, V. 386. C. 165.
- Spina ventosa, C. 55.
- Spinola, L. 290. C. 165.
- Splenalgia, S. 206. *sag.* 164.
- Splenica, L. 52.
- Splenitis, S. 114. L. 36. V. 59. *Sag.* 313. C. 74.
- Splenocoele, S. 54. V. 412.
- Staphyloma, S. 36. V. 421. *sag.* 39.
- Staphylosis, V. 422.
- Steatites, V. 390. C. 161.
- Steatoma, V. 420.
- Sterilitas, *Sag.* 211. C. 208.
- Sternutatio, S. 139. L. 154. V. 204. *Sag.* 246.
- Stertor, S. 143. L. 156. V. 271. *sag.* 250.
- Stigma, V. 457.
- Stomacace, S. 241. L. 176. V. 85. *sag.* 176. C. 103.
- Strabismus, S. 116. L. 305. V. 514. *sag.* 222. C. 196.
- Stranguria, L. 197. V. 163.
- Stridor, L. 136.
- Struma, L. 285. C. 173.
- Stupiditas, V. 336. C. 152.
- Stupor, S. 189. L. 105. *sag.* 148.
- Stymatosis, V. 94.
- Subluxatio, V. 473.
- Subsultus, L. 134. *Sag.* 232.
- Sudamen, L. 322.
- Sudamina, V. 446.
- Sudor, L. 208. C. 200.
- Suffocatio, L. 158.
- hysterica, V. 196.
- Suflusio, S. 217. *Sag.* 329. C. 183.
- Sugillatio, L. 131. C. 210.
- Surditas, V. 247. C. 184.
- Suspirium, L. 150. V. 262.
- Sufurrus, V. 292. C. 185.
- Sutura, *sag.* 87.
- Sycosis, V. 490. C. 213.

# GENERUM.

239

*Syncopalis*, V. 29.  
*Syncope*, L. 174. L. 94. V. 274. *Sag.* 289. C. 120.  
*Synizelis*, V. 240. C. 180.  
*Synocha*, S. 80. L. 12. C. 45.  
*Synochus*, S. 81. L. 13. V. 16. C. 46. 52.  
*Syphilis*, S. 300. L. 6. V. 319. *Sag.* 159.  
*Syrgmus*, S. 219. *Sag.* 331. C. 185.  
*Syringmos*, L. 72.

## T

*Tabes*, S. 275. L. 210. V. 309. *Sag.* 101. C. 159.  
*Talpa*, V. 424.  
*Tarantismus*, S. 230. L. 84. V. 193. *Sag.* 342.  
*Tenesmus*, S. 257. L. 194. V. 166. *Sag.* 192.  
*Terminthus*, V. 381. C. 55.  
*Tertiana*, S. 88. L. 16. V. 2. *Sag.* 325. C. 32.  
*— duplex*, V. 12.  
*Testudo*, V. 420.  
*Tetanus*, S. 122. L. 127. V. 180. *Sag.* 228. M. 214.  
     C. 127.  
*Tetartophya*, S. 86. L. 27. *Sag.* 323. C. 40.  
*Therioma*, V. 486. C. 213.  
*Thlasis*, V. 471.  
*Tinea*, S. 305. L. 264. V. 497. *Sag.* 131. C. 213.  
*Torphus*, V. 424.  
*Torpor*, V. 224.  
*Tortura*, L. 304.  
*Trachelophyma*, *sag.* 33.  
*Traulotis*, V. 258. C. 195.  
*Tremor*, S. 129. L. 131. V. 184. *Sag.* 236. C. 119.  
*Trichiasis*, L. 317. V. 517.  
*Trichoma*, S. 311. *Sag.* 137. C. 176.  
*Trismus*, S. 117. L. 124. V. 207. *Sag.* 223. M. 214.  
     C. 129.  
*Tritaeophya*, S. 85. *Sag.* 322. L. 35.  
*Tritaeus*, L. 21. C. 36.  
*Tussis*, S. 142. L. 155. V. 205. *Sag.* 249. C. 106.  
     109. 140.  
*Tylloma*, V. 429. C. 211.  
*Tympanites*, S. 291. L. 220. V. 316. *Sag.* 118. M.  
     216. C. 162.

Ty-

Typhomania S. 178. L. 97. V. 23. *Sag.* 284. C. 113.  
 Typhus, S. 82. *Sag.* 319. C. 47.

## V

Vaga V. 10. C. 42.  
 Valgus, V. 544.  
 Varicella, V. 42. 448. C. 84.  
 Variola, S. 92. L. 3. V. 447. *Sag.* 290. C. 83.  
 Variolosa, V. 35. C. 83.  
 Varix, S. 33. L. 283. V. 407. *Sag.* 36. C. 209.  
 Varus, L. 270. V. 436. & 543. *Sag.* 10. C. 55.  
 Verruca, S. 25. L. 278. V. 426. *Sag.* 30. C. 211.  
 Vertigo, S. 216. L. 74. V. 393. *Sag.* 328.  
 Vesania, L. 70. C. 154.  
 Vitex, L. 321. V. 458.  
 Vitiligo, S. 2. V. 449. *Sag.* 2.  
 Ulcus, S. 71. V. 250. *Sag.* 89. C. 213.  
 Vociferatio, L. 147.  
 Volatica, L. 63. V. 178.  
 Vomica, L. 181. V. 104. C. 68.  
 Vomitus, S. 251. L. 184. V. 214. *Sag.* 186. C. 122.  
 Uredo, L. 8. C. 92.  
 Urorrhœas, V. 548.  
 Urticaria, V. 361. 456. C. 92.  
 Urticata, V. 40. C. 92.  
 Urticata, V. 40. C. 92.  
 Vulneraria, V. 77.  
 Vulnus, S. 63. L. 241. V. 465. *Sag.* 78. C. 213.

## X

Xirasia, V. 527.

## Z

Zoster, V. 344.

# CATALOGUS

*Morborum a nobis omifforum, quos omiffiffe fortaffis, non oportebat. Vide Prolegomena.*

<b>A</b> Glactatio, L.	Leucorrhæa ex vitio locali.
Agalaxis, V.	Lirhialis in organi uropæ-
Alopecia.	ticis, & in aliis corporis
Achylops.	partibus.
Anchylops.	Malis.
Ægylops.	Cocyta, L.
Anchylolis, L.	Melaena.
Anchylophis V.	Melafiderus.
Angina, S. & L.	Melanchlorus, V.
Angina pectoris.	Myocoilites.
Antipathia.	Necrosis.
Beriberia.	Odaxismus.
Cardiognus.	Dentitio & alii infantum
Cepalæa.	morbi.
Cephalalgia.	Paralyfis partis singularis
Distortio.	ex vitio musculorum.
Aglutitio.	Phytocephalus.
Acataposis.	Pnigma.
Desophagismus.	Catarrhus suffocativus Auct.
Dystoica.	Pyuria.
	Puoturia.
Parturitio & alii gravidarum	Sterilitas utriusque sexus.
& parturientium morbi.	Acyifis, V.
	Stimatofis.
Elcosis.	Tarantismus.
Effera.	Venena.
Hemicrania.	Vermes.

## I N D E X

## SPECIERUM SAUVAGESII,

*Quæ in systemate nostro sub nominibus generis non  
inveniuntur. Numeri indicant paginam.*

## A

- A**MAUROSIS a myosi , 180.  
 Amaurosis a synchyli , 180.  
 Amblyopia hydrophthalmica , 180.  
 Amphimerina anginosa , 44. & 63.  
 Amphimerina biliosa , 38.  
 Amphimerina cardiaca , 36.  
 Amphimerina catarrhalis , 43. & 106.  
 Amphimerina epiala , 37.  
 Amphimerina hemitritæus , 34.  
 Amphimerina humorosa , 36.  
 Amphimerina hungarica , 37.  
 Amphimerina paludosa , 38.  
 Amphimerina peripneumonica , 44. & 65.  
 Amphimerina phricodes , 37.  
 Amphimerina pseudohemitritæus , 34.  
 Amphimerina semiquartana , 41.  
 Amphimerina spasmotica , 41.  
 Amphimerina syncopalis , 36.  
 Amphimerina tussiculosa , 106. & 140.  
 Angina spasmodica , 129.  
 Aphonia paralytica , 118.  
 Arthritis rheumatica , 81.  
 Ascites flatulento-peritonæus , 163.  
 Ascites sanguineo uterinus , 168.  
 Asphyxia a carbone , 115.  
 Asphyxia congelatorum , 115.  
 Asphyxia flatulenta , 116.  
 Asphyxia foricariorum , 115.



- Asphyxia a fumis , 115.  
 Asphyxia hysterica , 117.  
 Asphyxia immerforum , 116.  
 Asphyxia a mephitide , 115.  
 Asphyxia a pathemate , 115.  
 Asphyxia a musto , 115.  
 Asphyxia sideratorum , 115.  
 Asphyxia spinalit , 113.  
 Asphyxia suspenforum , 116.  
 Asthenia a hydrocephalo , 114.  
 Asthma catarrhale , 137.  
 Asthma febricosum , 139.  
 Asthma a gibbo , 138.  
 Asthma metallicum , 139.  
 Asthma pneumodes , 137.  
 Asthma a polypo cordis , 139.  
 Asthma pulverulentorum , 139.  
 Atrophia febrilequa , 160.  
 Atrophia infantilis , 159.  
 Atrophia rachitica , 159.

## C

- Cardialgia inflammatoria , 71.  
 Cardialgia sputatoria , 140.  
 Catarrhus Bellinfulanus , 62.  
 Cephalæa febricosa , 43.  
 Cephalalgia catarrhalis , 106.  
 Cephalalgia inflammatoria , 519.  
 Cephalalgia intermittens , 43.  
 Cholera sicca auriginosa , 143.  
 Convulsio a nervi punctura , 129.  
 Convulsio raphania , 132.  
 Convulsio ab ustilagine , 132.

## D

- Diarrhœa carnosæ , 110.  
 Dysenteria a catharticis , 111.  
 Dysenteria a mesenterii vomica , 11.  
 Dysenteria Parisiaca , 111.

## E

- Eclampsia febricosa , 34.  
 Eclampsia typhodes , 132.  
 Enteritis mesenterica , 70.  
 Ephemera Britannica , 51.  
 Ephemera dichomene , 42.  
 Ephemera sudatoria , 51.  
 Epilepsia febricosa , 34.  
 Erysipelas ambustio , 56.  
 Erysipelas symptomaticum , 56.  
 Erysipelas a vespiis , 56.

## H

- Hepatalgia apostematosa , 74.  
 Herpes Zoster , 89.  
 Hydrometra ovarii , 167.  
 Hysteralgia febricosa , 43.  
 Hysteria febricosa , 34.

## I

- Ischias ex abscessu , 82.  
 Ischias intermittens , 43.

## L

- Lumbago apostematosa , 82.  
 Lumbago ab arthrocace , 82.  
 Lumbago psoadica , 82.

## M

- Menorrhagia difficilis, 209.  
 Miliaris nautica, 49.  
 Miliaris purpurata, 49.  
 Miliaris sudatoria, 51.  
 Mutitas a glossolyfi, 118.

## N

- Nephralgia arenosa, 75.  
 Nephralgia arthritica, 75.  
 Nephralgia calculosa, 75.  
 Nephralgia febricosa, 43.  
 Nephralgia purulenta, 75.  
 Nephralgia rheumatica, 76.

## O

- Ophthalmia febricosa, 43.  
 Orthopnæa hysterica, 137.  
 Orthopnæa spasmodica, 137.

## P

- Phrenitis apyreta, 157.  
 Phrenitis inanitorum, 157.  
 Pleuritis hepatica, 73.  
 Pleuritis splenica, 74.  
 Pleurodyne parapleuritis, 67.  
 Pleurodyne verminosa, 68. & 77.  
 Pleurodyne vomica, 68.  
 Psydracia a vespis, 96.  
 Pyuria arthritica, 208.  
 Pyuria mucosa, 208.  
 Pyuria viscida, 208.

## Q

- Quotidiana deceptiva, 36.  
 Quotidiana epileptica, 34.  
 Quotidiana soporosa, 34.

## S

- Scarlatina anginosa* , 86.  
*Scelotyrhe festinans* , 131.  
*Scelotyrbe verminosa* , 131.  
*Scrophula mesenterica* , 159.  
*Splenalgia suppuratoria* , 74.  
*Synocha catarrhalis* , 106.  
*Synocha miliaris* , 52.  
*Synochius dysenteriodes* , 52.  
*Synochus hiemalis* , 46.  
*Synochus pleuritica* , 46. & 67.  
*Synochus rheumatizans* , 46.  
*Synochus scorbutica* , 47.

## T

- Tabes dorsalis* , 160.  
*Tabes a hydrope* , 161.  
*Tabes nutricum* , 160.  
*Tabes a sanguifluxu* , 160.  
*Tabes sudatoria* , 160.  
*Tabes syphilitica* , 161.  
*Tetanus febricosus* , 34.

## V

- Variola lymphatica* , 84.

F I N I S

# NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

**C**oncediamo Licenza a Gio: *Antonio Pezzana* Stampator di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato *Synopsis Nisologiae Methodicae exhibens. Clariss. Virorum Savvagesi, Linnæi &c. systemata Nomenclologica. Tomi II.* osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di *Venezia*, e di *Padova*.

Dat. li 30. Aprile 1795.

- ( *Agostin Barbarigo* Rif.
- ( *Paolo Bembo* Rif.
- ( *Zuane Vallarezzo* Rif.

Registrato in Libro a Carte 596. al Num. 10.

*Marcantonio Sanfermo Seg.*



# CATALOGUS

## QUORUNDAM LIBRORUM.

### VENETIIS RECENS EDITORUM.

- C**ompendio della Nuova Dottrina Medica, e Confutazione del Sistema dello Spasmo del D. Cullen; Opera di Giovanni Brown D. M. tradotta dall' Inglese dal D. Rasi, con un Discorso e con Note. Prima Edizione. 8. t. 2. Venezia, 1793. L. 5:---
- Prime Linee di Chirurgia di Vincenzo Malacarne, P. P. Professore di Chirurgia nell' Università di Padova, Chirurgo Pensionario di S. M. Sarda, e Socio di varie illustri Accademie d' Europa. Prima Edizione. 8. Venezia, 1794. L. 6:---
- Ricordi d' Anatomia Traumatica composti ad uso de' giovani Chirurghi Militari di Terra e di Mare dal sudd. Prof. Malacarne ec. ec. Prima edizione magnifica, con 9. Figure in rame. 4. Venezia. 1794. L. 8:---
- Aphorismi Medico-Politici centum. Alexandri Knips Macoppe, olim celeberrimi in Patavina Universitate Practicae Medicinae P. P. Professoris &c. &c. Prima Editio. 8. Venetiis, 1795. L. 1: 10
- Ricerche sullo stato della Medicina secondo i principj della Filosofia induttiva, con un' Appendice contenente vari casi pratici con riflessioni; Opera del Dr. Jones tradotta dall' Inglese, e arricchita di Note dal Dr. Frank. Quest' Opera è un Commento della Nuova Dottrina Medica del Dr. Brown. Prima Edizione. 8. t. 2. 6g. Venezia, 1795. L. 6:---
- Elementi di Chimica del Cav. Gio: Antonio Chaptal, P. P. Professore di Chimica a Montpellier, Ispettore Onorario delle Miniere del Regno di Francia, e Socio delle più illustri Accademie d' Europa; tradotti dal Francese dal D. dalla Porta, con Preliminari e con Note. Prima Edizione. 8. t. 5. Venezia, 1792. vale L. 24:---
- Epilome de Curandis Hominum Morbis, Praelectionibus Academicis dicata, Auctore Joan. Petro Frank, in Ticinensi Universitate Therapiae Spec. & Clinices P. P. & O. Professore, & clarissimarum Europae Academicarum Socio. Prima Editio. 8. t. 5. Venetiis, 1794. L. 24:---
- Trattato delle Malattie più comuni ai Bambini dalla loro nascita sino alla pubertà, con un Saggio sull' Allattamento de' medesimi; Opera di Giorgio Armstrong D. M. tradotta dall' Inglese e accresciuta di molte Note comunicate dal D. Erugnatelli, di una Memoria sull' Idrocefalo interno del D. Odier, e di varie altre Memorie coronate dalla R. Società di Medicina di Parigi sopra diversi argomenti relativi a questo soggetto. Prima Edizione. 8. Venezia, 1793. L. 3:---
- Filosofia Chimica, o Verità fondamentali della Chimica moderna disposte in un nuovo ordine dal Prof. Fourcroy; e tradotte dal Francese. Prima Edizione. 8. Venezia, 1794. L. 2. 10



